

Ranunculus sect. Batrachium - Wasserhahnefüße

	Schwimmblätter	Tauchblätter	Blütenblätter	Blütenboden	Nektarium	Früchte
<i>peltatus</i>	stets vorhanden, > 3 cm gestielt	kürzer als Stengelglied	7 – 13 mm, deckend	dicht behaart	birnförmig	Stiele > 50 mm
<i>aquatilis</i>	mit oder ohne, max. 3 cm gestielt	kürzer als Stengelglied	5 – 10 mm, deckend	behaart	kreisförmig	Stiele < 50 mm
<i>penicillatus</i>	mit oder ohne, > 3 cm gestielt	so lang oder länger als Stengelglied	10 – 15 mm, deckend	behaart	birnförmig	Stiele > 50 mm
<i>trichophyllus</i>	fehlend	länger als Stengelglied	3,5 – 5,5 mm, nicht deckend	behaart	halbmond- förmig	Stiele > 50 mm ca. 35, > 1,5 mm
<i>rioni</i>	fehlend	länger als Stengelglied	2,5 - 5 mm, nicht deckend	behaart	rundlich, halbmondf.	Stiele > 50 mm, zahlreich, ca. 1 mm
<i>circinatus</i>	fehlend	Umriß kreisf., Zipfel in 1 Ebene, gespreizt bleibend	6 – 10 mm, deckend	behaart	halbmondf.	Stiele > 50 mm
<i>fluitans</i>	fehlend	so lang oder länger als Stengelglied, fleischig	7 – 13 mm, deckend	kahl	eiförmig bis birnförmig	Stiele > 50 mm

Ranunculus peltatus – stets mit Schwimmblättern, diese über 3 cm gestielt,
 Tauchbl. kürzer als das Stengelglied, Blütenboden
 dicht behaart, Fruchtstiele > 50 mm.

Ranunculus aquatilis - mit oder ohne Schwimmblätter, diese maximal 3 cm
 gestielt, Nektarium kreisförmig, Fruchtstiele < 50 mm.

Ranunculus trichophyllus – ohne Schwimmblätter, Blütenblätter sich nicht über-
 deckend, Nektarium halbmondförmig, reife Früchte bis ca. 35,
 über 1,5 mm lang.

Ranunculus rioni - ohne Schwimmblätter, Blütenblätter sich nicht über deckend,
 Nektarium oval bis halbmondförmig, reife Früchte zahlreich,
 um 1 mm lang.

Ranunculus circinatus – ohne Schwimmblätter, Tauchblätter im Umriß kreisförmig,
 in einer Ebene, außerhalb des Wassers gespreizt beliebig,
 Nektarium halbmondförmig.

Ranunculus fluitans - ohne Schwimmblätter, Blütenblätter > 15 mm, sich deckend, Blüten-
 boden kahl, Tauchblätter fleischig, in Fließgewässern

Ranunculus penicillatus – mit oder ohne Schwimmblätter, Tauchblätter länger als
 Stengelglied, Blütenboden behaart, Fruchtstiel > 50 mm,
 Nektargrube birnförmig.

Arno Wörz 2018