

Literaturverzeichnis

Anmerkung: Die Literaturliste wurde automatisch aus einer Datenbank erzeugt. Wir haben uns bemüht, grobe Fehler & Doppelinträge nachträglich „auszumerzen“, doch der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail, so werden sich wahrscheinlich noch einige „Unzulänglichkeiten“ finden lassen. Unterschiedliche Zitierweisen und uneinheitliche Abkürzungen bitten wir zu entschuldigen!

Acken, H. von und P. Müllner (1972): Zur Unterscheidung von *Digitaria sanguinalis* (*Setaria sanguinalis* Panicum sanguinale, Bluthirse) und *Digitaria ischaemum* (*Setaria ischaemum*, Panicum lineare, Fingerhirse). Kieler Not. Pflanzenk. Schleswig-Holstein 4 (2/3): 37-38

Ade, A. (1901): Flora des bayerischen Bodenseegebietes - Übersicht über die im bayerischen Bodenseegebiet bis jetzt beobachteten wildwachsenden Phanerogamen und Gefässkryptogamen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 8: 3-127

Ade, A. (1957): Die Gattung *Rubus* in Südwestdeutschland. Versuch einer Bearbeitung der Brombeerflora Hessens, des nördlichen Bayerns, Badens, und Württembergs, einschließlich Rheinhessens, der Pfalz und des Nahegebietes, sowie der gesamten Rhön. Schriftenreihe NatSchutzstelle Darmstadt 7: 1-217

Ade, M. (1989, 1990): Flora von Oberndorf am Neckar. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 64/65: 509-583

Ade, U. (1990): Seltene und geschützte Pflanzen im Landkreis Böblingen. In: Ade, U. et al.: Naturnahe Lebensräume und Flora im Schönbuch und Gäu. : 52-76

Ade, U., B. Baumann, H. Baumann u. W. Wahrenburg (1990): Naturnahe Lebensräume und Flora in Schönbuch und Gäu. : 244

Adema, F. (1968): En "oude" voor Nederland nieuwe *Salvia*-bastard. *Gorteria* 4: 72-74

Adema, F. u. M.T. Jansen (1979): *Xanthium* L. in Nederland. *Gorteria* 9(9): 300-303

Adler, W., K. Oswald u. R. Fischer (1994): Exkursionsflora von Österreich (Hrsg.: Fischer, M.). E. Ulmer : 1180

Adolphi, K. (1981): *Muscari armeniacum*, eine verwilderte Zierpflanze. *Göttinger floristische Rundbriefe* 15 (4): 75-77

Adolphi, K. (1987): Verwildernde und sich einbürgernde Kulturpflanzen; ausgewählte Beispiele - problematische Arten. 21. Hessischer Floristentag. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt 12: 39-46

Adolphi, K. (1989): Beobachtungen an sich einbürgernden Arten. In: 23. Hessischer Floristentag, Tagungsbeiträge. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt - Institut für Naturschutz 12 (4): 28-39

Adolphi, K. (1990): Zum Status von *Aster novae-angliae* L.. *Flor. Rundbr.* 24: 35-37

Adolphi, K. (1991): Ein kleines Vorkommen des Pfirsichbaumes (*Persica vulgaris* Mill.) am Drachenfels. *Decheniana* 144: 117-118

Adolphi, K. (1995): Neophytische Kultur- und Anbaupflanzen als Kulturflüchtlinge im Rheinland. *Nardus* 2: 272

Adolphi, K. u. R. Nowack (1983): *Spiraea alba* Du Roi und *Spiraea x billardii* Hering, zwei häufig mit *Spiraea salicifolia* L. verwechselte Taxa. *Gött. Flor. Rundbr.* 17: 1-7

Adolphi, K. u. R. Nowack (1992): *Leucanthemum paludosum* (Poiret) Bonnet & Barratte - eine beliebte Zierpflanze mit Einbürgerungstendenz? *Flor. Rundbr.* 26 (2): 107-109

Aeschimann, D. u. Ch. Heitz (1996): Synonymie-Index der Schweizer Flora und der angrenzenden Gebiete (SISF).

Aeschimann, D. u. H. M. Burdet (1994): *Flore de Suisse et des territoires limitrophes. Le nouveaux Binz.* : 603

Aichele, D. u. H.W. Schwegler (1984): Unsere Moos- und Farnpflanzen.

Aichinger, E. (1933): Vegetationskunde der Karawanken. *Pflanzensoziologie* 2

Aichinger, E. (1951): Lehrwanderungen in das Bergsturzgebiet der Schütt am Südfuß der Villacher Alpe. *SpringerAngewandte Pflanzensoziologie* 4: 67-118

- Albers, F (1973): Zwei Ausgangskaryotypen bei der Gräser-Gattung *Aira L.*. Österr. Botan. Zeitschr. 121: 251-254
- Albers, F. (1980): Karyogeobotanik der Gräser-Subtriben *Aristavenae* und *Airinae* (*Aveneae*). *Flora* 168: 150-167
- Albers, F. (1980): Systematik, variation und Entwicklungstendenzen der Subtriben *Aristaveninae* und *Airinae* (*Gramineae-Aveneae*). *Phyton (Austria)* 20/1-2: 95-116
- Albers, F. u. F. Butzin (1977): Taxonomie und Nomenklatur der Subtriben *Aristaveninae* und *Airineae* (*Gramineae - Aveneae*). *Willdenowia* 8: 81-84
- Alechin, W.W. (1926): Was ist eine Pflanzengesellschaft? Ihr Wesen und ihr Wert als Ausdruck des sozialen Lebens der Pflanzen. *Rep. spec. nov. reg. veg. (Feddes Repertorium)* 37
- Aleksejew, P. (1971): Unsere heimischen Orchideen. *Einhorn* 18(105): 132-134
- Allmendinger, P. (1893-1894): Flora des Stocksbergs und seiner nächsten Umgebung. Aus der Heimat : 6:19-21,49-53,81-84,116-118;7:18-21
- Amarasinghe, V. and L. Watson (1990): Taxonomic significance of microhair morphology in the genus *Eragrostis* Beauv. (*Poaceae*). *Taxon* 39 (1): 59-65
- Amigo, J., M. Bujan et M. Romero (1991): Révision taxonomique du genre *Setaria* (*Gramineae*) dans la Péninsule Iberique. *Bull. Soc. Bot. France, Lett. Bot.* 138 (2): 155-165
- Ammann, H. et al. (1923): Das Naturschutzgebiet am Federsee in Württemberg. *Beitr. Naturdenkmalpflege* 8: XX + 515 S.
- Ammann, K. (1974): Die mehrjährigen *Bromus*-Arten der Schweiz. *Beitr. Kartierung Schweizer Fl.* 5: 1-6, 11-19
- Ammann, K. (1981): Bestimmungsschwierigkeiten bei europäischen *Bromus* Arten. *Bot. Jahrb. Syst.* 102 (1-4): 459-469
- Ander, A. (1961): Botanische Überraschungen. *Blätter Schwäb. Albverein* 67: 148
- Anderson, D. E. (1961): Taxonomy and distribution of the genus *Phalaris*. *Iowa State Univ. Press Iowa State Journal of Science* 36/1: 1-96
- Andersson, S. (1993): Morphometric differentiation, patterns of interfertility and the genetic basis of character evolution in *Crepis tectorum* - *Asteraceae* -. *Plant Syst. Evol.* 184: 27-40
- Angersbach, A. (1926): Der Felssturz im Königtal bei Rambach. *Abh. u. Ber. Ver. Naturkd. Kassel* 41: 67-118
- Anonymus (1882, 1883): Neue Standorte. - *Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden.* (1882): 2: 25-27; (1883): 1 (6/7): 74-76, 1 (8/9): 85-92.
- Anonymus (1893): Neue Standorte. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 3 (115): 142
- Anonymus (1896): Neue Standorte in der badischen Flora. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 3 (141): 366-368
- Anonymus (1902, 1903): Neue Standorte. - *Mitt. Bad. Bot. Ver.* (1902): 178: 246-247; (1903): 189: 335-336.
- Anonymus (1911, 1912): Neue Standorte. - *Mitt. Bad. Landesver. Naturk.* (1911): 5 (263/264): 111-112; (1912): 6 (269-271): 163-164.
- Anonymus (1934): Exkursionsberichte. *Botanische Exkursion in den Kaiserstuhl am 9. September 1934.* *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F.* 3 (6/7): 92-94
- Anonymus (Wolf, H.) (1941): Exkursionsbericht vom 5. Okt. 1940. *Verh. Naturhist.-Med. Ver. Heidelberg, N.F.* 18: 445-446
- Apelgren, K. (1990): Variation and distribution of *Myosotis laxa* sensu lato (*Boraginaceae*) in the Baltic region. *Ann. Bot. Fennici* 27: 287-299
- Apelgren, K. (1990): *Myosotis baltica*, A questionable Taxon. *Sommerfeltia* 11: 5-11
- Appel, O. (1889): Beiträge zur Flora von Baden. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 2 (62): 93-96
- Appel, O. (1889): Caricologische Mitteilungen. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 2 (67/68): 146-148
- Arand-Ackerfeld, E. v. (1959): Die Pflanzenwelt im Großen Lautertal, Zwiefalter Ach und Wolfstal, Riedlingen. :

- Arand-Ackerfeld, E. v. (1971): Ehinger Flora. Unveröff. Manuskript. : 282
- Arènes, J. (1950): Monographie du genre *Arctium* L.. Bull. Jard. Botanique de L'État Bruxelles 20: 67-156
- Arlt, K., Hilbig, W. u. Illig, H. (1991): Ackerunkräuter - Ackerwildkräuter - Neue Brehm-Bücherei 607. : 160
- Armstrong, K.C. (1981): The evolution of *Bromus inermis* and related species of *Bromus* sect. *Pnigma*. Bot. Jahrb. Syst. 102 (1-4): 427-443
- Arnou, L. A. (1994): *Koeleria macrantha* and *K. pyramidata* (Poaceae): Nomenclatural Problems and Biological Distinctions. Systematic Botany 19/1: 6-20
- Arthur, C. et al. (1907): American Code of Botanical Nomenclature. Bull. Torrey Bot. Club 34: 167-178
- Arts, G.H.P. u. C. Den Hartog (1990): Phytogeographical aspects of the West European soft-water macrophyte flora. Acta Bot. Neerl. 39: 369-378
- Arvet-Touvet, C. (1888): Les Hieracium des Alpes Françaises. Ann. Soc. Linn. Lyon 34: 1-131
- Arzt, Th. (1970): *Trifolium resupinatum* L. im Westerwald. Hess. Flor. Briefe 19 (227): 61-63
- Ascherson, P. u. P. Graebner (1896-1939): Synopsis der mitteleuropäischen Flora. 12 Bände. Gebr. Borntraeger
- Ascherson, P. u. P. Graebner (1902-1904): Synopsis der mitteleuropäischen Flora. 2: I-IV: 1-530
- Asmus, F. (1988): Das Eindringen von Neophyten in anthropogen geschaffene Standorte und ihre Vergesellschaftung am Beispiel von *Senecio inaequidens* DC. Flora 180: 133-138
- Attawi, F.A.J. (1977): Morphologisch-anatomische Untersuchungen an den Haustorien einiger Orobanche-Arten. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 90 (1/2): 173-182
- Averyanov, L. V. (1994): Orchids of the Caucasus. Ber. Arbeitskreis Hei,m. Orch. 11(2): 4-45
- Averyanov, L.V. (1994): Review of the species of the family Orchidaceae in the Caucasus flora. Bot. Zhur. 79(10): 108-127
- Axelrod, D.I. (1985): Rise of the Grassland Biome, Central North America. The Botanical Review 51 (2): 164-201
- Baas, J. (1974): Kultur- und Wildpflanzenfunde aus einem römischen Brunnen von Rottweil-Altstadt. Fundber. Bad.-Württ. 1: 373-412
- Baas, J. (1987): Ein bedeutsamer römerzeitlicher Fund von *Vicia faba* L. var. *minor* (Peterm. em. Harz) Beck in Köngen, Kreis Esslingen. Fundber. Bad.-Württ. 12: 365-370
- Babcock, E.B. (1947): The genus *Crepis*. Part I. The taxonomy, phylogeny, distribution and evolution of *Crepis*. Part II. Systematic treatment. Univ. Calif. Publ. Bot. 21/22: 1-1030
- Bächtold, S. (1963): Ergänzungen zu den Floristischen Mitteilungen aus dem Gebiet des Staatswaldes Hohenstaufen. Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 27: 192-213
- Baehr, M. (1985): Die Laufkäfer des Gipsbruches bei Wurmlingen, Kr. Tübingen. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 59/60: 391-420
- Bailey, L.H. (1919): The Standard Cyclopedia of Horticulture. A discussion, for the matter, and the professional and commercial grower, of the kinds, characteristics and methods of cultivation of the species of plants grown in the regions of the United States and Canada ... Macmillan Comp.6 Bände.
- Balaska (1962): Zur Verbreitung der Pestwurz (*Petasites hybridus*) in Ostmecklenburg. Beitr. Bez. - Naturkundemuseum Stralsund 1: 37-66
- Baldini, R. M. (1995): Revision of the genus *Phalaris* L. Webbia 49: 265-329
- Ball, P.W. (1968): *Tetragonolobus*. - In: Flora Europaea (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press 2: 176
- Ball, P.W. (1968): *Vicia* L. - In: Flora Europaea (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press 2: 129-136
- Ball, P.W. (1972): *Ajuga* L., *Leonurus* L., *Lycopus* L., *Melittis* L., *Onosma* L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press

- Ball, P.W. (1972): Taxonomic and nomenclatural notes on European Labiatae. J. Linn. Soc., Bot. 65: 342-352
- Ball, P.W. u. F.M. Getliffe (1972): *Acinos* Miller. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press : 165-166
- Ball, P.W., B. Pawlowski and S.M. Walters (1968): *Potentilla*. - In: Tutin, T.G. et al. (eds.): Flora Europaea. Univ. Press 2: 36-47
- Balters, H., M. Kornaker, W. Ockert (1997): Die Verbreitung von *Coeloglossum viride* (L.)Hartm. im Ostalbkreis (Baden-Württemberg). Journ. Europ. Orch. 28(4): 795-804
- Baltisberger, M. (1981): *Myosotis rehsteineri* Wartm. im Rugeller Riet (FL). Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel 48: 161-163
- Bammert, J. (1985): Floristische Beobachtungen bei der Neubesiedlung künstlicher Steilhänge in der Molasse am Bodensee. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 13 (3/4): 349-384
- Banfi, E. (1989): Osservazioni sulle specie italiane del genere *Setaria* P. Beauv. (Poaceae). Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 130: 189-196
- Banzhaf, R. (1985): Schlangenwurz (*Calla palustris*) und Kahler Alpendost (*Adenostyles glabra*): Erstfunde im Altdorfer Wald (Kreis Ravensburg). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 59/60: 87-89
- Barling, D.M. (1967): *Poa pratensis* L., *P. angustifolia* L. and *P. subcaerulea* Sm. Proc. Bot. Soc. British Isles 6 No. 4: 363-364
- Baronius, G., W. Hofmann u. H.J. Fiedler (1989): Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Wißberitztalhänge" (Bez. Dresden, DDR). Arch. NatSchutz LandschForsch. 29: 159-173
- Bartsch, J. (1924): Zur Flora des badischen Jura und Bodenseegebietes. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1 (12/13): 301-309
- Bartsch, J. (1925): Die Pflanzenwelt im Hegau und nordwestlichen Bodensee-Gebiete. Schriften Ver. Gesch. Bodensee 1: VIII+194
- Bartsch, J. u. M. Bartsch (1930): Die pflanzengeographische Bedeutung des Kraichgaues. Zeitschrift für Botanik 23: 361-401
- Bartsch, J. u. M. Bartsch (1931): Neue Pflanzenfundorte in Nordbaden. Beitr. Naturw. Erforsch. Badens 8: 121-125
- Bartsch, J. u. M. Bartsch (1940): Vegetationskunde des Schwarzwaldes. Pflanzensoziologie 4: 229
- Bartsch, J. u. M. Bartsch (1952): Der Schluchtwald und der Bacheschenwald. Angewandte Pflanzensoziologie 8: 3-109
- Bartsch, J., J. Hruby, H. Wolf, W. Drescher, H. Heine u. E. Oberdorfer (1951): Botanische Neufunde aus dem badischen Oberrheingebiet nach Aufzeichnungen. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 5: 186-191
- Basler, A. (1972): Cytotaxonomische Untersuchungen an der Boraginaceen-Gattung *Symphytum* L. Bot. Jahrb. Syst. 92: 508-553
- Basler, A. (1973): *Symphytum* in Norddeutschland. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schl.-Holst. 5: 5-8
- Bässler, M. (1971): Zur Nomenklatur von *Lathyrus* L. Feddes Repertorium 82: 433-439
- Bauer, C.F. (ca. 1815-1835): Materialien zu einer Flora der Fürstenthümer Hohenlohe und Mergentheim. Manuskript
- Bauer, C.F., W. Fuchs, Höpfner, von Oetinger, E. Rhodius, F. Rhodius. J. Schrodtt (1816): Etwas über Standorte und Blüthezeit der in den Fürstenthümern Hohenlohe und Mergentheim bis jetzt entdeckten wildwachsenden Pflanzen.
- Bauer, H. (1912): Seltene Orchideen der heimischen Flora. Süddeutsche Apotheker-Zeit. 1912: 400
- Bauer, J. (1992): Die Verbreitung von *Leucojum vernum* L. im Allgäu (mit Verbreitungskarte). Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 31(2): 25-28
- Bauer, Th.E. (1905): Flora des württembergischen Oberamtes Blaubeuren. Fr. Mangold : 177

- Bauer, Th.E. (1907): Botanischer Führer durch die Umgebung von Isny im württembergischen Allgäu. : 1-46
- Bauer, J. (1995): Die Verbreitung von *Gagea lutea* und *Muscari botryoides* im Allgäu. Mitt. naturw. Arbeitskr. Kempten 33(2): 3-6
- Bauhini, C. (1620): Prodomos Theatri Botanici, in quo Plantae supra sexcentae ab ipso primum descriptae cum plurimis figuris proponuntur: 160
- Bauhini, C. (1622, 1671): Catalogus Plantarum circa Basileam sponte nascentium: 113
- Bauhini, Caspar (1596): Phytopinax seu Enumeratio plantarum ab Herbariis nostro seculo descriptarum, cum earum differentiis... S. Henrici petri
- Bauhini, J. (1598): Historia novi et admirabilis fontis balneique Bollensis in ducatu Wirtembergico ad acidulas Goepingenses. Montbeliard: 291
- Bauhini, J. (1602): Ein new Badbuch, und historische Beschreibung von der wunderbaren Krafft und Würckung des Wunder-Brunnen und heilsamen Bads zu Boll ...
- Bauhini, J., J.H. Cherler u. D. Chabrey (1650-1651): Historia plantarum universalis ... 3 Bände.
- Baum, B. R. (1977): Oats: wild and cultivated. - A monograph of the genus *Avena* L. Biosystematic Research Institute Monograph 14
- Baumann, B. u. H. Baumann (1990): Die ausgestorbenen oder vom Aussterben bedrohten Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Böblingen. In: Ade, U. et al.: Naturnahe Lebensräume und Flora im Schönbuch und Gäu: 77-87
- Baumann, B. u. H. Baumann (1990): Die gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Böblingen. - In: Ade, U. et al.: Naturnahe Lebensräume und Flora in Schönbuch und Gäu: S. 88-187
- Baumann, E. (1911): Die Vegetation des Untersees (Bodensee). E. Schweizerbart Arch. Hydrobiol. Suppl. 1: 554
- Baumann, H. (1983): Die balkanisch-orientalischen *Dactylorhiza*-Arten - ein Vergleich. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 15(1): 43-108
- Baumann, H. u. J. Göllnitz (1986): Neufunde von *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. in Baden-Württemberg. Mitt.Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 18(1): 159-164
- Baumann, H. u. S. Künkele (1971): Zur Verbreitung von *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. in Baden-Württemberg. Veröff. Landesst. Natursch. Landschaftspfl. Bad.- Württ. 39: 7-66
- Baumann, H. u. S. Künkele (1980): *Ophrys araneola* Reichenb. - ein übersehener Artname der mitteleuropäischen Orchideenflora. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Bad.-Württ. 12(4): 287-303
- Baumann, H. u. S. Künkele (1981): Beiträge zur Taxonomie europäischer Orchideenarten. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Bad.-Württ. 13(3): 337-373
- Baumann, H. u. S. Künkele (1982): Die wildwachsenden Orchideen Europas.
- Baumann, H. u. S. Künkele (1983): Beiträge zur Taxonomie europäischer und orientalischer Orchideen. Jahresber. Naturw. Ver. Wuppertal 36: 12-16
- Baumann, H. u. S. Künkele (1983): Über einige von Linnaeus beschriebene europäische Orchideenarten mit besonderer Berücksichtigung der Gattung *Dactylorhiza* Necker ex Nevski. Mitt. Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 15(4): 417-478
- Baumann, H. u. S. Künkele (1986): Die Gattung *Ophrys* L. - eine taxonomische Übersicht. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 18(3): 305-688
- Baumann, H. u. S. Künkele (1988): Die Orchideen Europas: 191
- Baumann, H. u. W. Wahrenburg (1995): Die seltenen Pflanzen des Böblinger Panzerplatzes unter besonderer Berücksichtigung der Zwergbinsengesellschaften. Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 151: 185-215
- Baumann, H., S. Künkele u. R. Lorenz (1989): Die nomenklatorischen Typen der von Linnaeus veröffentlichten Namen europäischer Orchideen. Mitt. Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 21(3): 355-700
- Baumann, H., S. Künkele u. R. Lorenz (1990): Zur Typisierung der von Linnaeus beschriebenen europäischen Orchideen. Jahresber. Naturw. Ver. Wuppertal 43: 71-79

- Baumann, H., U. Ade u. R. Gastel (1994): Flora. - In: Gastel, R.: Beantragtes Naturschutzgebiet Panzerübungsplatz Böblingen. Remshalden-Buoch (M. Hennecke): 27-34
- Baumann, P. u. K. Baumann (1988): Das Geheimnis der Orchideen. Hoffmann u. Campe: 142
- Baumgartner, L. (1882-1887): Neue Standorte. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden und Mitt. Bad. Bot. Ver. 1: 12-16, 25-27 (1882); 74-76, 85-92, 105-108, 120-123, 153-154 (1883); 120-123, 105-108, 153-154 (1884); 153-154 (1885); 266-267 (1886); 208-209, 266-267, 303.
- Baumgartner, W. (1975): Die Baumwolladventivflora von Atzenbach (Baden, BRD) und Issenheim (Elsass, Frankreich). Bauhinia 5 (3): 119-129
- Baur, K. (1935): Die Pflanzenwelt des Reußenberggebiets. Veröff. Staatl. Stelle Naturschutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 11: 46-69
- Baur, K. (1941): Zur Kenntnis einiger Erlenwaldgesellschaften. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 17: 158-177
- Baur, K. (1956): Die Vegetationsverhältnisse in den Wäldern der Adelegg. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 111 (1): 127-136
- Baur, K. (1964): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25000 Blatt 7416 Baiersbronn (Hrsg.: Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart): 76
- Baur, K. (1965): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25000 Blatt 6526 Creglingen (Hrsg.: Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart): 46
- Baur, K. (1967): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25000 Blatt 8326 Isny (Hrsg.: Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart): 31
- Baur, K. (1968): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25 000 Blatt 8226 Herlazhofen. Landesvermessungsamt Bad.-Württ. : 25 S. + Beil.
- Baur, K. u. K. Müller (1968): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25000 Blatt 8225 Kißlegg (Hrsg.: Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart): 58
- Baur, K. u. K. Müller (1972): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25000 Blatt 7624 Schelklingen: 41
- Baur, K., R. Hauff u. K. Müller (1954): Das Rispengras *Poa remota* in Württemberg. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 109: 131-132
- Baur, W. (1886): Beiträge zur Flora Badens. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (31/32): 171-177, 271-277
- Bausch, B. (1988): Kulturhistorische und vegetationskundliche Untersuchungen ehemaliger Wässerwiesen im Landkreis Sigmaringen Diplomarbeit Univ. Hohenheim
- Bayer, M. (1980): Die Gattung *Epipactis* Zinn in Baden-Württemberg. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 12(4): 219-268
- Bayer, M. (1986): Interspezifische Hybriden der Gattung *Epipactis* Zinn in Baden-Württemberg. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 18(2): 192-210
- Baytop, A. (1978): 29. *Nonea Medikus*. - In: Flora of Turkey, Vol. 6 (Hrsg.: Davis, P.H.). Univ. Press : 404-414
- Becherer, A. (1921): Beiträge zur Flora des Rheintales zwischen Basel und Schaffhausen. Verh. Naturf. Ges. Basel 32: 172-200
- Becherer, A. (1921): *Scorzonera austriaca* und *Aremonia agrimonioides* im Gebiet des Hochrheins. Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 102 Jahresvers. in Schaffhausen 2. Teil: 145-146
- Becherer, A. (1923): Beiträge zur Pflanzengeographie der Nordschweiz. Diss. Colmar
- Becherer, A. (1928): Zur Nomenklatur einiger Sippen mitteleuropäischer Gefäßpflanzen. Repert. spec. nov. 25: 10-15
- Becherer, A. (1950): Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) in den Jahren 1948 und 1949. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 60: 467-515
- Becherer, A. (1952): Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizerflora (Gefäßpflanzen) in den Jahren 1950 und 1951. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 62: 527-582

- Becherer, A. (1954): Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizerflora (Gefäßpflanzen) in den Jahren 1952 und 1953. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 64: 355-389
- Becherer, A. (1960): Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizerflora (Gefäßpflanzen) in den Jahren 1958 und 1959. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 70: 62-112
- Becherer, A. (1966): Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) in den Jahren 1964 und 1965. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 76: 97-145
- Becherer, A. (1968): Fortschritte der Systematik und Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) in den Jahren 1966 und 1967. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 78: 210-244
- Becherer, A. (1971): Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) in den Jahren 1968 und 1969. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 80: 301-333
- Becherer, A. (1972): Führer durch die Flora der Schweiz mit Berücksichtigung der Grenzgebiete. Schwabe & Co
- Becherer, A. (1976): Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizerflora (Gefäßpflanzen) in den Jahren 1974 und 1975. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 86 (1/2): 1-55
- Becherer, A. u. M. Gyhr (1928): Kleine Beiträge zur badischen Flora. Beitr. Naturw. Erforsch. Badens 1: 1-5
- Becherer, A. u. W. Koch (1923): Zur Flora des Rheintals von Laufenburg bis Hohenthengen - Kaiserstuhl und der Gegend von Thiengen. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1 (11): 257-265
- Becherer, A., E. Steiger u. G. Lettau (1922): Die Flora des Naturschutzreservates an der Rheinhalde oberhalb Basel. Verh. Naturf. Ges. Basel 33: 127-217
- Beck, R. (1950): Pflanzensoziologische Untersuchungen über die Waldgesellschaften im Strom- und Heuchelberg. - Diss. Univ. Tübingen: 99
- Beck-Mannagetta, G. (1930): Orobanchaceae.- In: Engler A. (Hrsg.): Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV.261: 348
- Bedal, K. (1987): Ein Bauernhaus aus dem Mittelalter. Schr. Kataloge Fränk. Freilandmuseum Bad Windsheim 9: 232
- Bedal, K. (1994): Häuser aus Franken. Museumsführer Fränkisches Freilandmuseum in bad Windsheim. Schr. Kataloge Fränk. Freilandmuseum Bad Windsheim 21: 256
- Beger, H. (1932): Praktische Richtlinien der strukturellen Assoziationsforschung im Sinne der von der Zürich-Montpellier-Schule geübten Methode. Abderhaldens Handbuch biologischer Arbeitsmethoden Abt. XI 5: 481-526
- Behre, K.-E. (1992): The history of rye cultivation in Europe. Veget. Hist. Archaeobot. 1: 141-156
- Beinlich, B. u. H. Plachter (1995): Ein Naturschutzkonzept für die Kalkmagerrasen der Mittleren Schwäbischen alb (Baden-Württemberg): Schutz, Nutzung und Entwicklung. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspfl. Bad.-Württ. 83: 1-520
- Beisinger, G. (1955): Sonnentau-Vorkommen in Südhessen. Hess. Flor. Briefe 4 (44): 1-3
- Beisinger, G. (1958): Die Flora der Torflachen bei Viernheim an der hessisch-badischen Grenze. Hess. Flor. Briefe 7 (73): 2-3
- Beiter, M. (1991): Dauerbeobachtungsflächen in Naturschutzgebieten der Schwäbischen Alb. Anlage und vegetationskundliche Bestandsaufnahme in Kalkmagerasen der Zellerhornwiese, Beurener Heide und Kornbühl. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66: 31-106
- Bell, K. (1970): *Epipactis x pupplingensis* nov. hybr. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 23: 114-116
- Bellmann, H. et al. (1980): Landschaftsschutzgebiet Osterried bei Laupheim. Führer Natur- und Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 3: 1-78
- Belo-Correia, A. L. and M. F. Costa (1986): *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. e *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov. I. Revista de Biologia 13: 117-143
- Benl, G. u. A. Eschelmüller (1973): Über *Dryopteris remota* und ihr Vorkommen in Bayern Ber. Bayer. Bot. Ges 44: 101-141
- Bentham, G. u. J.D. Hooker (1862): Genera Plantarum, Vol. I, Pars 1: 454

- Benzing, A.G. u. H. Bibinger (1968): Vegetationskundliche Notizen über das Blindensee-Moor (Mittlerer Schwarzwald). Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 9 (4): 741-754
- Berg, C.C., u. R.C. Kaastra (1973): *Myosotis palustris* en *M. laxa* in Nederland. Gorteria 9: 141-150
- Berg, Ch. u. L. Meinunger (1989): Bryologische Literatur zum Gebiet der DDR, 1945-1987 (Nachtrag) G. Fischer Excerpta botanica, Sectio B, Sociologica 27 (1): 53
- Berg, Ch. u. L. Meinunger (1989): Bryologische Literatur zum Gebiet der DDR, 1945-1987. G. Fischer Excerpta botanica, Sectio B, Sociologica 26 (2): 127-162
- Berger, A. (1930): Crassulaceae. - In: Engler, A. (Hrsg.). W. Engelmann Die natürlichen Pflanzenfamilien 18a: 352-483
- Bergmaier, E. (1986): *Linaria arvensis* (L.) Desf. und *Corrigiola litoralis* L. auf Äckern des Gladenbacher Berglandes. Hess. Flor. Briefe 35 (1): 4-10
- Bergmaier, E. (1990): Liste der Bearbeiter von schwer unterscheidbaren Sippen der Flora Deutschlands. Flor. Rundbr. 1
- Bergmaier, E. (Zusammenstellung) (1994): Bestimmungshilfen zur Flora Deutschlands. Eine kommentierte bibliographische Übersicht. (Hrsg.: Zentralstelle für die Floristische Kartierung der Bundesrepublik Deutschland, Bereich Nord). E. Goltze, Gött. Flor. Rundbr. 4: 420
- Bergmann, C., K. Wegmann, K. Frischmuth, E. Samson, A. Kranz, D. Weigelt, P. Koll u. P. Welzel (1993): Stimulation of *Orobanche crenata* seed germination by (+)-Strigol and structural analogues dependence on constitution and configuration of the germination stimulants. Int. Journ. Plant Physiol. 142: 338-342
- Bergmann, G. (1982): Die Efeu-Sommerwurz (*Orobanche hederæ*) in Westfalen. Gött. Flor. Rundbr. 16 (1/2): 43
- Bernard, N. (1899): Sur la germination du *Neottia Nidus-Avis*. C. R. Séanc. Acad. Sci. 128: 1253-1255
- Bernström, P. (1952): Cytogenetic intraspecific studies in *Lamium*. I. Hereditas 38: 163-220
- Bernström, P. (1953): Cytogenetic intraspecific studies in *Lamium*. II. Hereditas 39: 381-437
- Bernström, P. (1955): Cytogenetic studies on relationships between annual species of *Lamium*. Hereditas 41: 1-122
- Bertsch, A. (1961): Untersuchungen zur spätglazialen Vegetationsgeschichte Südwestdeutschlands. Flora 151: 243-280
- Bertsch, K. (1905): Eine Xerothermkolonie am Rande des württembergischen Schwarzwaldes. Allg. Bot. Z. Syst. 1905: 1-4
- Bertsch, K. (1907): Hügel- und Steppenpflanzen im oberschwäbischen Donautal. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 63: 177-196
- Bertsch, K. (1909): Neue Glieder unserer subalpinen Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 65: 34-45
- Bertsch, K. (1911): Ein neuer Bürger der badischen Flora. Allg. Bot. Z. Syst. 17: 21-22
- Bertsch, K. (1911): Unsere sternhaarigen Fingerkräuter. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 67: 372-392
- Bertsch, K. (1912): Aus der Pflanzenwelt unserer Hochmoore. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 68: LIV-LXIV
- Bertsch, K. (1912): Studien aus der heimischen Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 68: 31-41
- Bertsch, K. (1913): Die Alpenpflanzen im oberen Donautal. Allg. Bot. Z. Syst. 19: 184-187
- Bertsch, K. (1914): Beiträge zur Kenntnis unserer Veilchen und Hieracien. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 70: 189-216
- Bertsch, K. (1915): Neue Gefäßpflanzen der württembergischen Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 71: 256-259
- Bertsch, K. (1917): Die Gebirgsrosen des oberen Donautales. Allg. Bot. Z. Syst. 22: 128-129
- Bertsch, K. (1918): Die tierfangenden Pflanzen Oberschwabens. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 74: 147-172

- Bertsch, K. (1918): Pflanzengeographische Untersuchungen aus Oberschwaben. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 74: 69-172
- Bertsch, K. (1919): Wärmepflanzen im oberen Donautal. Bot. Jahrb. Syst. 55 (3): 313-349
- Bertsch, K. (1920): Neue Gefäßpflanzen unserer Flora. Jahresh. Ver. vaterländ. Naturk. Württ. 76: 62-75
- Bertsch, K. (1922): Kalkliebende Pflanzen in Oberschwaben. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 78: 55-67
- Bertsch, K. (1924): Paläobotanische Untersuchungen im Reichermoos. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 80: 1-19
- Bertsch, K. (1925): Das Brunnholzried. Veröff. st. Stelle NatSchutz Württ. Landesamt Denkmpflege 2: 67-172
- Bertsch, K. (1926): Das Steinacher Ried bei Waldsee. Veröff. Staatl. Stelle Naturschutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 3: 32-41
- Bertsch, K. (1926): Pollenanalytische Untersuchungen an einem Moor der Schwäbischen Alb. Veröff. Staatl. Stelle Naturschutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 3: 7-27
- Bertsch, K. (1926): Über das ehemalige Vorkommen von *Rubus chamaemorus* im Schwenninger Moos. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 82: 50-51
- Bertsch, K. (1927): Das Brunnholzried. Veröff. staatl. Stelle Naturschutz Württ. Amt Denkmalpflege 2: 135-240
- Bertsch, K. (1928): Blütenstaubuntersuchungen im Federseegebiet. Veröff. Staatl. Stelle Naturschutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 4: 7-49
- Bertsch, K. (1928): Der Egelsee bei Gornhofen. Veröff. staatl. Stelle Naturschutz Württ. Amt Denkmalpflege 4: 55-68
- Bertsch, K. (1928): Steppenheidenpflanzen in Oberschwaben. Veröff. st. Stelle NatSchutz Württ. Landesamt Denkmpflege 4: 133-143
- Bertsch, K. (1928): Über das Vorkommen von drei seltenen Sumpforchideen in Württemberg. Veröff. staatl. Stelle Naturschutz Württ. Amt Denkmalpflege 4: 144-150
- Bertsch, K. (1929): Blütenstaubuntersuchungen im mittleren Neckargebiet. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 85: 1-42
- Bertsch, K. (1929): Wald- und Florengeschichte der Schwäbischen Alb. Veröff. staatl. Stelle Naturschutz Württ. Amt Denkmalpflege 5: 79-132
- Bertsch, K. (1931): Beitrag zur Waldgeschichte Württembergs. Veröff. Staatl. Stelle Naturschutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 7: 127-155
- Bertsch, K. (1931): Paläobotanische Monographie des Federseeriedes. Bibliotheca Bot. 26: 127 S.
- Bertsch, K. (1932): Die Pflanzenreste der Pfahlbauten von Sipplingen und Langenrain am Bodensee. Bad. Fundber. 2: 305-320
- Bertsch, K. (1932): Neue und verschollene Blütenpflanzen der württembergischen Flora. Veröff. st. Stelle NatSchutz Württ. Landesamt Denkmpflege 8: 101-108
- Bertsch, K. (1934): Neue Gefäßpflanzen der Württembergischen Flora Veröffentl. der Stelle f. Naturschutz beim Württ Amt f. Denkmalpfl. 11: 70-83
- Bertsch, K. (1941): Das Eriskircher Ried. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz 17: 57-146
- Bertsch, K. (1941): Früchte und Samen. - Handbücher der praktischen Vorgeschichtsforschung (Hrsg.: Reinerth, H.), Band 1 (4). Ferdinand Enke : 247
- Bertsch, K. (1941-1948): Beiträge zur Kenntnis unserer Flora. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 18: 145-185
- Bertsch, K. (1947): Der Wald als Lebensgemeinschaft
- Bertsch, K. (1947): Sumpf und Moor als Lebensgemeinschaft
- Bertsch, K. (1949): Beiträge zur Kenntnis unserer Flora. Die Gattung *Muscari* Veröffentl. für Natursch. u. Landschaftspf. B.-W. 18: 145-185

- Bertsch, K. (1949): Der Kleinfrüchtige Ackerfrauenmantel, *Aphanes microcarpa*, eine neue Blütenpflanze Württembergs. In: Beiträge zur Kenntnis unserer Flora. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 18: 145-185
- Bertsch, K. (1949): Die Samtrose des oberen Rißtales. In: Beiträge zur Kenntnis unserer Flora. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 18: 145-185
- Bertsch, K. (1951): Kritische Pflanzen unserer Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 106: 46-68
- Bertsch, K. (1951): Über das späteiszeitliche Vorkommen von *Artemisia* und *Helianthemum* im Federseegebiet. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 20: 69-73
- Bertsch, K. (1954): Vom neolithischen Feldbau auf der Schwäbischen Alb. Ber. Deutschen Bot. Ges. 67: 18-22
- Bertsch, K. (1955): Die Berg-Esparsette, eine verkannte Blütenpflanze der Schwäbischen Alb. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 110: 261-262
- Bertsch, K. (1958): Wildpflaumen unserer Heimat. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 26: 165-171
- Bertsch, K. (1961): Einheimische Wildäpfel. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 116: 185-194
- Bertsch, K. (1962): Flora von Südwest-Deutschland. Wiss. Verlagsgesellschaft : XI + 471
- Bertsch, K. (1991): Einige für die schwäbische Alb neue Rhinantheen. Allg. Bot. Z. Syst. 20: 147-148
- Bertsch, K. u. F. Bertsch (1933): Flora von Württemberg und Hohenzollern. J.F. Lehmann : VIII + 311
- Bertsch, K. u. F. Bertsch (1934, 1935): Neue Gefäßpflanzen der württembergischen Flora. Veröff. st. Stelle NatSchutz Württ. Landesamt DenkmPflege 11: 70-82
- Bertsch, K. u. F. Bertsch (1936, 1937): Neue Gefäßpflanzen der württembergischen Flora. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 13: 149-156
- Bertsch, K. u. F. Bertsch (1937): Das Wurzacher Ried. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 14: 59-146
- Bertsch, K. u. F. Bertsch (1947): Geschichte unserer Kulturpflanzen: 268
- Bertsch, K. u. F. Bertsch (1948): Flora von Württemberg und Hohenzollern. Zum Gebrauch auf Wanderungen, in Schulen und beim Selbstunterricht. Wiss. Verlagsgesellschaft: 485
- Beyerle, B. (1980): Orchideenporträts. Zeichnungen einheimischer Orchideen. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 12(1): 38-59
- Bibus, E. (1986): Die Rutschung am Hirschkopf bei Mössingen (Schwäb. Alb) - Geowissenschaftl. Rahmenbedingungen - Geoökolog. Folgen Geoökodynamik 7: 333-360
- Biebl, R. (1954): Lichtgenuß und Strahlenempfindlichkeit einiger Schattenmoose. Österr. Bot. Zeitschr. 101: 502-538
- Bierkamp, M., J.-U. Meinecke, J. Schedler u. D. Weizsäcker (1985): Das Naturschutzgebiet "Kapfhalde" Landkreis Tübingen. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 59/60: 175-268
- Billamboz, A. (1985): 2. Stand der Jahrringchronologien Oberschwabens und des Bodensees. In B. Becker et al.: Dendrochronologie in der Ur- und Frühgeschichte. Antiqua 11: 30-35
- Billamboz, A. (1990): Dendrochronologische Daten jungsteinzeitlicher Pfahlbausiedlungen am Gnadensee (Bodensee). Siedlungsarchäologie im Alpenvorland 2. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 37: 65-69
- Binz, A. (1901, 1905, 1911): Flora von Basel und Umgebung. 1. Aufl. XXXVIII+340 S.; 2. Aufl. XLIII+366 S.; 3. Aufl. XLIII+320 S. C.F. Lendorff
- Binz, A. (1910): Neuere Ergebnisse der floristischen Erforschung der Umgebung von Basel. Verh. Naturwiss. Ges. Basel 21: 126-144
- Binz, A. (1915): Ergänzungen zur Flora von Basel. I. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 26: 176-221
- Binz, A. (1922): Ergänzungen zur Flora von Basel. II. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 33: 256-280
- Binz, A. (1926): *Galanthus nivalis* L. im südlichen Schwarzwald. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 2: 17-18

- Binz, A. (1931): Floristische Beobachtungen in Baden. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 3 (4/5): 47-53
- Binz, A. (1934): Floristische Beobachtungen in Südbaden. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N. F. 3 (4/5): 47-53
- Binz, A. (1941/42): Ergänzungen zur Flora von Basel. III. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 53: 83-135
- Binz, A. (1945): Ergänzungen zur Flora von Basel. IV. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 56: 61-78
- Binz, A. (1951): Ergänzungen zur Flora von Basel. IV. u. V. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 62: 248-266
- Binz, A. (1956): Ergänzungen zur Flora von Basel. VI. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 67: 176-194
- Binz, A. u. W. Vischer (1956): Zur Flora des Rheinlaufes bei Basel. Verh. Naturwiss. Ges. Basel 67: 195-217
- Binz-Reist, H.-R. (1989): Mechanische Belastbarkeit natürlicher Schilfbestände durch Wellen, Wind und Treibzeug. Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel 101: 536 pp.
- Bisse, J. (1963): Ein Beitrag zur Kenntnis der deutschen Orchideenflora. Feddes Repert. 67: 181-189
- Biste, Ch. (1978): Zytotaxonomische Untersuchungen des Formenkreises *Achillea millefolium* (Asteraceae) in der DDR. Rep. spec. nov. reg. veg. (Feddes Repertorium) 88: 533-613
- Bittmann, E. (1953): Das Schilf (*Phragmites communis* Trin.) und seine Verwendung im Wasserbau. Angewandte Pflanzensoziologie 7: 47
- Blab, A. (1991): *Taraxacum nordstedtii* (sect. *Celtica*) - eine neue Art und eine Sektion der österreichischen Flora. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 128: 41-46
- Blacha, G. (1970): Zwei neue Standorte von *Veratrum album* Jh. Ges. Naturkde. Württ. 125: 313
- Blatt, H. (1981): *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich. und *Orchis simia* Lam. - zwei Dokumente im Herbarium Senckenbergianum. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Hessen 3(2): 63-66
- Blatt, H., A. Grube u. H. Schulz (1983): Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Hessen. : 129
- Blaufuss, A. u. H. Reichert (1992): Die Flora des Nahegebietes und Rhein Hessens *Pollichia* Buch 26: 1061
- Blazkova, D. (1971): Zu den phytozoologischen Problemen der Assoziation *Caricetum gracilis* Almquist 1929. Folia Geobot. Phytotax. 6: 43-80
- Blezing, R. (1884): Pflanzen. In: Beschreibung des Oberamts Crailsheim: 43-59
- Böcher, T.W. u. K. Larsen (1957): Cytotaxonomical studies in the *Chrysanthemum leucanthemum* complex. *Watsonia* 4: 11-16
- Bock, A. (1986): Vegetationskundliche Untersuchungen in einer "historischen Weinbergslandschaft" bei Unterjesingen (Stadt Tübingen). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 61: 335-348
- Bock, H. (1539): Neu Kreüter Buch von Unterscheydt Würckung und Namen der Kreütter so in Teutschen Landen wachsen.
- Böcker, R., P. Erzberger u. H. Scholz (1990): *Bromus diandrus* Roth - Berliner Populationen. Verh. Berl. Bot. Ver. 8: 93-96
- Bogenrieder, A. (1982): Pflanzenwelt. Die Flora der Weidfelder, Moore, Felsen und Gewässer. In: Der Feldberg im Schwarzwald. Subalpine Insel im Mittelgebirge. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 12: 244-316
- Bogenrieder, A. (1991): Exkursion zum Feldberg (21. u. 22. Juli 1990). *Tuexenia* 11: 467-472
- Bogenrieder, A. et al. (1982): Der Feldberg im Schwarzwald - Subalpine Insel im Mittelgebirge. Landesanstalt für Umweltschutz Bad.-Württ. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 12
- Bogenrieder, A. u. A. v. Stietenron (1985): Morphologische und cytologische Untersuchungen an *Anthoxanthum alpinum* A. & D. Löve und *Anthoxanthum odoratum* L. vom Feldberg im Schwarzwald *Carolinea* 42: 51-56

- Bogenrieder, A. u. G. Hügin (1978): Zustand des Waldes in der Rheinniederung zwischen Grißheim und Sasbach - Region Südlicher Oberrhein - (1976). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 11: 237-246
- Bogenrieder, A. u. H. Werner (1979): Experimentelle Untersuchungen an zwei Charakterarten der Eisseggenflur des Feldbergs (*Carex frigida* All. und *Soldanella alpina* L.). Beitr. naturk. Forsch. Südwestdeutschl. 38: 61-69
- Bogenrieder, A. u. M. Bühler (1991): 3. Zwischen Beharren und Wandel - Pflanzengesellschaften unter dem Einfluß des wirtschaftenden Menschen. Ber. Naturf. Ges. Freiburg 81: 25-64
- Bogenrieder, A. u. O. Wilmanns (1968): Zur Floristik und Ökologie einiger schneegeprägter Standorte im Naturschutzgebiet Feldberg (Schwarzwald). Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 36: 7-26
- Bogenrieder, A. u. O. Wilmanns (1991): Der Einfluß von Schaf- und Rinderbeweidung auf die Weidfeldvegetation der Feldbergkuppe. Eine Auswertung langjähriger Beobachtungsreihen. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66: 7-30
- Bogenrieder, A., M. Bühler u. P. Härringer (1993): *Anthoxanthum odoratum* L. und *Anthoxanthum alpinum* A. & D. Löve am Feldberg (Schwarzwald). Ein Beispiel für Höhenvikarianz *Carolina* 51: 41-50
- Böger, K. (1992): Neue Funde der adventiven Kamm-Quecke (*Agropyron cristatum* (L.) Gaertner ssp. *pectinatum* (Bieb.) Tzvelev) im nördlichen Oberrheingebiet *Hessische Floristische Briefe* 41 (2): 27-30
- Bogner, J. u. D.H. Nicolson (1991): A revised classification of Araceae with dichotomous keys *Wildenowia* 21: 35-50
- Böhling, N. (1996): *Poa alpina* L. in Südwestdeutschland. *Carolina* 54: 177-180
- Böhm (1884): Neue Standorte *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 13: 120-123
- Bohn, U. (1990): Über natürliche Vorkommen der Bergweidenröschen-Rubrechtskraut-Saumgesellschaft (*Epilobio-Geranietum robertiani* Lohm. In Oberd. et al. 1967) und das soziologische Verhalten von *Cynoglossum geranicum* Jacq. in der Rhön. *Tuexenia* 10: 137-145
- Bollinger, M. (1978): Die *Pulmonaria obscura-officinalis*-Gruppe in der Schweiz. *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 88 (1/2): 30-62
- Bollinger, M. (1982): Die Gattung *Pulmonaria* in Westeuropa. - *Phanerogamarum Monographiae, Tomus VIII.* J. Cramer: 215
- Bollinger, M. (1990): 465. *Pulmonaria* L., Lungenkraut. In: Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz (Hrsg.: Heitz, Ch.). Schwabe & Co : 383-385
- Bonnemaison, F. u. D.A. Jones (1986): Variation in alien *Lotus corniculatus* L. 1. Morphological differences between alien and native British plants. *Heredity* 56: 129-138
- Bonnet, A. (1887): Beiträge zur Karlsruher Flora. *Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden* 1 (37/38): 323-335
- Bor, N.L. (1971): Gramineae of Iraq. *Candollea* 26 (1): 91-95
- Bornkamm, R. (1961): Zur Konkurrenzkraft von *Bromus erectus* *Bot. Jb.* 80: 466-479
- Bornkamm, R. (1984): Experimentell-ökologische Untersuchungen zur Sukzession von ruderalen Pflanzengesellschaften. II. Quantität u. Qualität der Phytomasse *Flora* 175: 45-74
- Bornkamm, R. (1985): Veränderungen der Phytomasse und Vegetationsentwicklung. In: Wolf, G. (Red.): Primäre Sukzession auf kiesig-sandigen Rohböden im Rheinischen Braunkohlenrevier *Schriftenreihe für Vegetationskunde* 16: 111-151
- Bornkamm, R. u. W. Schrade (1981): Über die Interferenz von Arten unterschiedlicher Lebensform am Beginn einer ruderalen Sukzession *Poster zu Verh. Ges. Ökologie* 9: 197-202
- Borre, A. van den and L. Watson (1994): The infrageneric classification of *Eragrostis* (Poaceae) *Taxon* 43: 383-422
- Borrill, M. (1958): A biosystematic study of some *Glyceria* species in Britain *Watsonia* 4/2: 89-100
- Boston, H.L. u. M.S. Adams (1987): Productivity, growth and photosynthesis of two small "isoetid" plants, *Littorella uniflora* and *Isoetes macrospora*. *J. Ecol.* 75: 333-350

- Botanik-Zirkel der Firma Thomae (1981): Naturschutzgebiet Lindenweiher, Botanische Bestandsaufnahme 1977/78 Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 53/54: 313-356
- Böttcher, H. (1974): Bibliographie zum Problem der Sukzessionsforschung mit Hilfe von Dauerquadraten und der Vegetationskartierung Excerpta botanica, Sectio B, Sociologica 14 (1): 35-56
- Böttcher, H. (1975): Stand der Dauerquadratforschung in Mitteleuropa. In: Sukzessionsforschung Ber. Int. Symp. Int. Ver. f. Veg.kunde Rinteln: 31-38
- Böttcher, W. u. E.J. Jäger (1984): Zur Interpretation der Verbreitung der Gattung *Sedum* L. s. l. (Crassulaceae) und ihrer Wuchsformtypen. Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturw. Reihe 33 (1): 127-141
- Bottler, M. (1882): Exkursions-Flora von Unterfranken. Ein Taschenbuch zum leichten Bestimmen der in Unterfranken, auf dem Steigerwald und in der Rhön wildwachsenden Phanerogamen.
- Bouchette, A. u. M. Rösch (1996): Keltische Pflanzenfunde aus Riedlingen, Kreis Biberach. Archäol. Ausgrab. Bad.-Württ. 1995: 132-137
- Boulos, L. (1960): Cytotaxonomic studies on the genus *Sonchus* 2: The genus *Sonchus*, a general systematic treatment. Bot. Notiser 113: 400-420
- Bovet, J. (1958): Contribution à l'Etude des "Races écologiques" du frêne, *Fraxinus excelsior* L. Schweiz. Zeitschr. Forstwesen 109: 536-546
- Boyce (1993): The Genus *Arum* The Royal Botanic Gardens, A Kew Magazine Monograph
- Bradshaw, M.E. (1963): Studies on *Alchemilla filicaulis* Bus., sensu lato, and *A. minima* Walters. *Watsonia* 5: 304-326
- Brand, A. (1913): Hydrophyllaceae. - In: Das Pflanzenreich (Hrsg.: A. Engler), 59. Heft (IV. 251). W. Engelmann: 210
- Brandes, D. (1977): Über *Onopordum acanthium*-Gesellschaften in Mitteleuropa. Documents Phytosociologiques, N.S. I: 23-31
- Brandes, D. (1982): Überblick über die Literaturinformation in der Pflanzensoziologie *Phytocoenologia* 10 (3): 375-381
- Brandes, D. (1985): Zur Verbreitung und Soziologie von *Salvia nemorosa* L. in Mitteleuropa. *Gött. Flor. Rundbr.* 19 (1): 29-34
- Brandes, D. (1988): Die Vegetation gemähter Straßenränder im östlichen Niedersachsen. *Tuexenia* 8: 181-194
- Brandes, D. (1989): Zur Soziologie einiger Neophyten des insubrischen Gebietes. *Tuexenia* 9: 267-274
- Brandes, D. (1991): Die Ruderalvegetation der Altmark im Jahre 1990. *Tuexenia* 11: 109-120
- Brandes, D. (1992): Flora und Vegetation von Stadtmauern. *Tuexenia* 12: 315-339
- Brandes, D. (1993): Eisenbahnanlagen als Untersuchungsgegenstand der Geobotanik. *Tuexenia* 13: 415-444
- Brandes, D. (1993): Zur Ruderalflora von Verkehrsanlagen in Magdeburg. *Flor. Rundbr.* 27 (1): 50-54
- Brandes, D. (1994): Verbreitung, Ökologie und Soziologie von *Scorzonera laciniata* L. in Nordwestdeutschland. *Tuexenia* 14: 415-424
- Brandes, D. u. C. Janßen (1991): *Artemisia annua* L.- ein auch in Deutschland eingebürgerter Neophyt. *Flor. Rundbr.* 25 (1): 28-36
- Brändle, M. u. H. Bamberger (1995): Vegetation und Fauna des Natur- und Landschaftsschutzgebietes Ochsenberg-Litzelstetten (Löffingen, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 70: 339-392
- Brandt, J.P. (1961): Cytotaxinomie et cytogéographie de *Veronica prostrata* L. *Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat.* 84: 35-88
- Braun, A. (1824): Correspondenz. Über einige Pflanzen bei Carlsruhe *Flora* 7: 108-110
- Braun, A. (1834): Ueber das italienische Raigras. *Flora* 17: 241-253

- Braun, H. (1890): II. Seltener und interessanter Pflanzen aus der Umgebung von Biberach. Correspondenzbl. für die Gelehrten- und Realschulen Württ. 37: 4-17
- Braun, W. (1968): Die Kalkflachmoore und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften im Bayerischen Alpenvorland. J. Cramer Diss. Bot. 1: 134
- Braun, W. (1986): Die Gabelästige Hirse, *Panicum dichotomiflorum* Michx., eine neue Art der bayerischen Flora. Ber. Bayer. Bot. Ges. 57: 75-80
- Braun-Blanquet, J. (1931): Die Trockenrasengesellschaften des Hegaus und ihre Genese. Veröff. st. Stelle NatSchutz Württ. Landesamt DenkmPflege 7: 59-65
- Braun-Blanquet, J. (1931): Die Trockenrasengesellschaften des Hegau und ihre Genese. Beitr. Naturdenkmalpflege 14: 230-242
- Braun-Blanquet, J. (1931): Zur Vegetation der oberrheinischen Kalkhügel. Beitr. Naturdenkmalpflege 14 (3): 281-292
- Braun-Blanquet, J. (1959): Grundlagen und Aufgaben der Pflanzensoziologie Vistas in Botany : 145-171
- Braun-Blanquet, J. (1961): Die inneralpine Trockenvegetation. G. Fischer : IX + 273
- Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie
- Braun-Blanquet, J. u. E.A. Rübel (1932-1935): Flora von Graubünden. Vorkommen, Verbreitung und ökologisch-soziologisches Verhalten der wildwachsenden Gefäßpflanzen Graubündens und seiner Grenzgebiete. 4 Bände. H. Huber: 1695
- Braun-Blanquet, J. u. M. Moor (1938): Verband des Bromion erecti. Prodrum der Pflanzengesellschaften 5: 64
- Braun-Blanquet, J. u. R. Sutter (Hrsg.) (1983): Zur Vegetation der Engadiner Wildläger. Tuexenia 3 (Festschrift H. Ellenberg): 319-323;
- Braun-Blanquet, J. u. W. Koch (1928): Beitrag zur Flora Südbadens. Beitr. Naturw. Erforsch. Badens 1: 5-8
- Braun-Blanquet, J.O. Elwert, A. Faber, A. Funk, D. Geyer, R. Lohrmann, H. Schwenkel u. R. Tüxen (1931): Der Hohentwiel. Veröff. st. Stelle NatSchutz Württ. Landesamt DenkmPflege 7: 5-94
- Braunsteffer, P. (1941): Botanische Exkursion nach dem Naturschutzgebiet bei Nächstenbach unweit Weinheim a.d.B. Verh. Naturhist.-Med. Ver. Heidelberg, zool.-bot. Sekt: 2
- Braunsteffer, P. (1958): Botanische Exkursion zur "Viernheimer Lache". Hess. Flor. Briefe 7 (75): 3-4
- Bräutigam, S. (1972): *Hieracium laevigatum* WILLD. und *Hieracium lachenalii* GMELIN im Westerbirge - Ein Beitrag zur taxonomischen Untergliederung und der Pflanzensoziologie dieser Arten. Diss. Univ. Halle-Wittenberg.
- Bräutigam, S. (1974): Die Verwertbarkeit der Merkmale von *Hieracium laevigatum* WILLD. für die infraspezifische Gliederung (Beiträge zur Kenntnis von *Hieracium laevigatum* WILLD., II). Flora 163: 163-177
- Bräutigam, S. u. H.D. Knapp (1974): Zur Verbreitung und Soziologie von *Hieracium wiesbaurianum* Uechtr. Feddes Repertorium 85: 7-16
- Bräutigam, S. u. V. (1968): Zur Kenntnis der mitteldeutschen *Oreadea* (Gattung *Hieracium* L.) unter besonderer Berücksichtigung von *Hieracium saxifragum* Fries und *Hieracium norvegicum* Fries. Ber. Arbeitsgem. Sächs. Botaniker N.F. 8: 123-140 ("1967/68")
- Breiter, M. (1990): Dauerbeobachtungsflächen in Naturschutzgebieten der Schwäbischen Alb. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66: 31-106
- Brenan, J.P.M. (1950): *Artemisia verlotiorum* Lamotte and its occurrence in Britain. Watsonia 1: 209-223
- Brenzinger, C. (1887): Seltene Pflanzen bei Buchen. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (35/36): 320-322
- Brenzinger, C. (1904): Flora des Amtsbezirks Buchen. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (196-199): 385-416
- Bresinsky, A. (1959): Die Vegetationsverhältnisse der weiteren Umgebung Augsburgs. Ber. Naturf. Ges. Augsburg 11: 1-233

- Bresinsky, A. (1965): Zur Kenntnis des zirkumalpinen Florenelements im Vorland nördlich der Alpen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 38: 5-67
- Bresinsky, A. (1974): Notizen zur Unterscheidung nichtblühender Arten. Mitt. Arbeitsgem. zur florist. Kart. Bayerns 4: 18-19
- Bresinsky, A. (1978): Ziele, Probleme und Ergebnisse der floristischen Kartierung Bayerns, dargestellt am Beispiel von *Sorbus aria* agg. Hoppea 37: 241-272
- Bresinsky, A. u. J. Grau (1963): *Myosotis rehsteineri* Wartm. am Starnberger See. Ber. Bayer. Bot. Ges. 36: 64
- Bresinsky, A. u. P. Schönfelder (1977): Anmerkungen zu einigen Musterkarten für einen Atlas der Flora Bayerns (4). Mitt. Arbeitsgem. zur florist. Kart. Bayerns 7: 20-32
- Brettschneider, J. (1962): Bestimmungsschlüssel der europäischen Sippen der Gattung *Glechoma* L. *Drudea* 2: 69-71
- Breuer, H. (1971): Beitrag zur xerothermen Moos- und Flechtenvegetation und Flora im Urftal zw. Sötenich und Nettersheim (Eifel). *Decheniana* 123: 121-134
- Breunig, T. (2001): Das Kahle Labkraut (*Cruciata glabra*) in Südwestdeutschland. Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 11-17
- Breunig, T. (2001): Neue Fundorte - Bestätigungen - Verluste (1-13). Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 66-70
- Breunig, T. (2003): Neue Fundorte - Bestätigungen - Verluste (97 - 242). Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland 2: 129-146
- Breunig, T. (2005): Die Verbreitung des Sommerfliederes (*Buddleja davidii*) in Baden Württemberg, Die Pflanzenpresse, Nr.11: S. 30-32
- Breunig, Th. (1993): Flugsandgebiete und ihre Vegetation in der badischen Oberrheinebene. In: Förderprojekte der Stiftung Naturschutzfonds. Symposium 15. Februar 1993. Her. LFU Bad.-Württ.: 37-53
- Breunig, Th. (1994): Flora und Vegetation der Sandhausener Dünen "Pferdstrieb" und "Pflege Schönau-Galgenbuckel". Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80: 29-95
- Breunig, Th. u. A. König (1988): Grundlagenuntersuchungen über Dünenstandorte und Sandrasenvegetation. - Gutachten für die Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 2 Bände. : 135 S. u. 134
- Breunig, Th. u. J. Schach (1989): Ein Fund des Scheiden-Gelbsterns (*Gagea soathacea*) in der nordbadischen Rheinebene. *Carolinea* 47: 151-152
- Brielmaier, G. W. (1950): Die Moor-Orchidee *Liparis*. *Aus der Heimat* 58: 243-245
- Brielmaier, G. W. (1959): Neues zur Flora Oberschwabens. *Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 114: 80-95
- Brielmaier, G. W. (1964): Die Seen bei Primisweiler unter Landschaftsschutz. *Naturschutz Oberschwaben-Bodensee-Hegau* 5: 13-16
- Brielmaier, G. W. (1965): Nachtrag 1964 zur Ulmer Flora von Karl Müller. *Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm* 27: 25-72
- Brielmaier, G. W. (1965): Streifzüge durch die Pflanzenwelt der Argentaler. *Naturschutz Oberschwaben-Bodensee-Hegau* 6: 18-35
- Brielmaier, G. W. u. S. Künkele (1969): Die Moororchidee *Hammarbya paludosa* (L.) O.Kuntze. *Jahresh. Ges. Naturk. Württ.* 124: 157-171
- Brielmaier, G. W. u. S. Künkele (1970): Zur Verbreitung von *Spiranthes aestivalis* (Poir.)Rich. in Baden-Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 38: 7-33
- Brielmaier, G. W. u. W. Enderle (1975): Zur Verbreitung von *Listera cordata* (L.)R. Br. (Herz-Zweiblatt) in Oberschwaben und im Gesamtallgäu. *Jahresh. Ges. Naturk. Württ.* 130: 222-235
- Brielmaier, G. W., S. Künkele u. E. Seitz (1975): Zur Verbreitung von *Liparis loeselii* (L.)Rich. in Baden-Württemberg Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 42: 7-68
- Briemle, G. (1980): Untersuchungen zur Verbuschung und Sekundärbewaldung von Moorbrachen im südwestdeutschen Alpenvorland. *Diss. Bot.* 57: 286

- Briemle, G. (1988): Ist eine Schafbeweidung auf den Magerrasen der Schwäbischen Alb notwendig? Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 63: 51-67
- Briemle, G. u. H. Ellenberg (1994): Zur Mahdverträglichkeit von Grünlandpflanzen - Möglichkeiten der praktischen Anwendung von Zeigerwerten. W. Kohlhammer Natur und Landschaft 69: 139-147
- Brod, G. (1968): Untersuchungen zur Biologie und Ökologie der Hühner-Hirse *Echinochloa crus-galli* L. Beauv. Weed Res. 8: 115-127
- Brodbeck, T. (1996): Vegetationsskizzen an der Dinkelberg-Südwestecke. Bauhinia 11(4): 287-305
- Brodbeck, Th. u. M. Zemp (1986): Über einige kritische Gattungen und Sippen in der Umgebung von Basel. Bauhinia 8: 157-169
- Bronner, G. (1986): Pflanzensoziologische Untersuchungen an Hecken- und Waldrändern der Baar. Ber. Naturf. Ges. Freiburg 76: 11-85
- Brouwer, W. u. A. Stählin (1955): Handbuch der Samenkunde. DLG-Verlag: 656
- Browicz, K. (1963): The genus *Colutea* L. A Monograph. Monographiae Botanicae 14: 1-136
- Browicz, K. (1976): *Lonicera*. - In: Flora Europaea, Vol. 4 (Hrsg.: Tutin et al.): 46-48
- Brown, R. (1833): On the organs and mode of fecundation in Orchideae and Asclepiadeae. Trans, Linn. Soc. London 16: 685-745
- Bruch, Ph., W.Ph. Schimper u. Th. Gümbel (1971): Bryologia Europaea. Rearranged by P.A. FLORSCHÜTZ & W.D. MARGADANT. Sectio III: Tabulae A. Asher & Co. N.V. 3: 1-681
- Brücher, H. (1982): Die sieben Säulen der Welternährung Waldemar Kramer: 208
- Bruder, K. (1992): Positive Auswirkungen von Pflegemaßnahmen auf einige Orchideenarten an einem Beispiel aus der Vorbergzone des Schwarzwaldes bei Ettenheim. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Bad.-Württ. 24(3): 531-539
- Bruder, K. u. E. Rennwald (1990): Orchideen auf Gemarkung Ettenheim - Ergebnisse einer verfeinerten Kartierungsmethode. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Bad.-Württ. 22(2): 237-305
- Bruhni, T.A. (1894): *Bauhinus redivivus*, d.i. Caspar Bauhin's Verzeichnis der Pflanzen Basels im neuen Kleide. Beil. Deutsch. Bot. Monatsschr. 1894
- Brummitt, R.K. (1971): The diagnostic characters of European *Heliotropium* species. J. Linn. Soc., Bot. 64: 60-67
- Brummitt, R.K. (1972): *Heliotropium* L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press : 84-86
- Brummitt, R.K. (1988): Report of the Committee for Spermatophyta. Taxon 34: 139-140
- Brummitt, R.K. (1994): Report of the Committee for Spermatophyta: 42. Analysis of recommendations between the 1987 and 1993 Botanical Congress Taxon 43: 459-461
- Brun - Hool, J. (1963): Ackerunkraut-Gesellschaften der Nordwestschweiz. Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz 43: 146
- Brunfels, O. (1532-1537): Contrafayt Kreüterbuch ... 2 Bände. Schott
- Brunfels, O. (1532-1539): Herbarum vivae eicones ad naturae imitationem, ... 3 Bände. Schott
- Brunner, F. (1851): Flora. In: Rehmann, E. u. F. Brunner: Gaea und Flora der Quellenbereiche der Donau und Wutach. Beitr. Rhein. Naturgesch. Freiburg 2: 34-107
- Brunner, F. (1882): Verzeichnis der wildwachsenden Phanerogamen und Gefäßkryptogamen des Thurgauischen Bezirks Diessenhofen, des Randens und des Höhgaus. Mitt. Thurgauischen Naturf. Ges. 5: 11-61
- Brunner, F. u. E. Rehmann (1851): Gaea und Flora der Quellbezirke von Donau und Wutach. Beitr. Rhein. Naturgesch. Freiburg 2: 34-107
- Bruns, D. (1992): Beitrag zur Planung von Ersatzbiotopen gemäß § 8 Bundesnaturschutzgesetz am Beispiel von Sukzessionsflächen auf Lehm. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 65: 1-124
- Brusoni, M. (1991): Studio sulla variabilità intraspecifica di *Echinochloa crus-gallis* (L.) P. B. Atti Ist. Bot. e Lab. Critt. 10: 39-88

- Buchli, M. (1936): Ökologie der Ackerunkräuter der Nordost-Schweiz. Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz 19: 354
- Buck-Feucht, G. (1980): Vegetationskundliche Beobachtungen im Schonwald "Hohes Reisach" bei Kirchheim/Teck. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 51/52 (2): 479-513
- Bücking, W. (1982b): Zur Vegetationsentwicklung in Waldschutzgebieten am Beispiel einiger der älteren Bannwälder Baden-Württembergs. In: Urwald-Symposium Wien 1982 IUFRO-Gruppe Urwald : 101-119
- Bücking, W. (1983): Vegetationskundliche Forschung im Bannwald Untereck Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58: 157-170
- Bücking, W. (1984): Darstellung und Auswertung vegetationskundlicher Dauerbeobachtungen im Bannwald Untereck Mitt. Forstl. Versuchs- u. Forschungsanstalt Baden-Württ. 108: 115-122
- Bücking, W. (1986): Study of vegetation changes in natural forest reserves in South-West-Germany. In: Forest dynamics research in Western and Central Europe: 231-241
- Buhl, A., H.D. Knapp u. H. Meusel (1974): Verbreitungskarten hercynischer Leitpflanzen, 14. Reihe. Hercynia N.F. 11: 89-171
- Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und Geologische Landesämter in der BRD (Hrsg) (1982): Bodenkundliche Kartieranleitung. Schweizerbart : 331
- Burt, L.B. u. D.L. Vinall (1990): *Artemisia biennis* in East Sussex. Dept. of Botany National Museum of Wales B.S.B.I. News 54: 16
- Büscher, D. (1991): Über die Erforschung der Wolladventivflora von Kettwig/Rhld. und Dülmen/Westf. durch den Dortmunder Apotheker Julius Herbst in den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts. Flor. Rundbr. 25 (1): 40-45
- Buschle, A. (1980): Die Pflanzenwelt.- In: Bellmann, H. et al.: Landschaftsschutzgebiet des Osterrieds bei Laupheim. Führer Natur- und Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 3: 16-35
- Buser, R. (1894): Zur Kenntnis der schweizerischen Alchimillen. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 4: 41-80
- Bushart, M. (1988): Floristische Beobachtungen im westlichen Hunsrück. Decheniana 141: 42-88
- Bussmann, R. (1988): Die Orchideen des Meßtischblatts 8225- Kießlegg. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Bad.-Württ. 20(3): 519-609
- Bussmann, R. u. R. Rieks (1985): Orchideenkartierung auf den Meßtischblättern 8126 (Leutkirch-Ost) und 8225 (Kießlegg). Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Bad.-Württ. 17(2): 186-303
- Buttler, K. P. (1976): *Anthoxanthum alpinum* Löve & Löve. - In Buttler, K. P. u. W. Lippert: Hinweise zur Kartierung kritischer Sippen in Bayern Mitt. Arbeitsgem. Florist. Kart. Bayerns 6: 20-24
- Buttler, K. P. (1980): *Dipsacus strigosus* Roemer et Schultes als Neubürger in Frankfurt. Hess. Flor. Briefe 29 (4): 63-65
- Buttler, K. P. (1981): *Linaria genistifolia* (L.) Miller seit 30 Jahren bei Großauheim. Hess. Flor. Briefe 30 (4): 54
- Buttler, K. P. (1985): Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen (und angrenzenden Ländern), 3. Folge. Hess. Flor. Briefe 34: 37-42
- Buttler, K. P. (1986): Orchideen. Die wildwachsenden Arten und Unterarten Europas, Vorderasiens und Nordafrikas: 287
- Buttler, K. P. (1989): *Leonurus cardiaca*. In: Literaturberichte. A. Floristik und Systematik. Botanik und Naturschutz in Hessen 3: 61-63
- Buttler, K. P. (1997): Zweiter Nachtrag zum Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens. Ber. Naturschutz Hessen 9: 125-163
- Buttler, K. P. u. U. Schippmann (1993): Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens (Erste Fassung). Botanik und Naturschutz in Hessen 6: 476
- Buttler, K. P. u. W. Stieglitz (1976): Floristische Untersuchungen im Meßtischblatt 6417 (Mannheim-Nordost). Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 35: 9-51
- Butzin, F. (1980): Bestimmungsschlüssel für deutsche Orchideen im Fruchtzustand. Die Orchidee 31(5): 186-195

- Butzke, H. (1986): Zur geographischen und standörtlichen Verbreitung der Echten Mispel (*Mespilus germanica* L.) im westlichen Teil Nordrhein-Westfalens und über die Eigenschaften des Mispelholzes. *Decheniana* 139: 178-192
- Byatt, J.I. (1976): The structure of some *Crataegus* populations in north-eastern France and south-eastern Belgium. *Watsonia* 11 (2): 105-115
- Cajander, A. (1935): Über die fennoskandischen Formen der Kollektivart *Carex polygama* Schkuhr. *Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo* 5: 1-117
- Camenisch, M. (1991): Autökologische Aspekte bei *Senecio hercynicus* Herborg subsp. *hercynicus* und *S. ovatus* (Gärtner, Mayer & Scherbius) Willdenow subsp. *alpestris* (Gaudin) Herborg (*Senecio nemorensis*-Gruppe, Asteraceae/Compositae). *Bot. Helv.* 101 (2): 149-158
- Camus, E.-G. (1900): *Alchimilla*. In: Rouy, G. et E.-G. Camus: *Flore de France.* 6: 439-459
- Camus, E.G., P. Berger u. A. Camus (1921-1928): *Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen.* : 559+72
- Candolle, A.P. de (1837): *Prodromus.* Vol. 6.
- Canne, J.M. (1977): A revision of the genus *Galinsoga* (Compositae: Heliantheae). *Rhodora* 79 (819): 319-389
- Carbiener, R. (1969): Subalpine primäre Hochgrasprärien im herzynischen Gebirgsraum Europas, mit besonderer Berücksichtigung der Vogesen und des Massif Central Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 14: 322-345
- Carbiener, R. (1974): Die linksrheinischen Naturräume und Waldungen der Schutzgebiete von Rhinau und Daubensand (Frankreich): eine pflanzensoziologische und landschaftsökologische Studie. *Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ.* 7: 438-535
- Carbinier, R. (1970): Frostmusterböden, Solifluktion, Pflanzengesellschaftsmosaik und -Struktur, erläutert am Beispiel der Hochvogesen. In: *Gesellschaftsmorphologie (Strukturforschung)* JunkBer. Int. Symp. Int. Ver. f. Veg.kunde Rinteln : 187-217
- Caspary, R. (1870): Die *Nuphar* der Vogesen und des Schwarzwaldes. *Abh. Naturf. Ges. Halle* 11: 181-270
- Casper, S.J. (1962): Revision der Gattung *Pinguicula* in Eurasien. *Feddes Repertorium* 66 (1/2): 1-148
- Casper, S.J. (1963): Gedanken zur Gliederung der Gattung *Pinguicula* L. *Bot. Jahrb. Syst.* 82 (3): 321-335
- Casper, S.J. (1966): Monographie der Gattung *Pinguicula* L. *Bibliotheca Bot.* (Hrsg.: H. Melchior) 127/128: 209
- Casper, S.J. (1967): Die Gattung *Utricularia* L. (Lentibulariaceae) im thüringisch-sächsischen Raume. *Limnologica* 5 (1): 81-104
- Casper, S.J. (1967): Die Gattung *Utricularia* L. (Lentibulariaceae) in Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. *Limnologica* 5 (3): 367-396
- Casper, S.J. (1972): *Pinguicula*. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 294-296
- Casper, S.J. (1974): Lentibulariaceae. - In: *Hegi, G. (Begr.) Illustrierte Flora von Mitteleuropa IV/3* (Hrsg.: Hartl, D. u. G. Wagenitz). C. Hanser VI/1: 506-550
- Casper, S.J. u. H. Manitz (1975): Beiträge zur Taxonomie und Chorologie der mitteleuropäischen *Utricularia*-Arten. *Feddes Repertorium* 86 (4): 211-232
- Casper, S.J. u. H.-D. Krausch (1980): Pteridophyta und Anthophyta. 1. Teil. In: *Ettl., H. et al. (Hrsg.): Süßwasserflora von Mitteleuropa.* 23: 1-403
- Casper, S.J. u. H.-D. Krausch (1981): Pteridophyta und Antophyta, Teil 2: Saururaceae bis Asteraceae. - *Süßwasserflora von Mitteleuropa* (Hrsg.: Ettl, H., J. Gerloff und H. Heynig). G. Fischer 24: 409-942
- Cenci, C.A. & al. (1990): *Festuca arundinacea* Schreber (Gramineae) in Italy: morphological, anatomical, karyological and biochemical analyses. *Webbia* 44 (2): 255-270
- Chamberlain, D.F. (1978): *Anchusa* L. - In: *Flora of Turkey* (Hrsg.: Davis, P.H.). Univ. Press 6: 388-402

- Charpin, A. u. M. Luceno (1993): Typification de quelques Carex des herbiers de Genève. *Candollea* 48: 465-468
- Chase et al. (1995): Molecular phylogenetics of Liliaceae. Royal Botanic Gardens, Kew. Rudal et al. (Ed.): *Monocotyledons: Systematic and Evolution* : 109-137
- Chase, A. (1951): Hitchcock, Manual of the Grasses of the United States. Vol 1
- Chater, A. O. (1980): Carex In: Tutin, T. G. et al. (eds.): *Flora Europaea* 5: 290-323
- Chater, A.O. (1972): Anchusa L. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 106-109
- Chater, A.O. (1972): Lappula Gilib. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 117-118
- Chater, A.O. (1972): Nonea Medicus. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 102-103
- Chater, A.O. u. D.A. Webb (1972): Orobanche L. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 286-293
- Chattopadhyay, R. (1986): Bericht über die AHO-Exkursion vom 18.05.85 im Oberrheintal. *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 18(2): 296-304
- Chattopadhyay, R. (1991): Zur Entwicklung und Verbreitung von *Ophrys apifera* Huds. im Stadtgebiet Stuttgart. *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 23(1): 122-154
- Christ, H. (1873): Die Rosen der Schweiz mit Berücksichtigung der umliegenden Gebiete Mittel- und Süd-Europas. Ein monographischer Versuch. H. Georg : 219
- Christ, H. (1913): Eine Basler Flora von 1622. *Basler Z. Gesch. Altertum.* 12(1): 1-13
- Christensen, K.I. (1985): A taxonomic study of *Crataegus* Ser. *Kyrtostylae* Pojark. ex Botschantzev in Europe. *Feddes Repertorium* 96: 363-385
- Chrtek, J. u. V. Jirasek (1962): Contribution to the systematics of species of the Poa L. genus section Ochlopoa (A. et Gr.) V. Jiras. *Preslia* 34: 40-68
- Chrtková-Zertová, A. (1966): Bemerkungen zur Taxonomie von *Lotus uliginosus* Schkuhr und *Lotus pedunculatus* Cav. *Folia Geobot. Phytotax.* 1: 78-87
- Chrtková-Zertová, A. (1973): A Monographic Study of *Lotus corniculatus* L. 1. Central and Northern Europe. *Rozpravy Cesk. Akad. Ved Rada MPV* 83: 1-94
- Cingel, N. A. van der (1995): An atlas of Orchid pollination. European orchids. Balkema Publ. : 175
- Clark, L.G. & J.B. Fisher (1986): Vegetative Morphology of Grasses: Shoots and Roots. - In: Soderstrom, T.R. et al. (eds.): *Grass Systematics and Evolution. An International Symposium held at the Smithsonian Institution Washington, D.C., 27-31 July 1986* Smithsonian Institution Press: 37-45
- Clayton, W. D. (1980): *Setaria* Beauv. - In *Flora Europaea*, Vol. 5 (Hrsg.: Tutin, T. G. et al.) Univ. Press: 263-264
- Clayton, W. D. and S. A. Renvoize (1986): Genera Graminum. Grasses of the World *Kew bull. add. ser.* 13: 1-389
- Clemenson, C.J. (1981): Kalkdan, *Galeopsis angustifolia*, funnen på Selaön i Södermanland. *Svensk Bot. Tidskrift* 75 (2): 77-84
- Clements, F.E. (1916): Plant succession. An analysis of the development of vegetation Carnegie Inst. Wash. Publ. 242: 1-512
- Conert, H. J. (1979): Bambuseae - Eragrostoideae. - In Hegi, *Illustrierte Flora von Mitteleuropa*, Band I, Teil 3, Lieferung 1 Paul Parey: 1-80
- Conert, H. J. (1981): Über das Rohrartige Pfeifengras, *Molinia arundinacea* Schrank. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 52: 5-14
- Conert, H. J. (1983): Beiträge zur Kenntnis der mitteleuropäischen Lieschgräser (*Phleum*, Poaceae) *Jb. nass. Ver. Naturk.* 106: 79-108
- Conert, H. J. (1983): Eragrostoideae - Pooideae. - In Hegi, *Illustrierte Flora von Mitteleuropa*, Band I, Teil 3, Lieferung 2 Paul Parey: 81-160

- Conert, H. J. (1985): Pooideae. - In Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Band I, Teil 3, Lieferung 3 Paul Parey: 161-240
- Connor, H.E. (1992): Hawkweeds, *Hieracium* spp., in tussock grasslands of Canterbury, New Zealand, in 1960s. *New Zealand J. Bot.* 30: 247-261
- Cordus, V. (1561): *Annotationes in Pedacii Dioscoridis ... libros V.* C. Gesner
- Council of Europe (Herausgeber) (1979): Convention of the conservation of European wildlife and natural habitats. *European Treaty Series* 104: 37
- Crackles, F. E. (1994): *Calamagrostis stricta* (Timm) Koeler, *C. canescens* (Wigg.) Roth and their hybrids in S.E. Yorks., v.c. 61, northern England *Watsonia* 20: 51-60
- Crackles, F. E. (1995): A geographical analysis of the characters of *Calamagrostis stricta* (Timm) koeler, *C. canescens* (Wigg.) Roth and their hybrid populations in SE Yorkshire, v. c. 61, northern England. *Watsonia* 20: 397-404
- Cribb, P.J. u. J.J.Wood (1981): *Ophrys holoserica*, der korrekte Name für die Hummel-Ragwurz. *Die Orchidee* 32(1): 27-28
- Crins, W.J. u. P.W. Ball (1989): Taxonomy of the *Carex flava* complex (Cyperaceae) in North America and northern Eurasia. *Canad. J. Bot.* 67: 1032-1065
- Cronquist, A. (1981): An integrated system of classification of flowering plants: 1262
- Cullen, J. (1972): *Marrubium* L. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 137-138
- Cullen, J. (1976): The *Anthyllis vulneraria* complex: a résumé. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 35 (1): 1-38
- Cullen, J. (1982): *Marrubium* L. - In: *Flora of Turkey*, Vol. 7 (Hrsg.: Davis, P.H.). Univ. Press : 165-178
- Dafni, A. u. R. J. Woodell (1986): Stigmatic exudate and the pollination of *Dactylorhiza fuchsii*. *Flora* 178(5): 343-350
- Dafni, A. u. Y. Ivri (1981): The flower biology of *Cephalanthera longifolia* (Orchidaceae) - pollen imitation and facultative mimicry. *Pl. Syst. Evol.* 137(4): 229-240
- Dagenbach, H. (1978): Über die Nachzucht des Speierlings (*Sorbus domestica* L.). Ein Beitrag zur Erhaltung einer vom Aussterben bedrohten Baumart. *Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 47/48: 191-203
- Dahlgren, R. M. u. H. T. Clifford (1982): *The Monocotyledons. A Comparative Study.* : 378 S.
- Dahlgren, R. M., H. T. Clifford u. P. F. Yeo (1985): *The Families of the Monocotyledons.* Springer: 520
- Dahlgren, R.M. (1985): *The families of the monocotyledons: structure, evolution and taxonomy.* Springer: 520
- Daiß, H. u. H. Daiß (1991): Standort-Bedingungen der Orchideen im Welzheimer Wald. *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 23(1): 155-178
- Daiß, H. u. M. Hennecke (1987): Orchideen im Rems-Murr-Kreis. *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 19(2): 153-196
- Daiß, H. u. M. Hennecke (1988): Orchideen im Rems-Murr-Kreis. *Natur Rems Murr* 7: 1-57
- Daiß, H. u. M. Hennecke (1990): Orchideen im Rems-Murr-Kreis. *Nachtrag 1987-1990.* *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 22(4): 797-807
- Daiß, H. u. M. Hennecke (1996): Orchideen im Rems-Murr-Kreis. *Nachtrag 1991-1995.* *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 28(2): 338-346
- Daiß, H., M. Hennecke u. P. Schneider (1988): Pflegemaßnahmen zur Erhaltung orchideen-reicher Trockenstandorte im Schwäbischen Wald. *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 20(1): 75-101
- Dalla Torre, K.W. von u. L. Grafen von Sarntheim (1909): *Rosa.* - In: *Flora der Gefürsteten Grafschaft Tirol, des Landes Vorarlberg und des Fürstenthumes Liechtenstein.* *Wagner* 6: 488-523
- Damanakis, M. & H. Scholz (1990): Phytogeographical notes on the Poaceae of Greece. *Willdenowia* 19: 413-423

- Danesch, E. u. O. Danesch (1976): Die Bedeutung der Hybridisierung bei europäischen und mediterranen Orchideen. *Proceed. 8. World Orchid. Conference Frankfurt 1975* : 126-128
- Darwin, C. (1862): On the various contrivances by which British and foreign orchids are fertilized by insects, and on the good effects of intercrossing: 365
- Darwin, C. (1899): Die verschiedenen Einrichtungen, durch welche Orchideen von Insecten befruchtet werden: 259
- David, R.W. (1976): Nomenclature of the British Taxa of the *Carex muricata* L. aggregate. *Watsonia* 11: 59-65
- David, R.W. u. A.O. Charter (1977): *Carex polyphylla* Kar. et Kir. and *C. leersiana* Rauschert. *Watsonia* 11: 253-254
- David, R.W. u. J.G. Kelcey (1975): *Carex muricata* sensu Nelmes and *C. bullockiana* Nelmes. *Watsonia* 10: 412-414
- David, R.W. u. J.G. Kelcey (1985): *Carex muricata* L. aggregate. In: *Biological Flora of the British Isles*, No. 159. *Blackwell Journal of Ecology* 73: 1021-1039
- Davies, E.W. (1953): Notes on *Carex flava* and its allies. *Watsonia* 3: 66-84
- Davies, E.W. (1953): Notes on two rare Scottish sedges. *Watsonia* 2: 300-302
- Davies, E.W. (1955): The cytogenetics of *Carex flava* and its allies. *Watsonia* 3: 129-137
- Davis, P.H. (1972, 1975, 1984): *Flora of Turkey and the East Aegean Islands*, Vol. 4-5. Univ. Press
- De Bary, A. (1865): Bericht über neue Entdeckungen im Gebiete der Freiburger Flora. *Ber. Verh. Naturf. Ges. Freiburg* 3: 18-28
- De Bary, A., (1858): Über *Orchis militaris*, *simia*, *fusca* und ihre Bastarde. *Ber. naturforsch. Ges. Freiburg* 1: 477-482
- De Groot, J. (1977): Variation and reproductive behaviour in some Swiss populations of *Leontodon hispidus* s. l. - a preliminary report. *Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel* 44: 147-180
- De Langhe, J.-E., L. Delvosalle, J. Duvigneaud, J. Lambinon & C. Vanden Berghen (1978): *Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes)* Jardin botanique national de Belgique : 899 S.
- De Wet, J. M. J. (1981): Grasses and the Culture History of Man *Ann. Missouri Bot. Gard.* 68: 87-104
- De Wet, J. M. J. (1981): Species concepts and systematics of domesticated cereals *Kulturpflanze* 29: 177-198
- De Wet, J. M. J. (1995): Minor cereals. - In Smartt, J. and N. W. Simmonds (eds.): *Evolution of Crop Plants* Longman : 202-208
- De Wet, J. M. J. and J. R. Harlan (1970): Biosystematics of *Cynodon* L. C. Rich. (Gramineae) *Taxon* 19: 656-669
- Decker, E. (1950): Die Pfälzer Baldriane der Sektion *Officinalis*. *Pfälzer Heimat* 1: 124-126
- DeFillips, R.A. (1972): *Hyssopus* L. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press : 170-171
- Dehmut, S. (2001): Neufunde von *Orobanche*-Arten in Baden-Württemberg *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* : 19-26
- Demuth, S. (1988): Über zwei bemerkenswerte Mauerfarne an der Bergstraße. *Carolinea* 46: 135-136
- Demuth, S. (1992): Über einige seltene *Orobanche*-Arten (*Orobanchaceae*) in Baden-Württemberg. *Carolinea* 50: 57-66
- Demuth, S. (2001): Neufund von *Orobanche*-Arten in Baden-Württemberg *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 1: 19-26
- Demuth, S. (2003): Fundortangaben zur „Pflanzenwelt von Weinheim und Umgebung“, *Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland*, Band 2: S. 3-24
- Demuth, S., T. Gregor u. T. Breunig (Institut für Botanik und Landschaftskunde) (1995): Sandrasen und Binnendünen im Stadtkreis Mannheim. Schutzkonzeption für die Flora und Vegetation auf der Grundlage floristisch-vegetationskundlicher Untersuchungen. Unveröff. Gutachten im Auftrag der

Bezirkstelle für Naturschutz u. Landschaftspflege, Teil 1: 280 S., Teil 2: 148 Erhebungsbögen und 51 Karten

Den Nijs, J.C.M. u. A. van der Hulst (1988): Cytogeography of *Taraxacum* section *Erythrosperma*: Diploid sexuals in SE and SW Europe. *Bot. Jahrb. Syst.* 110 (1): 83-93

Den Nijs, J.C.M. u. A.A. Sterk (1980): Cytogeographical studies of *Taraxacum* sect. *Taraxacum* (=sect. *Vulgaria*) in Central Europe. *Bot. Jahrb. Syst.* 101 (4): 527-554

Den Nijs, J.C.M., J. Kirschner, J. Stepánek u. A. van der Hulst (1990): Distribution of diploid sexual plants of sect. *Ruderalia* in east-Central Europe, with special reference to Czechoslovakia. *Plant Syst. Evol.* 170: 71-84

Den Nijs, J.C.M., S.B.J. Menken u. A. Vlot (1987): Gene flow in a di-triploid mixed stand of *Taraxacum* (Asteraceae) in the Odenwald, BRD as measured by isoenzyme analysis. Abstracts 14th Int. Bot. Congress 307

Dengler, J. (1994): Flora und Vegetation von Trockenrasen und verwandten Gesellschaften im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. *Gleditschia* 22: 179-321

Dersch, G. (1963): Zur Zytologie und Taxonomie der Goldnessel (*Lamium galeobdolon* (L.) L. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 76: 351-359

Dersch, G. (1965): Notizen über das Vorkommen von *Callitriche*-Arten in (Nord-)Hessen. *Hess. Flor. Briefe* 14: 35-44

Dersch, G. (1986): Zur Verbreitung der *Callitriche*-Arten (Wassersterne) in Niedersachsen. *Gött. Flor. Rundbr.* 20: 79-100

Dersch, G. (1994): Über *Pulmonaria officinalis* L., *Pulmonaria obscura* Dum. und ihren Bastard in Nordhessen und Südniedersachsen. *Hess. flor. Briefe* 43(4): 49-63

Dettmar, J. (1993): *Puccinellia distans*-Gesellschaften auf Industrieflächen im Ruhrgebiet - Vergesellschaftung von *Puccinellia distans* in Europa. *Tuexenia* 13: 445-465

Dettmar, J. u. H. Sukopp (1991): Vorkommen und Gesellschaftsanschluß von *Chenopodium botrys* L. und *Inula graveolens* (L.) Desf. im Ruhrgebiet (Westdeutschland) sowie im regionalen Vergleich. *Tuexenia* 11: 49-65

DeWolf, G.P. (1955): Notes on Cultivated Labiates. *Baileya* 3: 98-107

Dieckmann, B. u. B. Fritsch (1990): Linearbandkeramische Siedlungsbefunde im Hegau. *Arch. Korrespondenzbl.* 20 (1): 25-39

Diederich, P. (1990): Data Storage and Analysis by Computer. Floristic and faunistic Databases on Personal Computers *Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. A* 456: 131-137

Dieffenbach, Ch.E. (1826): Zur Kenntnis der Flora der Kantone Schaffhausen und Thurgau, so wie eines Theils des angränzenden Alt-Schwabens. *Flora oder Botanische Zeitung* 30: 465-480

Diekjobst, H. (1986): *Catapodium rigidum* und *Lophochloa cristata* zusammen am rechtsseitigen Mittelrhein. *Göttinger Florist. Rundbriefe* 19(2): 80-84

Dienst, M & Brozio, B (2003): Zum Vorkommen von *Apium repens* (Kriechender Sellerie) an der Lipbach-Mündung (Gemarkung Friedrichshafen), *Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland*, Band 2: S.113-114

Dienst, M & Strang, I (2003): Verschollen geglaubte Ried-Grasnelke (*Armeria ‚purpurea‘*) des Bodensees wieder gefunden, *Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland*, Band 2: S. 116-117

Dienst, M. & Schmieder, K. (2003): Wiederfund von *Tolypella glomerata* (Characeae) im Bodensee-Untersee, *Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland*, Band 2: S. 114-116

Dienst, M. (1981): Zwei neue Fundorte von *Fragaria x Hagenbachiana* Lang et Koch in Südbaden. *Gött. Flor. Rundbr.* 15 (4): 82-84

Dienst, M. (1986): Zur Dynamik der Schifffront am Bonensee-Untersee *Natur und Landschaft* 61: 137-139

Dienst, M. (1994): Die höheren Pflanzen des Naturschutzgebietes "Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee". Gutachten für Naturschutzzentrum Wollmatinger Ried

Dienst, M. u. Jakoby (1988): *Naturschutzforum* 1/2

- Dienst, M. u. P. Weber (1990): Die Strandschmielen-Gesellschaft (*Deschampsietum rhenanae* Oberdorfer 1957) am Schweizer Bodenseeufer. Mitt. Thurgauischen Naturf. Ges. 50: 39-46
- Dienst, M. u. P. Weber (1993): Die Strandschmielen-Gesellschaft (*Deschampsietum rhenanae* Oberdorfer 1957) im westlichen Bodenseegebiet (Baden-Württemberg, Thurgau). Limnologie aktuell 5: 229-240
- Dierbach, J.H. (1819-1820): Flora Heidelbergensis plantas sistens in praefectura Heidelbergensi et in regione adfina sponte nascentes secundum systema sexuale Linnaeanum digestas. 2 Teile. C. Groos: 406
- Dierbach, J.H. (1825-1827): Systematische Uebersicht der um Heidelberg wild wachsenden, und häufig zum ökonomischen Gebrauche cultivirten Gewächse. Chr. Fr. Müller: 178
- Dierbach, J.H. (1825-1833): Beiträge zu Deutschlands Flora gesammelt aus den Werken der ältesten deutschen Pflanzenforscher. Teil 1, 130 S., 1825; Teil 2, 94 S., 1828, Teil 3, 94 S., 1830, Teil 4, 164 S., 1833. K.Groos
- Dierschke, H. (1984): Natürlichkeitsgrade von Pflanzengesellschaften unter besonderer Berücksichtigung der Vegetation Mitteleuropas Phytocoenologia 12: 173-184
- Dierschke, H. (1985): Aufgaben pflanzensoziologischer Forschung in Mitteleuropa. Zur Gründung eines Arbeitskreises für Pflanzensoziologie innerhalb der Flor.-soz. Arbeitsgemeinschaft Tuexenia 5: 561-563
- Dierschke, H. u. Y. Song (1982): Vegetationsgliederung und kleinräumige Horizontalstruktur eines submontanen Kalkbuchenwaldes. In: Struktur und Dynamik von Wäldern Ber. Int. Symp. Int. Ver. f. Veg.kunde Rinteln : 513-539
- Dierssen, B. u. K. Dierssen (1984): Vegetation und Flora der Schwarzwaldmoore. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 39: 512
- Dierssen, K. (1986): Anmerkungen zum Gesellschaftsanschluß von *Carex holeonastes*. Abh. Westfäl. Mus. Naturk. 48: 281-290
- Dieterich, H.A. (1904): Flora zweier Albmarkungen. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 60: 118-146
- Dieterich, H.A. (1905): Ein botanischer Streifzug über die Grenze. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 61: 387-396
- Dieterich, H.A., S. Müller u. G. Schlenker (1970): Urwald von Morgen. Bannwaldgebiete der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg. Ein Beitrag zum europäischen Naturschutzjahr. E. Ulmer
- Dietl, W. (1977): Vegetationskunde als Grundlage der Verbesserung des Graslandes in den Alpen. - In: Krause, W. (edit.): Handbook of Vegetation Science. 13: 407-458
- Dietrich, H. (1971): Blütenmorphologische und palynologische Untersuchungen an *Littorella*. Feddes Repertorium 82: 155-165
- Dietrich, W. (1967): Die Zytotaxonomie der *Carex*-Sektion *Frigidae* in Europa. Feddes Rep. 75: 1-42
- Dister, E. (1980): Geobotanische Untersuchungen in der hessischen Rheinaue als Grundlage für die Naturschutzarbeit. Unveröff. Diss. Univ. Göttingen: 170
- Dittrich, M. (1968): Karyologische Untersuchungen zur Systematik von *Centaurea* und verwandten Gattungen. Bot. Jahrb. Syst. 88: 123-162
- Dittrich, M. (1968): Morphologische Untersuchungen an den Früchten der Subtribus *Cardueae-Centaureinae* (Compositae). Willdenowia 5: 67-107
- Dittrich, M. (1977): *Cynareae* - systematic review. In: The Biology and Chemistry of the Compositae, 2: 999-1038
- Dobras, W. (1970): Hieronymus Harder - sein Leben, seine Herbarien. Pharm. Zeit. 115(33): 1179-1185; (34): 1210-1218; (37): 1325-1329; (50): 1950-1957
- Dogan, M. (1985): *Helictotrichon* Besser ex Schultes & Schultes fil. - In: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 9. University Press : 299-313
- Döll, J. Chr. (1843): Rheinische Flora. Beschreibung der wildwachsenden und cultivirten Pflanzen des Rheingebietes vom Bodensee bis zur Mosel und Lahn mit besonderer Berücksichtigung des Großherzogthums Baden. L. Brönnner : XL+832

- Döll, J. Chr. (1857-1862): Flora des Großherzogthums Baden. 3 Bände. G. Braun : 1429
- Döll, J. Chr. (1858): Nachrichten über die mit Unrecht der badischen Flora zugeschriebenen Gewächse. Ver. Naturk. Mannheim, Jahresber. 23/24 (1857/58): 17-39
- Döll, J. Chr. (1862): Beiträge zur Pflanzenkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Flora des Großherzogthums Baden. Ver. Naturk. Mannheim, Jahresber. 28: 29-45
- Döll, J. Chr. (1863): Beiträge zur Pflanzenkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Flora des Großherzogthums Baden. Ver. Naturk. Mannheim, Jahresber. 29: 55-71
- Döll, J. Chr. (1864): Beiträge zur Pflanzenkunde mit besonderer Berücksichtigung der Flora des Großherzogthums Baden. Ver. Naturk. Mannheim, Jahresber. 30: 65-85
- Döll, J. Chr. (1865): Beiträge zur Flora des Großherzogthums Baden. Ver. Naturk. Mannheim, Jahresber. 31: 34-37
- Döll, J. Chr. (1866): Beiträge zur Pflanzenkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Flora des Großherzogthums Baden. Ver. Naturk. Mannheim, Jahresber. 32: 32-45
- Döll, J. Chr. (1868): II. Nachträge zur Flora des Großherzogthums Baden. Ver. Naturk. Mannheim, Jahresber. 34: 60-79
- Doll, R. (1973): Revision der sect. Erythrosperma Dahlst. emend. Lindb. f. der Gattung Taraxacum Zinn. Feddes Repertorium 83: 673-740
- Doll, R. (1973): Revision der sect. Erythrosperma DAHLST. emend. LINDB. f. der Gattung Taraxacum ZINN. 2. Teil. Feddes Repertorium 84 (1-2): 1-180
- Doll, R. (1982): Grundriß der Evolution der Gattung Taraxacum ZINN. Feddes Repertorium 93 (7-8): 481-624
- Domac, R. (1972): Cerinthe L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 94-95
- Domin, K. (1907): Monographie der Gattung Koeleria Bibliotheca Botanica 65: 354
- Dörfler, I. (1898): Herbarium Normale. Schedae ad Centuriam XXXVI.
- Dörr, e. & W. Lippert (2001): Flora des Allgäus und seiner Umgebung, Band 1 IHW-Verlag 1: 680 pp.
- Dörr, E. (1964-1978): Flora des Allgäus.- Ber. Bayer. Bot. Ges.: 37: 31-40 (1964); 40: 7-16 (1967/68); 41: 55-62 (1969); 42: 141-184 (1970); 43: 25-60 (1972); 44: 143-181 (1973); 45: 83-136 (1974); 46: 47-85 (1975); 47: 21-73 (1976); 48: 27-59 (1977); 49: 203-270 (1978).
- Dörr, E. (1970): Bericht über die Allgäu-Floristik im Jahr 1969. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 14 (1): 1-15
- Dörr, E. (1971): Ergebnisse der Allgäu-Floristik. Arbeitsbericht für 1971. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 15 (2): 1-12
- Dörr, E. (1973): Floristische Notizen zur Allgäu-Flora. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 17 (3): 2-15
- Dörr, E. (1973): Zur Allgäu-Flora: Arbeitsergebnisse für 1972. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 17 (1): 41-58
- Dörr, E. (1974): Flora des Allgäus. 8. Teil. Ber. Bayer. Bot. Ges. 45: 83-136
- Dörr, E. (1976): Allgäu-Floristik 1975/76. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 20 (2): 21-45
- Dörr, E. (1978): Ergebnisse der Allgäu-Floristik aus dem Jahre 1977. Mitt. Naturw. Arbeitskr. Kempten 22/1: 27-48
- Dörr, E. (1978): Ergebnisse der Allgäu-Floristik aus dem Jahre 1978. Mitt. Naturw. Arbeitskr. Kempten 22/2: 1-23
- Dörr, E. (1979): Ergebnisse der Allgäu-Floristik 1979. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 23 (1/2): 31-53
- Dörr, E. (1979-1983): Flora des Allgäus. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 50: 189-253 (1979); 51: 57-108 (1980); 52: 83-97 (1981); 53: 125-149 (1982); 54: 59-76 (1983)
- Dörr, E. (1980): Ergebnisse der Allgäu-Floristik aus dem Jahre 1980. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 24 (1): 13-31

- Dörr, E. (1981): Ergebnisse der Allgäu-Floristik aus dem Jahre 1981. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 25 (1): 17-48
- Dörr, E. (1981): Flora des Allgäus. 15. Teil (Nachtrag): Die Gattung *Alchemilla*. Ber. Bayer. Bot. Ges. 52: 83-97
- Dörr, E. (1982): Ergebnisse der Allgäu-Floristik aus dem Jahre 1982 (1. Teil). Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 25 (2): 41-62
- Dörr, E. (1983): Ergänzungen zur Flora des Allgäus. Ber. Bayer. Bot. Ges. 54: 59-76
- Dörr, E. (1983): Ergebnisse der Allgäu-Floristik aus dem Jahre 1982 (2. Teil). Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 26 (1): 7-21
- Dörr, E. (1985): Ergebnisse der Allgäu-Botanik aus den Jahren 1983, 1984 und 1985. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 27 (1): 5-28
- Dörr, E. (1986): Allgäu-Botanik 1986. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 27 (2): 31-46
- Dörr, E. (1988): Notizen zur Allgäu-Botanik 1987. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 28(1/2): 3-16
- Dörr, E. (1991, 1990): Notizen zur Erforschung der Allgäuer Flora 1990 (mit Nachtrag). Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 30 (2): 23-38
- Dörr, E. (1992): Notizen zur Erforschung der Allgäuer Flora im Jahre 1991. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 31: 5-24
- Dörr, E. (1993): Bemerkenswerte Bromusarten im Allgäuer Untersuchungsgebiet (1958-1992) Mitt. Naturwiss. Arbeitskreis Kempten 32 (2): 15-33
- Dörr, E. (1993): Ergebnisse der Allgäu-Floristik aus dem Jahre 1992. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 32(1): 1-18
- Dörr, E. (1994): Notizen zur Allgäu-Flora aus dem Jahre 1993 Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 33 (1): 5-24
- Dörr, E. (1995): Notizen zur Allgäu-Flora aus dem Jahre 1994 Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 33 (2): 7-20
- Dörr, E. (1996): Ergebnisse der Allgäu-Floristik aus dem Jahre 1995. Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 34/1: 5-24
- Dörr, E. (1997): Notizen zur Allgäu-Flora 1996. Mitt. Naturwiss. Arbeitskreis Kempten 35(1): 5-24
- Dosch, L. u. J. Scriba (1873-1874): Exkursions-Flora der Blüten- und höheren Sporenpflanzen des Großherzogthums Hessen. H.L. Schlapp : XLIV+640
- Dosch, L. u. J. Scriba (1882, 1888): Exkursions-Flora der Blüten- und höheren Sporenpflanzen mit besonderer Berücksichtigung des Großherzogthums Hessen und der angrenzenden Gebiete. 2. Aufl. LXXIX+572 S.; Julius Stern, Worms; 3. Aufl. CVIII+616 S., 8 Tafeln; Emil Roth, Giessen. :
- Dostál, J. (1989): Nová Kvetena CSSR. Tom. 2.
- Dragulescu, C. u. M. Magnes (1996): Phytocoenologie von *Narcissus radiiflorus* in den Ostalpen. Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 126: 105-117
- Dreher, J. (1986): Das Herbarium des Hieronimus Harder (1574-1576). Diss. Techn. Univ. München: 300
- Dress, W.J. (1958): Notes on the cultivated Compositae. 2. *Arnica*. *Baileya* 6: 144-198
- Dressler, R.L. (1987): Die Orchideen. Biologie und Systematik der Orchidaceae. Aus dem Englischen von Dr. Guido J. Braem. Unter Mitwirkung von Marion Zerbst.: 394
- Drury, D.G. u. L. Watson (1965): Anatomy and the taxonomic significance of gross vegetative morphology in *Senecio*. *New Phytologist* 64: 307-314
- Dübi, H. u. G. Kauffmann (1961): Considerazioni sulla distribuzione delle specie *Potentilla verna* L. em. Koche *Potentilla puberula* Krasan (P. Gaudini Greml.). Ber. Schweiz. Bot. Ges. 71: 302-331
- Ducke, A. (1874): Die Alpenflora Oberschwabens. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 30: 227-237
- Dühring, V. (1990): Erfassung und Schutz der höheren Pflanzen auf den Markungen der Gemeinde Zaberfeld. Heimatbl. aus dem Zabergräu 2/3: 17-48

- Düll, R. (1959): Unsere Ebereschen und ihre Bastarde. Die Neue Brehm-Bücherei 226. Ziemsen : 122
- Düll, R. (1961): Die Sorbus-Arten und ihre Bastarde in Bayern und Thüringen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 34: 11-65
- Düll, R. u. H. Kutzelnigg (1992): Botanisch-Ökologisches Exkursionstaschenbuch. Das Wichtigste zur Biologie bekannter heimischer Pflanzen. Quelle u. Meyer: 546
- Dunkel, F.-G. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (14-15). Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 70
- Dunn, S.T. (1905): Alien Flora of Britain.
- Duquenois, P. (1950): Le ramassage de la Digitale dans les Vosges en 1950 Bull. Assoc. philomath. Alsace et Lorraine 9 (1): 41-42
- Dürer, M. (1897): Die Flora der Torflachen bei Virnheim an der hessisch - badischen Grenze. Allg. Bot. Z. Syst. 3 (9): 146-147
- Dürr, A. u. F.-G. Link (1988): Speierlinge im südlichen Kraichgau. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 63: 293-311
- Duvall et al. (1993a): Phylogenetic hypotheses for the monocotyledons constructed from rbcL sequence data Ann. Missouri Bot. Garden 80: 607-619
- Duvall et al. (1993b): Phylogenetic hypotheses for the monocotyledons constructed from rbcL identifies *Acorus calamus* as the primal extant monocotyledon Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 90: 4641-4644
- Duvernoy, J.G. (1722): Designatio plantarum circa Tubingensem Arcem florentium cum 1. sede seu loco earum natali, 2. Charactere generico et Individuali, 3. Virtutibus medicis probatissimis. In usum Scholae Botanicae Tubingensis. G.F. Pflick: 154
- Duvigneaud, J. (1987): Notes taxonomiques concernant la flore de la Lorraine française. Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 57: 459-460
- Duwensee, H. A. (1993): Morphologie von *Agrostis stolonifera* (Poaceae) auf Schwermetallböden. Phytos 33/1: 27-31
- Dvorak, F., P. Trnka u. B. Dadakova (1978): Cytotaxonomic study of *Tragopogon* L. in Czechoslovakia. Folia Geobot. Phytotax. 13: 305-330
- Eberhardt, D. (1941): Die Botanische Wanderung am 22. Juni 1941. Süddeutsche Apothekerzeit. 81: 362
- Eberle, G. (1953): Das Zwerggras (*Mibora minima*) Natur und Volk 83 (2): 33-39
- Eberle, G. (1954,1961,1968): Die Orchideen der deutschen Heimat: 149
- Eberle, G. (1969): Der Kaiserstuhl. Vulkan- und Lößgebirge, Pflanzen- und Tierparadies am Oberrhein. Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. - tiere 34: 93-109
- Eberle, G. (1972): Lilien und Lilienverwandte in den Floren Mittel- und Südeuropas. W.Kramer: 203
- Eberle, G. (1972): Prächtiger Frauenschuh (*Cypripedium calceolus* L.). Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. - tiere 37: 7-18
- Eberle, G.M. (1994): Das Pfeifengras (*Molinia caerulea*) - eine Problempflanze auf Pflegeflächen. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 98: 35-39
- Eberlein, F. (1991): *Cerintho minor*, *Juniperus sabina* und *Sedum dasyphyllum* im Berchtesgadner Land. Ber. Bayer. Bot. Ges. 62: 231-233
- Ebert, G. u. E. Rennwald (1991): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs: Tagfalter 1. E. Ulmer 1: 1-552
- Ecke, H. (1968): Das Schutzgebiet Taubergießen am Oberrhein. Natur u. Landschaft 43: 41-44
- Eckert, G. (1992): Beobachtungen zur Bewertung der Einflüsse gezielter Weidenutzung mit Schafen und Ziegen auf die Vegetationsentwicklung der Wacholderheiden. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67: 137-152
- Eckstein, Breinig, J. Neuberger, F. Oltmanns u. Th. Herzog (1896): Neue Standorte in der badischen Flora. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3 (141): 366-368

- Edmonds, J.M. (1986): Biosystematics of *Solanum sarrachoides* Sendt. and *S. physalifolium* Rusby (*Solanum nitidibaccatum* Bitter) J. Linn. Soc., Bot. 92: 1-38
- Edmondson, J. R. (1980): *Poa*. In: Tutin et al.: *Flora Europaea* 5: 159-167
- Ehmke, W. (1978): Landschaftsökologische Untersuchungen im Verdichtungsraum Stuttgart. Beih. Veröff. Natursch. Landschaftspfl. Bad.-Württ. 12: 1-137
- Ehrendorfer, E. (1970): Mediterran-mitteuropäische Florenbeziehungen in Lichte cytotaxonomischer Befunde Feddes Repertorium 81: 3-32
- Ehrendorfer, F. (1949): Zur Phylogenie der Gattung *Galium* I. Polyploidie und geographisch-ökologische Einheiten in der Gruppe des *Galium pumilum* Murray (Sekt. *Leptogalium* Lange sensu Rouy) im österreichischen Alpenraum. Österr. Bot. Zeitschr. 96: 109-138
- Ehrendorfer, F. (1956): Struktur, Verbreitung und Geschichte der Sippen von *Lepto-Galium* in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 31: 5-11
- Ehrendorfer, F. (1958): Die geographische und ökologische Entfaltung des europäisch-alpinen Polyploidkomplexes *Galium anisophyllum* Vill. seit Beginn des Quartärs. Uppsala Universitets Arsskrift 6: 176-181
- Ehrendorfer, F. (1960): Neufassung der Sektion *Lepto-Galium* Lange und Beschreibung neuer Arten und Kombinationen. (Zur Phylogenie der Gattung *Galium* VII). Sitz ber. Österr. Akad. Wiss. Math-naturw. Kl. Abt. I (169): 407-421
- Ehrendorfer, F. (1962): Beiträge zur Phylogenie der Gattung *Knautia* (Dipsacaceae). I. Cytologische Grundlagen und allgemeine Hinweise. Österr. Bot. Zeitschr. 109: 276-343
- Ehrendorfer, F. (1962): Cytotaxonomische Beiträge zur Genese der mitteleuropäischen Flora und Vegetation. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 75: 137-152
- Ehrendorfer, F. (1963): Probleme, Methoden und Ergebnisse der experimentellen Systematik. *Planta Medica* 11: 234-251
- Ehrendorfer, F. (1964): Über stammesgeschichtliche Differenzierungsmuster bei den Dipsacaceen. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 77: 83-94
- Ehrendorfer, F. (1967): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas: 253
- Ehrendorfer, F. (1973, 1976): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. G. Fischer : XII + 318
- Ehrendorfer, F. (1974): *Knautia*. - In: Gutermann, W., F. Ehrendorfer und M. Fischer: Neue Namen und kritische Bemerkungen zur Gefäßpflanzenflora Mitteleuropas. Österr. Bot. Zeitschr. 122: 262-265
- Ehrendorfer, F. (1976): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas G. Fischer: 318
- Eichler, J. (1893): Pflanzenreich. In: Beschreibung des Oberamts Ehingen. W. Kohlhammer : 95-104
- Eichler, J. (1899): Pflanzenreich. In: Beschr. des Oberamts Rottenburg, 1. Teil. (1899): 56-66
- Eichler, J. (1908): Botanische Sammlung. In: Verzeichnis der Zugänge zu den Vereinssammlungen. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 64: XII-XIII
- Eichler, J. (1911): Botanische Sammlung. Jahresh. Ver. Vaterländ. Naturkunde in Württ. 67: XX-XXII
- Eichler, J. (1919): Botanische Sammlung. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 75: XIX-XXIII
- Eichler, J. (1926): Botanische Sammlung. In: Bericht der Württembergischen Naturaliensammlung. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 82: XIX-XX
- Eichler, J. (1930): Die Pflanzen. In: Beschreibung des Oberamts Leonberg, 2. Bearbeitung, 1. Band: 88-97
- Eichler, J., R. Gradmann u. W. Meigen (1905-1926): Ergebnisse der pflanzengeographischen Durchforschung von Württemberg, Baden und Hohenzollern. Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ., Heft I (1905): 1-78; Heft II (1906): 79-134; Heft III (1907): 135-218; Heft IV: 1909: 219-278; Heft V (1912): 279-316; Heft VI (1914): 317-388, Heft VII (1926): 389-454: 454
- Eigner, J. (1968): Botanischer Bericht vom Bodenseelager. Jahrb. 1967/68 Deutsch. Jugendbund Naturbeobachtung 5: 36-73
- Ellenberg, H. (1978): *Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht*. E.Ulmer: 982

- Ellenberg, H. (1990): Bauernhaus und Landschaft in ökologischer und historischer Sicht: 585
- Ellenberg, H. (sen.), H.E. Weber, R. Düll, V. Wirth, W. Werner u. D. Paulißen (1991): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa E. Goltze Scripta Geobotanica 18: 248
- Elvers, J. (1932): A cytological and embryological study of *Anthericum liliago* x *ramosum*. Svensk Bot. Tidskrift 26: 13-24
- Elwert, O. (1920): Schutz den Orchideen ! Veröff. Staatl. Stelle Naturschutz Württ. Landesamt Denkmalpfl. 5: 133-139
- Encke, F. (1958): Pareys Blumengärtnerei: Beschreibung, Kultur und Verwendung der gesamten gärtnerischen Schmuckpflanzen 1. Bd. 1958, 2. Bd. 1960. P. Parey
- Endtmann, J. (1962): Die mitteleuropäischen Sippen der Gattung *Stipa* L. Wiss. Zeitschr. Ernst Moritz Arndt-Univ. Greifswald, math.-nat. Rei. 11/1-2: 143-152
- Endtmann, J. (1964): Zur Verbreitung und Taxonomie der Gattung *Ononis* in Nordost-Deutschland. Feddes Repertorium 69: 103-131
- Engel, R. u. S. Künkele (1977): Zur Verbreitung der Orchideen am südlichen Oberrhein. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 9: 51-118
- Engel, R., H. Mathe u. O. Seveleder (1996): Validation d`*Ophrys fuciflora* subsp. *elatior*. L`Orchidophile 123: 163-171
- Engel, T. (1896): Die botanischen Verhältnisse. In: G. Weitbrecht: Wanderungen durch Geislingen und seine Umgebung. : 143-174
- Engel, T. (1900): Die Gartenflüchtlinge unserer heimischen Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 56: 514-518
- Engelhardt, M. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (16-21). Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 70-71
- Engesser, C. (1852): Flora des südöstlichen Schwarzwaldes mit Einschluß der Baar, des Wutachgebietes und der anstoßenden Grenze des Hohenlohegaues. A. Schwarz: 270
- Engler, A. u. K. Prantl (1897): Die natürlichen Pflanzenfamilien. IV (1,2)
- Ensgraber, A. (1954): Über den Einfluß der Austrocknung auf die Assimilation und Atmung von Moosen und Flechten Flora 141: 432-475
- Eriksen, B. (1989): Notes on generic and infrageneric delimitation in the Valerianaceae. Nord. J. Bot. 9: 179-187
- Ernet, D. (1969): Schlüssel zur Bestimmung der Valerianella-Arten Österreichs. Mitteilungsbl. flor. Arbeitsgem. naturw. Ver. Steiermark 18: 1-2
- Ernet, D. (1977a): Sprossaufbau und Lebensform von Valerianella und Fedia (Valerianaceae). Plant Syst. Evol. 127: 243-276
- Ernet, D. (1977b): Blütenbau und Fortpflanzungsbiologie von Valerianella und Fedia (Valerianaceae). Plant Syst. Evol. 128: 1-22
- Ernet, D. (1978): Fruchtbau und Verbreitungsbiologie von Valerianella und Fedia (Valerianaceae). Plant Syst. Evol. 130: 85-126
- Ernet, D. u. I.B.K. Richardson (1976): Valerianella. In: Flora Europaea (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press 4: 48-52
- Ernst, A. (1961): Revision der Gattung *Pinguicula* Bot. Jahrb. Syst. 80 (2): 145-194
- Eskuche, U. (1955): Vergleichende Standortsuntersuchungen an Wiesen im Donauried bei Herbertingen. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 23: 33-135
- Evstatieva, L. N. et al. (1993): A biosystematic study of *Valeriana officinalis* (Valerianaceae) distributed in Bulgaria. Plant Syst. Evol. 185: 167-179
- Ewerling, H. u. Th. Breunig (1992): *Solanum triflorum* Nuttall 1818 - Ein amerikanischer Nachtschatten als Neubürger in Baden-Württemberg. Jh. Ges. Naturk. Württ. 147: 85-89
- Faber, A. (1933): Pflanzensoziologische Untersuchungen in Süddeutschland. Bibliotheca Bot. 108: 68
- Faber, A. (1934): Pflanzensoziologische Untersuchungen in württembergischen Hardten. Veröff. st. Stelle NatSchutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 10 (1933): 36-54

- Faber, A. (1936): Über Waldgesellschaften und ihre Entwicklung im Schwäbisch-Fränkischen Stufenland und auf der Alb. Anh. Versammlungsber. 1936 Landesgr. Württ. Deutsch. Forstver. : 1-53
- Faegri, K. (1931): Über die in Skandinavien gefundenen Symphytum-Arten. Bergens Museums Arbok, Naturvidenskapelig rekke 4: 47
- Fakler, J. (1988): Winterbohnenkraut, *Satureja montana*, gefunden. Unicornis 4: 41
- Falter, G. (1972): *Potentilla anglica* im östlichen Odenwald. Hess. Flor. Briefe 21 (2): 31
- Farr, E.R. et al. (1979): Index nominum genericorum plantarum. 1: XXVI + 630
- Faulkner, J.S. (1973): Experimental hybridisation of Northwest European species in *Carex* section *Acutae* (Cyperaceae). Bot. J. Linn. Soc. 67: 233-253
- Favarger, C. and F. Zesiger (1964): *Sempervivum*. In: Tutin et al. (eds.): *Flora Europaea* Univ. Press 1: 352-355
- Favarger, C. u. M. Villard (1965): Nouvelles recherches cytotoxonomiques sur *Chrysanthemum Leucanthemum* L. sens. lat. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 75: 57-79
- Felber, F. (1986): Distribution des cytodèmes d'*Anthoxanthum odoratum* L. s. lat. en Suisse. Les relations Alpes - Jura Bot. Helv. 96: 145-158
- Felber, F. (1993): Présence de trois taxons pérennes d'*Anthoxanthum* L. en Corse *Candollea* 48: 582-591
- Ferguson, L.F. (1972): *Omphalodes* Miller. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press : 118-119
- Fernald, M. L. (1930): The identity of *Alopecurus aequalis* Rhodora 32: 221-222
- Fernandes, R. (1972): *Melissa* L. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 162-163
- Fernandes, R., V.H. Heywood (1972): *Origanum* L. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 171-172
- Feucht, O. (1911): Schwäbisches Baumbuch. Württ. Forstdirektion: 100
- Feucht, O. (1912): Württembergs Pflanzenwelt. 138 Vegetationsbilder nach der Natur mit einer pflanzengeographischen Einführung. Strecker u. Schröder I-VIII, 138 T.: 1-79
- Fietz, A. (1961): Pflanzenreste aus den römischen Brunnen in Pforzheim. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 20: 23-29
- Filzer, P. (1936): Untersuchungen über das Mikroklima in niederwüchsigen Pflanzenbeständen Bot. Centralbl. 55 B: 301-346
- Filzer, P. (1981): Veränderungen im Florenbestand des Raumes Württemberg: Zeugnisse für eine Veränderung des Klimas? Jahresh. Ges. Naturk. Württ. 136: 156-165
- Filzer, P. (1982): Die Flora Württembergs in ihren Beziehungen zu Klima und Boden. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 26: 1-96
- Filzer, P. (1985): Höhenverbreitung und ökologische Potenz der Arealgruppen im Florenraum Württemberg. Jahresh. Ges. Naturk. Württ. 140: 135-149
- Finckh, R. (1850): Mitteilung neuentdeckter Pflanzen und neuer Standorte. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 6: 213-214
- Finckh, R. (1850): Über einige neue Entdeckungen in der württembergischen Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 5: 217-224
- Finckh, R. (1854): Beiträge zur vaterländischen Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 10: 194-202
- Finckh, R. (1857): Beiträge zur württembergischen Flora. Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 13: 99-103
- Finckh, R. (1859): Beiträge zur württembergischen Flora. Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 15: 90-92
- Finckh, R. (1860): Beiträge zur Württembergischen Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 16: 153-157

- Finckh, R. (1861): Beiträge zur württembergischen Flora. Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 17: 350-354
- Finckh, R. (1862): Beiträge zur württembergischen Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 18: 189-191
- Finckh, R. (1864): Beiträge zur württembergischen Flora. Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 20: 50-55
- Finckh, R. (1872): Beiträge zur württembergischen Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 28: 236-245
- Finckh, R. (ca. 1835-1883): Flora Uracensis. Manuskript :
- Fink, H. G. (1975): Bestimmungsschlüssel für *Lamiastrum galeobdolon* agg. Gött. Flor. Rundbr. (Beiblatt) 9 (3): 41
- Fink, H. G., H. Vibrans u. I. Vollmer (1992): Synopse der Roten Listen Gefäßpflanzen BFANLSchriftenreihe für Vegetationskunde 22: 262
- Fiori, A. (1906): Nuovo Giorn. Bot. ital. , n. ser. XIII, p. 197-198
- Fiori, A. (1927): Nuova Flora Analytica d'Italia 2 (5): 641-800
- Fiori, A. e G. Paoletti (1933): Flora Italiana Illustrata. M. Ricci : 549
- Firbas, F. (1941): Ein buchenzeitliches Torflager in Korntal bei Stuttgart. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz 17: 147-157
- Firbas, F. (1948): Über das Verhalten von *Artemisia* in einigen Pollendiagrammen. Biol. Zentralbl. 67: 17-22
- Fischer, A. (1978): Die Entwicklung der Vegetation an künstlich begrüntem Böschungen in Großumlegungsgebieten des Kaiserstuhls. Unveröff. Staatsexamenarbeit: 100
- Fischer, A. (1982): Mosaik und Syndynamik der Pflanzengesellschaften von Lößböschungen im Kaiserstuhl (Südbaden). Phytocoenologia 10 (1/2): 73-256
- Fischer, E. (1993): Botanische Untersuchungen hochmittelalterlicher Pflanzenreste aus der Ausgrabung auf dem Gelände des Denkendorfer Pflegehofs, Esslingen.- Diplomarbeit Lehrstuhl f. Geobotanik Univ. Freiburg. : 92
- Fischer, E. u. M. Rösch (1994): Aufschlüsse und Bohrungen in der Altstadt von Schwäbisch Hall. Archäol. Ausgrab. Bad.-Württ. 1993: 121-125
- Fischer, F. (1867): Flora von Pforzheim oder Aufzählung der bei Pforzheim wachsenden Pflanzen mit Angabe der Standorte. L. Schmidt : 82
- Fischer, H. (1931): Kleiner Beitrag zur Flora des Hegaus. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 2 (20): 255
- Fischer, R. (1982): Flora des Rieses und seiner näheren Umgebung. Verein Rieser Kulturtag : 551
- Fischer, W. und H. D. Krausch (1993): *Eragrostis multicaulis* Steudel am Elbufer bei Wittenberg Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 126: 201-202
- Fitzpatrick, J. (1946): A cytological and ecological study of some British *Euglyceria* species. New Phytologist 45: 137-144
- Fleischer, F. (1832): Über die Riedgräser Württembergs mit besonderer Berücksichtigung der in der Flora von Tübingen einheimischen: 34
- Fleischer, H. (1852): Einiges über die Flora der Umgegend von Saulgau. Aus der Heimat 5: 14-16
- Flohn, H. u. R. Fantechi (eds.) (1984): The Climate of Europe: Past, Present and Future: 356
- Flor, T. (1991): Die Vegetation auf Ruderalflächen im Mannheimer Stadtgebiet Unveröff. Zulassungsarbeit (Geographie): 243
- Focke, W.O. (1894): Über *Rubus Menkei* Wh. u. N. und verwandte Formen. Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 13: 141-160
- Focke, W.O. (1902-1903): *Rubus* L. In: Ascherson, P. u. P. Graebner: Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Gebr. Borntraeger 6 (1): 440-668
- Foerster, E. (1967): Ein Beitrag zur Unterscheidung von *Phleum pratense* und *Phleum nodosum* Gött. Flor. Rundbr. 1 (3): 12-13

- Foerster, E. (1982): Schlüssel zum Bestimmen von dreizählig beblätterten Riedgräsern des nordwestdeutschen Flachlandes nach vorwiegend vegetativen Merkmalen. Gött. Flor. Rundbr. 16: 3-21
- Foerster, E. (1995): Merkmale des vegetativen Bereichs bei *Carex Sect. Phacocystis* (Cyperaceae). Hess. Flor. Briefe 44: 33-35
- Foerster, K. (1978): Einzug der Gräser und Farne in die Gärten J. Neumann-Neudamm: 255
- Ford, R. I. (1985): Prehistoric food production in North America. Anthropological Papers, Museum of Anthropology of Michigan 75
- Förster, F. (1888): "Neue" Standorte aus der Pfälzer Flora. Mitt. Bot. Ver. Kr. Freiburg Land Baden I (49/50): 433-437
- Förster, P. (1983): Über Wuchsform, Wuchsrhythmik und Areal differenzierung einiger zentraleuropäischer Anthemideae. (Dipl. Arbeit)
- Förster, P. (1985): Vergleichende Wuchsform, Wuchsrhythmik und Areal differenzierung einiger zentraleuropäischer Anthemideae. Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturw. Reihe 34 (4): 80-93
- Frank, J.C. (1830): Rastadts Flora. J.M. Gutmann : 171
- Frank, K.-St. (1989): "Untersuchung von botanischen Makroresten aus der archäologischen Tauchgrabung der Seeufersiedlung "Bodman-Schachen" am nordwestlichen Bodensee unter besonderer Berücksichtigung der Morphologie und Anatomie der Wildpflanzenfunde (Frühe bis Mittlere Bronzezeit), Unveröff. Dipl.-Arb. Univ. Hohenheim. : 202
- Frank, D. und S. Klotz (Hrsg.) unter Mitarbeit von W. Westhus (1990): Biologisch-ökologische Daten zur Flora der DDR Wiss. Beitr. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg : 167
- Franke, W. (1981): Nutzpflanzenkunde, Nutzbare Gewächse der gemäßigten Breiten, Subtropen und Tropen. Thieme: 470
- Freitag, C. (1993): Das Feuchtgebiet Opfinger See bei Freiburg i.Br. Zur Einschätzung eines künstlichen Feuchtbiotops aus botanischer Sicht. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 15 (3/4): 509-532
- Freitag, H. (1985): The genus *Stipa* (Gramineae) in Southwest and South Asia. Note from the Royal Botanic Garden Edinburgh 42/3: 355-489
- Freitag, H., Ch. Markus u. I. Schwippl (1985): Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften im Magdeburger Urstromtal südlich des Fläming. Wiss. Zeitschr. Pädag. Hochschule Potsdam - Math.-Naturw. Reihe Jahrg.4(1): 65-92
- Frenzel, B. (1983): Die Vegetationsgeschichte Süddeutschlands im Eiszeitalter. In: H. Müller-Beck (Hrsg.): Urgeschichte in Baden-Württemberg. K.Theiss : 91-166, 477-494, 518-523
- Frey, F. (1885): Über einige wenige bekannte kritische Hieracium-Arten der badischen Flora. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (20): 172-177
- Frey, F. (1886): Bei- und Nachträge zur Badischen Flora. Mitt. Bad. Bot. Ver. 1(31-32): 277-279
- Frickhinger, A. (1860): Botanische Skizzen aus dem östlichen Ries. Jahresber.naturhist. Ver. Augsburg 13: 21-41
- Frickhinger, H. (1911): Flora des Rieses. C.H. Beck V: 403
- Frickhinger, H. (1911): Gefäßkryptogamen- und Phanerogamen-Flora des Rieses. C.H.Beck
- Fries, E.M. (1862): *Epicrisis generis Hieraciorum*. Uppsala Universitets Arsskrift 1862: 1-158
- Friesen, N. (1996): A taxonomical and chorological revision of the genus *Allium* L. sect. *Schoenoprasum* Dumort. Candollea 51/2: 460-473
- Fritsch (1900): Über Gynodioecie bei *Myosotis palustris* (L.). Ber. Deutsch. Bot. Ges. 18: 472-480
- Fritz, W. (1978): Die Vegetation am Villinger "Tannhörnl" - ein Modell der hallstattzeitlichen Vegetation am Westrand der Baar. Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar. 32: 36-60
- Fritz, W. (1979): Ein hallstattzeitlicher Festuco-Brometea-Rasen. Ber. internat. Sympos. internat. Ver. Vegetationskunde 1978: 165-176
- Froebe, H.A. u. A. Oesau (1969): Zur Soziologie und Propagation von *Iva xanthifolia* im Stadtgebiet von Mainz. Decheniana 122 (1): 147-157

- Frohne, D. (1994): Heilpflanzenlexikon: 692
- Fröhner, S. (1963): Beitrag zur Kenntnis der deutschen Arten der Gattung *Poa* L., Sektion *Ochopoa* (A. et Gr.) JSK. Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Nat. XII(9): 669-676
- Fröhner, S. (1965): Mitteleuropäische Sippen von *Alchemilla glabra* und einige Verwandte. Bot. Jahrb. Syst. 83: 370-405
- Fröhner, S. (1975): Kritik an der europäischen *Alchemilla*-Taxonomie. Feddes Repertorium 86: 119-169
- Fröhner, S. (1986): *Alchemilla*. In: Schubert, R. u. W. Vent (Hrsg.): Rothmaler, Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. 4: 282-295
- Fröhner, S. (1986): Typifizierung von *Alchemilla vulgaris* L. Gleditschia 14: 51-67
- Fröhner, S. (1986): Zur infragenerischen Gliederung der Gattung *Alchemilla* L. in Eurasien. Gleditschia 14: 3-49
- Fröhner, S. (1990): *Alchemilla*. In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. P. Parey IV/2B: 13-242
- Fromherz, K. (1904): *Saxifraga decipiens* Ehrh. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (193): 365-366
- Fuchs, A. (1919): *Orchis Traunsteineri* Saut. - Monographie, Erster Teil. Ber. Naturwiss. Ver. Schwaben Neuburg 42: 3-174
- Fuchs, G. (1989): Naturschutz und Landschaftspflege im Kaiserstuhl. - In: Der Kaiserstuhl - Gesteine und Pflanzenwelt: 205-235
- Fuchs, H.P. (1960): Kleine Beiträge zur Nomenklatur und Systematik der Schweizer Flora (Vorarbeiten zu einer "Flora Helvetica"). Ber. Schweiz. Bot. Ges. 70: 46-49
- Fuchs, L. (1542): *De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis ...* (Isingrin).
- Fuchs, L. (1543): *New Kreütterbuch*, Basel. Neudruck 1964
- Fuchs, L. (ca. 1565): *De stirpium historia ...* Manuskript, 3 Bände
- Fuchs-Eckert, H.P. (1979): Beiträge zur Nomenklatur und Taxonomie der Schweizer Flora. Feddes Repertorium 90: 525-689
- Füller, F. (1969): Die Orchideen Deutschlands. 8. Teil, *Platanthera*, *Gymnadenia*, *Leucorchis*. ZiemsenNeue Brehm-Bücherei 411: 56
- Füller, F. (1975): *Goodyera* und *Spiranthes*, Orchideen Mitteleuropas, 4. Teil. ZiemsenNeue Brehm-Bücherei 307: 52
- Gadella, T.W.J. (1972): Biosystematic studies in *Hieracium pilosella* L. and some related species of the subgenus *Pilosella*. Bot. Notiser 125: 361-369
- Gadella, T.W.J. (1978): Enige opmerkingen over de voortplantingswijze van *Hieracium pilosella* L. en enkele verwante taxa. Gorteria 9: 159-165
- Gadella, T.W.J. (1978): Variatie en hybridisatie bij enkele taxa van het genus *Symphytum* Gorteria 9 (4): 88-93
- Gadella, T.W.J. (1984): Cytology and the mode of reproduction of some taxa of *Hieracium* subgenus *Pilosella*. Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. 87 (4): 387-399
- Gadella, T.W.J. (1987): Sexual tetraploid and apomictic pentaploid populations of *Hieracium pilosella* (Compositae). Plant Syst. Evol. 157: 219-245
- Gadella, T.W.J. (1988): Some notes on the origin of polyploidy in *Hieracium pilosella* aggr.. Acta Bot. Neerl. 37 (4): 515-522
- Gadella, T.W.J. (1991): Variation, hybridization and reproductive biology of *Hieracium pilosella* L. Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. 94 (4): 455-488
- Gall, H.J. (1969): Zum Vorkommen von *Carex arenaria* auf den Silbergrasfluren von Speyer Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 28 (2): 111-114
- Gallandat, J.-D. (1975): A propos de la sociologie de *Hierochloe odorata* à la vallée de Joux (Jura Vaudois, Suisse) Bull. Soc. Neuchâtoise Sci. Nat. 98: 113-123
- Galunder, R. u. K. Adolphi (1988): Zur Identifikation in Deutschland neu auftretender *Cytisus*-Arten. Flor. Rundbr. 22 (1): 14-17

- Gamisans, J. u. O. Jeanmonod (1993): Catalogue des plantes vasculaires de la Corse.- Complement au prodrome de la flore Corse (Hrsg.: Jeanmonod, D. u. H.M. Burdet). Conservatoire et Jardin botanique Annexe 3: 258
- Gams, H. (1923): *Alchemilla*. - In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. C. Hanser IV/2: 943-970
- Gams, H. (1923): *Leguminosae*. - In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. C. Hanser IV/3: 1113-1436
- Gams, H. (1924): *Leguminosae*. - In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. C. Hanser IV/3: 1437-1644
- Gams, H. (1927): *Boraginaceae*. - In: Hegi, G. (Hrsg.) Illustrierte Flora von Mitteleuropa. V/3: 2122-2226
- Gams, H. (1927): *Labiatae*. - In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. V/4: 2255-2548
- Gams, H. (1948): Floren- und Vegetationsgeschichte des südlichen Schwarzwalds. in: K.Müller (Hrsg.): Der Feldberg im Schwarzwald. : 387-402
- Ganzert, C. u. H. Walentowski (1989): *Glyceria striata* (Lam.) Hitchc. - eine neue Graminee in der Flora bayerns. Ber. Bayer. Bot. Ges. 60: 191-194
- Garcke, A. (1972): Illustrierte Flora. Deutschland und angrenzende Gebiete. Gefäßkryptogamen und Blütenpflanzen. 23. Aufl. (Hrsg.: K. von Weihe). P. Parey XX: 1607
- Gardou, C. (1972): Recherches biosystématiques sur la Section *Jacea* Cass. et quelques sections voisines du genres *Centaurea* L. en France et dans les régions limitrophes. Feddes Repertorium 83: 311-472
- Garland, M.A. (1990): Infrageneric names applicable to *Hieracium* subgenus *Chionoracium* (Compositae: Lactuceae). Taxon 39: 119-124
- Garnock-Jones, P.J. (1986): Floret specialization, seed production and gender in *Artemisia vulgaris* L. (Asteraceae, Anthemideae). J. Linn. Soc., Bot. 92 (4): 285-302
- Garve, E. u. H.E. Weber (1987): Verbreitung und Soziologie von *Mimulus moschatus* in Niedersachsen. Tuexenia 7: 113-120
- Garve, E. (2001): Bemerkenswerte Pflanzenarten an der Kalihalde Buggingen in Südbaden. Carolinea 59: 67-72
- Gattenhof, G.M. (1782): *Stirpes agri et horti Heidelbergensis*. Gebr. Pfaehler : 352 S.
- Gauckler, K. (1938): Steppenheide und Steppenheidewald der Fränkischen Alb in pflanzensoziologischer, ökologischer und geographischer Betrachtung. Ber. Bayer. Bot. Ges. 23: 3-134
- Gauckler, K. (1957): Die Gipshügel in Franken, ihr Pflanzenkleid und ihre Tierwelt. Abh. Naturhist. Ges. Nürnberg 29: 1-92
- Gauckler, K. (1966): Der Amethystschwingel, neu für das Regensburger, Eichstätter und Erlanger Florengebiet (*Festuca amethystina* L. in Flora ratisbonensis, eystettensis et erlangensis) Denkschr. Regensburg Bot. Ges. N.F. 20: 15-22
- Gaudin, J. (1828): *Flora Helvetica* 1: 504
- Gaus, G. (1883,1884): Flora des Oberamtsbezirks Ehingen und die geognostischen Verhältnisse von Ehingen und Umgebung nebst geognostischer Übersichtskarte des POberamtsbezirks. :
- Gebert, R. (1972): Konkurrenzversuche mit *Centaurea jacea* L. und *C. angustifolia* Schrank. Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel 41: 25-34
- Géhu, J.-M. et al. (1972): Compte-rendu de l'excursion de l'Association Internat. de Phytosociologie dans le Jura en juin 1967. Documents Phytosociologiques 2: 1-44
- Geisler, G. (1991): Farbatlas Landwirtschaftliche Kulturpflanzen: 204
- Genser, J. (1991): Die Wacholderheiden des NSG "Eselsburger Tal" (Ostalb). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66: 107-140
- Gerstberger, P. (1978): Zur Unterscheidung von *Fragaria viridis* Duchesne und *Fragaria vesca* L. im vegetativen Zustand. Gött. Flor. Rundbr. 12: 93-97

- Gervais, C. (1973): Contribution à l'étude cytologique et taxonomique des avoines vivaces (g. *Helictotrichon* Bess. et *Avenochloa* Holub). Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 88: 1-166
- Geschke, B. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (22). Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 71
- Gesner, C. (1561): Annotationes in Pedacii Dioscoridis. libros V. Straßburg. (Siehe auch unter *Cordus*)
- Geßler, R. (1926): Von der Stuttgarter Flora insbesondere der Steppenheide. Veröff. staatl. Stelle Naturschutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 3: 111-121
- Geßler, R. u. M. Geßler (1921): Beiträge zur Flora von Stuttgart. Jahresh. Ver. vaterländ. Naturk. Württ. 77: 51-62
- Gibbs, P.E. (1968): A revision of the genus *Genista* L. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27 (1966/67): 11-99
- Gibbs, P.E. (1972): *Echium* L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 97-100
- Gilcher, S. (1993): Vegetationskundliche Studien im Deusmaurer Moor zwischen Dietkirchen und Weickenhammer. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 54: 79-101
- Gilli, A. (1974): *Orobanchaceae*.- In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. C. Hanser VI/I: 470-505
- Glazunova, K.P. (1977): On the possibility of applying theagamosexual complex theory to the systematics of angiosperms (on the example of the genus *Alchemilla* L.). Bull. Mosk. Obsc. Issp. Prir. Otd. Biol. (russ.). 82: 129-139
- Gleason, H.A. (1968): The New Britton and Brown Illustrated Flora of the Northeastern United States and Ajaent Canada, Vol. 3.: 595
- Glück, H. (1902): Über die systematische Stellung und geographische Verbreitung der *Utricularia ochroleuca* R. Hartmann. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 20 (3): 141-156
- Glück, H. (1906, 1911): Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und Sumpfgewächse. 2. Teil XII+256 S.; 3. Teil: Die Uferflora. XXIV+644 S. G. Fischer
- Glück, H. (1936): *Pteridophyten und Phanerogamen*. - Die Süßwasserflora Mitteleuropas (Hrsg.: Pascher, A.). G. Fischer 15: XX+486
- Gmelin, C. Chr. (1805-1826): *Flora Badensis, Alsatica et confinium regionum cis et transrhenanum plantas a lacu Bodanico usque ad confluentem Mosellae et Rheni sponte nascentes exhibens ...* 4 Bände: Tom.1 (1805), 768 S.; Tom.2 (1806), 717 S.; Tom.3 (1808), 796 S.; Tom.4 (1826), 808 A. Müller
- Gmelin, C. Chr. (1829): Nähere Erläuterungen und Bemerkungen über die Bei- und Nachträge zur *Flora Badensis et confinium regionum*, vom Regimentsarzt Dr. Griesselich in Karlsruhe. Mag. Pharm. 25(3): 1-44
- Gmelin, J. F. (1772): *Enumeratio stirpium agro tubingensi indigenarum*: 334
- Gmelin, J. F. (1775): *Abhandlung von den giftigen Gewächsen, welche in Teutschland und vornehmlich in Schwaben wild wachsen*. Stettinische Buchhandlung
- Gmelin, J. F. (1779): *Abhandlung von den Arten des Unkrauts auf den Aeckern in Schwaben und von dessen Benutzung in der Haushaltung und Arzneykunst. Nebst einer Zugabe von der Ausrottung derselben...* Der Naturforscher, 2.-6. Stück: 408
- Gödde, M. (1984): Zur Ökologie und pflanzensoziologischen Bindung von *Inula graveolens* (L.) Desf. in Essen. Natur und Heimat 44 (4): 101-108
- Godfery, M.J. (1933): *Monograph and Icinograph of Native British Orchidaceae*: 259
- Goetz, A. (1902): Wanderungen durch die Flora des Elzthales. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (178): 237-249
- Golder, F. (1922): Neue Standorte. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1 (8): 220-222
- Goll, W. (1884): Botanische Streifzüge um Schiltach. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (12/13): 109-112, 116-120
- Goll, W. (1887): Pflanzliches. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (34): 304-305

- Gorenflot, R. (1976): Le complexe polyploïde du *Phragmites australis* (Cav.) Trin ex Steud. (*P. communis*). Bull. Soc. Bot. France 123 (5-6): 261-271
- Görger, A. (1989): Freiburger Hausgärten: Ein Vergleich nach Struktur und Artenzahl in verschiedenen Stadtteilen. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N. F. 14: 829-868
- Gorodkov, B.N. u. A.J. Pojarkova (Hrsg.) (1953-1966): Flora Murmanskoi oblasti. 5 vols.
- Görs, S. (1951): Lebenshaushalt der Flach- und Zwischenmoorgesellschaften im württembergischen Allgäu. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 20: 169-246
- Görs, S. (1959/60): Das Pfrunger Ried. Die Pflanzengesellschaften eines oberschwäbischen Moorebietes. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 27/28: 5-45
- Görs, S. (1963): Beiträge zur Kenntnis basiphiler Flachmoorgesellschaften. 1. Teil: Das Davallseggen-Quelmoor (*Caricetum davallianae* Koch 28). Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 31: 7-30
- Görs, S. (1964): Beiträge zur Kenntnis basiphiler Flachmoorgesellschaften. 2. Teil: Das Mehlprimel-Kopfbinsenmoor. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 32: 7-42
- Görs, S. (1966): Die Blaue Heckenkirsche (*Lonicera caerulea*) im württembergischen Allgäu. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 34: 7-13
- Görs, S. (1966): Die Flora des Spitzbergs. In: Der Spitzberg bei Tübingen. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 3: 535-591
- Görs, S. (1966): Die Pflanzengesellschaften der Rebhänge am Spitzberg. In: Der Spitzberg bei Tübingen. Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 3: 476-534
- Görs, S. (1968): Der Wandel der Vegetation im Naturschutzgebiet Schwenninger Moos unter dem Einfluß des Menschen in zwei Jahrhunderten. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 5: 190-284
- Görs, S. (1968): Die Flora des Schwenninger Moores. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 5: 148-190
- Görs, S. (1968): Die Wasserfalle (*Aldrovanda vesiculosa* L.) im Landschaftsschutzgebiet Siechenweiher bei Meersburg. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 36: 27-35
- Görs, S. (1969): Die Vegetation des Landschaftsschutzgebietes Kreuzweiher im württembergischen Allgäu. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 37: 7-61
- Görs, S. (1974): Die Wiesengesellschaften im Gebiet des Taubergießen. - In: Das Taubergießengebiet - eine Rheinauenlandschaft. Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 7: 355-399
- Görs, S. (1974): Nitrophile Saumgesellschaften im Gebiet des Taubergießen. - In: Das Taubergießengebiet - eine Rheinauenlandschaft Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 7: 325-354
- Görs, S. (1977): *Tofieldietalia*. - In: E. Oberdorfer: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil I. G. Fischer : 243-272
- Görs, S. u. Th. Müller (1969): Beitrag zur Kenntnis der nitrophilen Saumgesellschaften Südwestdeutschlands. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. 14: 153-168
- Görs, S. u. Th. Müller (1974 (1975)): Flora der Farn- und Blütenpflanzen des Taubergießengebietes. - In: Das Taubergießengebiet - eine Rheinauenlandschaft. Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 7: 209-283
- Göttlich, K. (1951): Das Häckler Ried. Seine Entstehung und sein gegenwärtiger Zustand Veröff. Württ. Landesst. Naturschutz Landschaftspflege 20: 5-64
- Göttlich, K. (1955): Ein Pollendiagramm ungestörter späteiszeitlicher Verlandungsschichten im Federseebecken. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 14: 88-92
- Göttlich, K. (1960): Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Moore in Oberschwaben. Teil 1: Moore im Bereich der Altmoräne und der Äußeren Jungmoräne. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 115: 93-174
- Göttlich, K. u. W. Winterhoff (1973): Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Moore in Oberschwaben. Jh. Ges. Naturk. Württ. 128: 127-141

- Gottschalk, W. (1976): Die Bedeutung der Polyploidie für die Evolution der Pflanzen. G. Fischer: 500
- Gottschlich, G. (1979): Zwei Neubestätigungen zur Flora von Württemberg: *Orobanche hederæ* Duby und *Senecio inaequidens* DC. Gött. Flor. Rundbr. 13: 50-52
- Gottschlich, G. (1985): Die Haupt- und Zwischenarten der Gattung *Hieracium* L. (Compositae) in Südwest-Deutschland. Jh. Ges. Naturk. Württ. 140: 151-182
- Gottschlich, G. (1987): *Hieracium*. In: Wagenitz, G.: Nachträge, Berichtigungen und Ergänzungen zum Nachdruck der 1. Auflage von Band VI/2 1928/29) in Hegi, G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa Bd. 6 Teil 4, 2. Auflage, hrsg. von G. Wagenitz. P. Parey
- Gottschlich, G. (1989): Anmerkungen zu Fundmeldungen von *Hieracium racemosum* WALDST. & KIT. ex WILLD. aus dem außeralpinen Mitteleuropa. Hess. Flor. Briefe 38 (3): 36-44
- Gottschlich, G. (1990): Echinina-Abkömmlinge der Gattung *Hieracium* in der Flora der Schweiz. Bauhinia 9 (3): 221-226
- Gottschlich, G. (1992): In Sachen Habichtskräuter kontra Kletterer. Mitt. Deutsch. Alpenver. 44 (3): 264
- Gottschlich, G. (2001): *Hieracia Finckhiana rediviva*, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 1: S. 27-33
- Gottschlich, G. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (23-24). Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 71-72
- Gottschlich, G. (2003): Die Hieracien des Rathgeb-Herbariums (TUB) inkl. *Willemetia* und heutiger *Crepis*- und *Tolpis*-Arten, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 2: S. 25-39
- Gottschlich, G. u. U. Raabe (1992): Zur Verbreitung, Ökologie und Taxonomie der Gattung *Hieracium* L. (Compositae) in Westfalen und angrenzenden Gebieten. Abh. Westf. Mus. Naturk. 53 (4): 3-140 (1991)
- Gottschlich, G. u. W. Schnedler (1991): Daten zur Verbreitung infraspezifischer *Hieracium*-Sippen in Hessen und den unmittelbaren Nachbargebieten. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. 113: 45-90
- Götz, A. (1882): In: Neue Standorte. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (1): 12-16
- Götz, A. (1893-1894): Die Rubusflora des Elzthaales. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3: 47-50, 87-88 (1893); 151-157 (1894)
- Götz, C.F. (1890): Beiträge zur Flora der Umgebung von Löwenstein. Aus der Heimat 3: 14-16, 29-35, 56-61
- Gould, F. W., M. A. Ali and D. E. Fairbrothers (1972): A Revision of *Echinochloa* in the United States American Midland Naturalist 87: 36-59
- Gradmann, R. (1892): Beiträge zur württembergischen Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 48: 102-106
- Gradmann, R. (1898, 1900): Das Pflanzenleben der Schwäbischen Alb mit Berücksichtigung der angrenzenden Gebiete Süddeutschlands. - 1. Aufl. Tübingen (Schwäb. Albverein) 1898, 2. Aufl. Tübingen 1900. Schwäbischer Albverein
- Gradmann, R. (1909): Uracher Alplandschaft. Blätter des Schwäbischen Albvereins 21 (8): 241-250
- Gradmann, R. (1912): Die Pflanzenwelt. In: Beschreibung des Oberamtes Münsingen. : 109-126
- Gradmann, R. (1915): Die Pflanzenwelt. In: Beschreibung des Oberamtes Tettnang. : 97-103
- Gradmann, R. (1936): Das Pflanzenleben der Schwäbischen Alb. 3. Aufl.; Band 1: Pflanzengeographische Darstellung. XVI + 470; Band 2: Nachschlagbuch. XXXIX + 351; Schwäbischer Albverein
- Gradmann, R. (1950): Das Pflanzenleben der Schwäbischen Alb. 4. Aufl.; Band 1: Pflanzengeographische Darstellung. XVIII + 449 S.; Band 2: Die Flora der Schwäbischen Alb. XLIV + 407 S.; Schwäbischer Albverein

- Graebner, P. u. O. Kirchner (1912): *Gagea*. In: Kirchner, Löw u. Schröter: Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas. Spezielle Ökologie der Blütenpflanzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. E.Ulmer 1, Abt. 3: 326-355
- Graham, G.G. and A.L. Primavesi (1990): Notes on some *Rosa* taxa recorded as occurring in the British Isles. *Watsonia* 18: 119-124
- Gramlich, R. (1991): *Veronica argute-serrata* - neu für Deutschland. *Flor. Rundbr.* 25 (1): 3-5
- Grau, J. (1964): Die Zytotaxonomie der *Myosotis alpestris*- und der *Myosotis silvatica*-Gruppe in Europa. *Österr. Bot. Zeitschr.* 111: 561-617
- Grau, J. (1967): Cytotaxonomische Bearbeitung der Gattung *Myosotis* L. - III. Die annuellen Sippen. *Mitt. Bot. Staatssammlungen München* 7: 17-100
- Grau, J. (1970): Cytotaxonomische Bearbeitung der Gattung *Myosotis* L. - IV. Ergänzende Studien. *Mitt. Bot. Staatssammlungen München* 8: 127-136
- Grau, J. (1971): Cytologische Untersuchungen an Boraginaceen II. *Mitt. Bot. Staatssammlungen München* 9: 177-194
- Grau, J. (1980): *Centaurea stenolepis* Kerner in Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 51: 109-116
- Grau, J. u. A. Schwab (1982): Mikromerkmale der Blüten zur Gliederung der Gattung *Myosotis* L. *Mitt. Bot. Staatssammlungen München* 18: 9-58
- Grau, J. u. H. Merxmüller (1972): *Myosotis* L. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). : 11-117
- Grau, J. u. H. Merxmüller (1982): *Myosotis* L. - In: *Flora d'Italia*, Vol. 2 (Hrsg.: Pignatti): 420-426
- Grayum, M. (1987): A summary of evidence and arguments supporting the removal of *Acorus* from the Araceae *Taxon* 36 (4): 723-729
- Grayum, M. (1991): Systematic embryologie of Araceae *Bot. review* 57: 167-203
- Green, M.L. (1929): Genera 501 - end. In: Hitchcock, A.S. u. M.L. Green: Standard species of Linnean genera of Phanerogamae. In: *International Bot. Congress Cambridge (England), 1930. Nomenclature proposals by British botanists: 155-195*
- Gregg, S. (1984): Die vorläufigen Ergebnisse der paläoethnobotanischen Untersuchungen der bandkeramischen Siedlung Ulm-Eggingen. *Archaeologica Venatoria* 7: 25-32
- Gregg, S. (1989): 8. Paleo-Ethnobotany of the Bandkeramik Phases. - In C.-J. Kind: *Ulm-Eggingen. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ.* 34: 367-399
- Gregor, T. & Koch, E. (2004): Das Frühblühende Fingerkraut (*Potentilla praecox* F.W. Schultz) – ein Endemit des Hochrheingebietes, *Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 3: S. 3-14*
- Gremaud, M. (1981): Recherches de taxonomie expérimentale sur le *Carduus defloratus* L. s.l. (Compositae). I. *Rev. Cytol. Biol. Vég.* 4: 1-75, 111-172
- Gremlı, A. (1867): Beiträge zur Flora von Schaffhausen. *Österr. Bot. Zeitschr.* 17: 391-396
- Gremlı, A. (1867): *Excursionsflora für die Schweiz.*
- Gremlı, A. (1880): *Neue Beiträge zur Flora der Schweiz. 1. Heft.*
- Greuter, W. et al. (1988): *International Code of Botanical Nomenclature. Regnum Veg.* 118 I-XIV: 1-328
- Greuter, W. et al. (1993): *Names in current use for extant plant genera. : XXVII + 1464*
- Greuter, W. et al. (1994): *International Code of Botanical Nomenclature (Tokyo Code). : XVIII + 389*
- Greuter, W. u. Th. Raus (eds.; 1986): *Med-Checklist Notulae 13. Willdenowia* 16: 103-116
- Greuter, W. u. Th. Raus (eds.; 1987): *Med-Checklist Notulae 14. Willdenowia* 16: 439-452
- Greuter, W., H.M. Burdet u. G. Long (1984, 1986): *Med-Checklist, Vol. 1. Pteridophyta (ed. 2), Gymnospermae, Dicotyledones (Acanthaceae - Cneoraceae). 330 S.; Vol. 3. Dicotyledones (Convolvulaceae - Labiatae). 395 S. Conservatoire et Jardin botanique*
- Greuter, W., H.M. Burdet u. G. Long (eds.; 1989): *Med-Checklist. Vol. 4, 458 S. + Anhang*

- Greuter, W., R.K.Brummit, E.Farr, N. Kiliyas, P.M.Kiliyas, P.C. Silva (1993): Names of Current Use for Extant Plant Genera. *Regnum vegetabile* 129: 1-1464
- Greuter, W., U. Matthäs und H. Risse (1985): Additions to the flora of Crete, 1973-1983 (1984) - III *Willdenowia* 15: 23-60
- Griesselich, L. (1836): Kleine botanische Schriften. Erster Theil. Versuch einer Statistik der Flora Badens, des Elsasses, Rheinbayerns und des Cantons Schaffhausen. J. Velten: 392
- Grime, J.P., J.G. Hodgson u. R. Hunt (1989): Comparative Plant Ecology. A functional approach to common British species. Unwin Hyman : IX u. 742
- Grims, H. (1988): Die Gattung *Alchemilla* (Rosaceae) in Oberösterreich. *Linzer biol. Beitr.* 20 (2): 919-979
- Gröger, M.G. (1985): Untersuchungen am *Myosotis scorpioides* agg. in Bayern. Unveröff. Zulassungsarbeit: 88
- Gross, L. (1906): Zur Flora des Badischen Kreises Konstanz. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 5 (219/211): 69-104
- Gross, L. (1906): Zur Flora des Badischen Kreises Konstanz. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 210 u. 211: 69-84
- Gross, L. (1908): Zur Flora des Maintals. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk.* 5 (228-230): 213-234
- Grossmann, A. (1973): Ein südamerikanisches Gras - die Pampas-Trespe - auf dem Gelände der Pädagogischen Hochschule Lörrach. *Schriftenreihe Pädagogische Hochschule Lörrach* 1
- Grossmann, A. (1973): Was ist *Bromus unioloides*? *Göttinger Florist. Rundbriefe* 7 (1): 13-19
- Grossmann, A. (1979): Der Rustelgraben und seine Pflanzenwelt. In: *Der Buchswald bei Grenzach (Grenzacher Horn)*. *Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ.* 9: 207-223
- Grossmann, A. (1989): Die Pflanzenwelt des Belchengebietes im Südschwarzwald. In: *Der Belchen im Schwarzwald*. *Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ.* 13: 617-745
- Grossmann, A. u. P. Schmidt (1972): Notiz über *Thymus* in der Rhön. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 43: 21-24.
- Grund, T. (2001): Neue Fundorte - Bestätigungen - Verluste (25-50). *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 1: 72-74
- Grunicke, U. u. P. Poschlod (1991): Phänologische Untersuchungen in beweideten und brachgefallenen Kalkmagerrasen. *Jahresh. Ges. Naturk. Württ.* 146: 41-84
- Grüninger, W. (1967): Neue Funde des Bemalten Perlgrases *Melica picta* (Koch). *Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 122: 126-128
- Grüttner, A. (1987): Das Naturschutzgebiet "Briglirain" bei Furtwangen (Mittlerer Schwarzwald). Vegetationskundliche Untersuchungen eines Komplexes aus Moor-, Wiesen- und Weidegesellschaften. *Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 62: 161-271
- Grüttner, A. (1990): Die Pflanzengesellschaften und Vegetationskomplexe der Moore des westlichen Bodenseegebiets. *J. CramerDiss. Bot.* 157: 1-323
- Grüttner, A. u. R. Warnke-Grüttner (1993): Indication of dynamics in the present-day vegetation of the Federsee fen ecosystem (SW-Germany) - a development of two hundred years. *Phytocoenologia* 21: 353-367
- Grüttner, A. u. R. Warnke-Grüttner (1996): Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes Federsee (Oberschwaben) - Zustand und Wandel *Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 86: 1-314
- Guinea, E. (1972): *Lavandula* L. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 187-188
- Guinochet, M. u. R. de Vilmorin (1975): *Flore de France*, Fascicule 2. Editions du centre national de la recherche scient. : 367-818
- Gumprecht, R. (1973): *Ophrys fuciflora* mit außergewöhnlicher Blütezeit. *Die Orchidee* 24: 257
- Gumprecht, R. (1980): *Ophrys fuciflora* ssp. *elatior* ssp. nov. *Die Orchidee* 31: 59-62
- Günther, H. u. Th. v. Elsen (1993): Ackerwildkraut-Gesellschaften im östlichen Meißner-Vorland/Nordhessen und Veränderungen im Auftreten bemerkenswerter Ackerwildkräuter nach 15 Jahren. *Tuexenia* 13

- Güntzel, U., F. Seidel u. H. Kating (1967): Untersuchungen über Inhaltsstoffe von Arnica-Arten. I. Der Gehalt an ätherischem Öl in den Blüten verschiedener Arnica-Arten. *Planta Medica* 15: 205-214
- Gusuleac, M. (1931): Die monotypischen und artenarmen Gattungen der Anchuseae I. und II. *Feddes Repertorium* 29: 42-47 u. 113-126
- Gutermann, W. (1962): Diploides *Lamium galeobdolon* (sensu lato) in Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 35: 43-45
- Gutermann, W., F. Ehrendorfer u. M.A. Fischer (1973): Neue Namen und kritische Bemerkungen zur Gefäßpflanzenflora von Mitteleuropas. *Österr. Bot. Zeitschr.* 122: 259-273
- Haber, W. (1976): Orchids and conservation. *Proceed. 8. World Orchid Conference Frankfurt 1975*: 73-79
- Häberle, K.-H. u. M. Hennecke (1991): Optimierung von Pflegemaßnahmen aufgrund bodenökologischer Untersuchungen in Naturschutzgebieten. *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 23(1): 179-202
- Hackel, E. (1881): Die verwandtschaftlichen Beziehungen und die geographische Verbreitung der europäischen *Festuca*-Arten. *Bot. Centralblatt* 8: 401-419
- Hackel, E. (1882): *Monographia Festucarum europaeorum*. Theodor Fischer: 216
- Hackel, E. (1890): Über einige Eigenthümlichkeiten der Gräser trockener Klimate. *Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien* 40: 125-138
- Haeupler, H. (1967): Beitrag zur Kenntnis der *Potentillae vernaes*. *Gött. Flor. Rundbr.* 1967 (Neudruck 1969): 5-8
- Haeupler, H. (1969): *Melilotus altissimus* Thuill., eine weitere bislang "übersehene" Art unserer Flora. *Gött. Flor. Rundbr.* 3: 43-44
- Haeupler, H. (1969): Morphologische und pflanzengeographische Beobachtungen an *Gagea*-Arten im südlichen Niedersachsen. *Mitt. flor.-soziol. Arbeitsgem. N.F.* 14: 36-46
- Haeupler, H. (1971): *Glyceria striata* (Lam.) Hitchc. - ein Neubürger in Deutschlands Gramineenflora. *Göttinger Florist. Rundbr.* 5/4: 63-68
- Haeupler, H. (1976): Flora von Südniedersachsen Teil 1: Atlas zur Flora von Südniedersachsen *Erich Goltze Scripta Geobotanica* 10: 367
- Haeupler, H. (1978): Erfassung ökologischer Daten in Rastersystemen, dargestellt am Beispiel floristischer Kartierungen. *Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 11: 9-17
- Haeupler, H. u. P. Schönfelder (Hrsg.; 1988): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. E. Ulmer: 768
- Häfliger, E. u. H. Scholz (1981): Grass Weeds 2: Weeds of the subfamilies Chloridoideae, Pooideae, Oryzoideae. *Documenta Ciba-Geigy*: 137
- Hafner, A. (1989): Umweltrekonstruktion und Modell einer Landschaftsnutzung der jungneolithischen Siedlung Reute-Schorrenried. *Palaeoethnobotanische und moorstratigraphische Untersuchungen im Schorrenried bei RFeute-Bad Waldsee, Kreis Ravensburg*. Unpubl. Magisterarbeit, Univ. Freiburg
- Hafner, A. (1991): Müssen im Landkreis Calw (1): Floristisch-faunistische Erhebungen im "Heselwasen". *Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 62: 1-128
- Hagenbach, C.F. (1821, 1834): *Tentamen Florae Basileensis*. 2 Bände. J.G. Neukirch : 450+537
- Hagenbach, C.F. (1843): *Florae basiliensis supplementum*. J.G. Neukirch: 220
- Hagendijk, A., J.L. Van Soest u. H.A. Zevenbergen (1982): *Taraxacum Sectie Vulgaria* Dahlstedt. *Flora Neerlandica IV (10a)*: 79-150
- Haglund, G.E. (1950): Einige *Taraxaca* aus der Schweiz. *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 60: 231-243
- Hailer, N. (1968): Die lanzettblättrige Glockenblume breitet sich aus. *Pfälzer Heimat* 4: 140-143
- Haines, R.W. u. V.A. Lye (1972): Studies on African Cyperaceae. VII: Panicle morphology and possible relationships in Sclerieae and Cariceae. *Bot. Not.* 125: 331-343
- Haisch, B. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (51-53). *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 1: 74

- Haller, A. (1742): Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum. 2 Bände. A. Vadenhoek: 794
- Haller, A. von (1768): Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata. 1-3:
- Hammel, S. (1994): Zum Vorkommen des großen Windröschens im Stromberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 68/69: 265-285
- Hammel, S. (1995): Orchideenvorkommen auf dem Gebiet der Stadt Vaihingen an der Enz. Schriftenreihe Stadt Vaihingen 9: 245-270
- Hammel, S. (1996): *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. im Stromberg (Baden-Württemberg) - Verbreitung, Dynamik, Naturschutz. Journ. Europ. Orch. 28(2): 323-338
- Hammel, S. (2002): *Levisticum officinale* Koch 1824, ein neuer Wirt der Gattung *Orobanche* L. in Europa. Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 158: 113-117
- Hammel, S. u. T. Grund (1993): Orchideenvorkommen in Weinbergbrachen des westlichen Strombergs unter besonderer Berücksichtigung der Standortbedingungen und Vergesellschaftungen. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 25(3): 385-404
- Hand, R. (1993): Die Gattung *Hieracium* L. in der Eifel und angrenzenden Gebieten - Untersuchungen über Verbreitung, Soziologie und Gefährdung der Haupt- und Zwischenarten. Dipl.-Arb. Univ. Bonn.
- Hand, R. (2001): Revision der in Europa vorkommenden Arten von *Thalictrum subsectio Thalictrum*. - Botanik und Naturschutz in Hessen, Beiheft 9, 358 pp., Frankfurt/Main (Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen).
- Hand, R. (2003): Anmerkungen zu *Veronica orsiniana*, *Veronica satyroides* und *Veronica teucrium* an Mosel und Saar, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 2: S. 41-50
- Handel-Mazzetti, H. v. (1907): Monographie der Gattung *Taraxacum*: 175
- Handel-Mazzetti, H. v. (1910): Revision der balkanischen und vorderasiatischen *Onobrychis*-Arten aus der Sektion *Eubrychis*. Österr. Bot. Zeitschr. 60: 5-12
- Hanelt, P. (1994): Ordnung Himmelsleiterartige Polemoniales. - In: *Urania Pflanzenreich Blütenpflanzen 2* Urania Verlagsgesellschaft : 209-219
- Hanemann, J. (1924): Die Hygrophyten des zum schwäbisch-fränkischen Hügellande gehörigen Keupergebietes östlich vom Neckar und der Fränkischen Platte. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 80: 30-47
- Hanemann, J. (1927): Ergebnisse der floristischen Durchforschung des östlichen und nordöstlichen Teiles Württembergs. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 83: 23-48
- Hanemann, J. (1929): Ergebnisse der floristischen Durchforschung des östlichen und nordöstlichen Teils von Württemberg (Fortsetzung). Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 85: 62-109
- Hanemann, J. (1938): Die Flora der näheren und weiteren Umgebung Rothenburgs ob der Tauber. J.P. Petersche Buchhandlung: 92
- Hanf, M. (1982): Ackerunkräuter Europas mit ihren Keimlingen und Samen. Verlagsunion Agrar. : 496
- Hansen, A. (1960): *Agropyron*-hybrider i Danmark Botanisk Tidskrift 55: 296-312
- Hansen, A. (1962): *Dipsacus pilosus* L. findes naeppe i Sverige. Bot. Notiser 115: 106-108
- Happel, E. (1984): Die Violette Sommerwurz, *Orobanche purpurea* Jacq., im Buntsandstein-Odenwald. Hess. Flor. Briefe 33 (1): 11
- Hara, H. (1981): A new species of the genus *Adoxa* from Mt. Omei of China. J. Jap. Bot. 56 (9): 271-274
- Harlan, J.R. (1945): Cleistogamy and chasmogamy in *Bromus carinatus* Hook. and Arn. Amer. J. Bot. 32: 66-72
- Harley, R.M. (1972): *Mentha* L. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 183-186
- Harley, R.M. (1972): Notes on the genus *Mentha* (Labiatae). J. Linn. Soc., Bot. 65: 250-253

- Harms, K.H., G. Philippi u. S. Seybold (1983): Verschollene und gefährdete Pflanzen in Baden-Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 32: 1-160
- Harms, K.H., M. Kübler-Thomas, J. Morawcsik, C. Rösingh u. C. Antesberger (1989): Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg. Band 1. Landesanstalt für Umweltschutz Bad.-Württ.
- Hartl, D. (1956): Eine weitere Mitteilung über die Verbreitung der Weidenseide (*Cuscuta lupuliformis* Krockner). Hess. Flor. Briefe 5 (53): 2-3
- Hartl, D. (1965): Scrophulariaceae. - In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. VI, 1. Teil. : 1-469
- Hartl, D. (1966): Ein Beitrag zur Kenntnis von *Cuscuta lupuliformis* Krockner. Hess. Flor. Briefe 15 (173): 23-25
- Haslam, S. M. (1972): Biological Flora of the British Islands. *Phragmites communis*. Journal of Ecology 60: 585-610
- Hassler, M. (1988): Flora und Fauna von Bruchsal und Umgebung. AGNUS & BUND V/1,2 Flora: 205
- Hassler, M. (1988): Verbreitungskarten zur Flora: 455 + III
- Hassler, M. (1997): Spargel, Steppe und Sandrasen: Das Naturschutzgebiet Frankreich und die Naturkunde der Waghäusler Gemarkung Verlag Regionalkultur: 216
- Hassler, M. (Hrsg.) (1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region: 553
- Hatz, H. (1882): Beiträge zur Rubus-Flora des badischen Oberlandes. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (1): 1-6
- Hatz, H. (1882): Neue Standorte. Mitt. Bot. Ver. Kreises Freiburg und das Land Baden 2: 25-27
- Hatz, H. (1885): Neue Standorte Mitt. Bad. Bot. Ver. 23: 208-209
- Hau, F. (1983): Beobachtungen um Hof. Unsere Natur : 62-71
- Hauff, R. (1936): Die Rauhe Wiese bei Böhmenkirch-Bartholomä. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 12: 78-141
- Hauff, R. (1937): Die Buchenwälder auf den kalkarmen Lehmböden der Ostalb und die nacheiszeitliche Waldentwicklung auf diesen Böden. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 93: 51-97
- Hauff, R. (1964): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25000 Blatt 8123 Weingarten (Hrsg.: Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart). Landesvermessungsamt Bad.-Württ.: 47
- Hauff, R. (1965): Die Bodenvegetation älterer Fichtenbestände auf aufgeforsteten Schafweiden der Mittleren Alb. Mitt. Ver. Forstl. Standortskunde Forstpflanzenzucht. 15: 39-43
- Hauff, R. u. O. Sebald (1965): Ein floristisch und vegetationsgeschichtlich interessantes Moor bei Haigerloch. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 120: 224-231
- Hauff, R. u. O. Sebald (1977): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25000 Blatt 7818 Wehingen. Landesvermessungsamt Stuttgart. Landesvermessungsamt Bad.-Württ. : 53
- Hauff, R., B. Walderich, H. Köhler u. W. Bücking (1984): Die Neue Hülbe bei Böhmenkirch - eine Feldhülbe der Ostalb, seit 50 Jahren unter Naturschutz. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58: 129-156
- Haug, A. (1899): Beiträge zur Ulmer Flora. Mit. Ver. Naturw. Math. Ulm 9: 57-62
- Haug, A. (1901): Beiträge zur Ulmer Flora. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 10: 103-104
- Haug, A. (1903): Beiträge zur Ulmer Flora. Mit "Nachtrag zum Ergebnis der Pflanzengeographischen Durchforschung Württembergs im Oberamtsbezirk Ulm. Jh. Ver. Math. Nat. Ulm 11: 88-92
- Haug, A. (1906): Beiträge zur Ulmer Flora. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 12: 146
- Haug, A. (1907): Beiträge zur Ulmer Flora. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 13: 57
- Haug, A. (1907): Über Veränderungen in der Ulmer Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 63: XLV-XLVI
- Haug, A. (1909): Beiträge zur Ulmer Flora. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 14: 220

- Haug, A. (1915): Das Ulmer Herbarium des Hieronymus Harder. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 16: 38-92
- Haug, M. (1986): *Campanula rhomboidalis* neu für Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 57: 177
- Hauser, H. (1974): Klettgau, Randen und Schweizer Jura. Bericht über Exkursionen. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 6: 19-29
- Hausrath, C. (1891): *Linaria striata* D.C. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (93): 363
- Havlickova, J. (1982): *Carex flava*-complex in the Czech lands. I. Analysis of the variability of morphological characters. Preslia 54: 201-222
- Hayek, A. von (1901): Die *Centaurea*-Arten Österreich-Ungarns. Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl. 72: 189
- Hayek, A. von (1909): *Rosa*. In: Flora von Steiermark. 1: 888-944
- Hayek, A. von (1915): Die Trichome einiger heimischer *Senecio*-Arten. Österr. Bot. Zeitschr. 65: 292-297
- Heath, P. V. (1990): On typifying names validated by text accompanied by a plate. Taxon 39: 492-498
- Heckel, G. (1929): Beiträge zur Flora des nordwestlichen Württembergs. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 85: 110-137
- Hedge, I.C. (1970): *Onobrychis*. In: P.H. Davis (ed.): Flora of Turkey. Univ. Press 3: 560-589
- Heer, O. (1872): Über den Flachs und die Flachskultur im Altertum. Neujahrsbl. Zürich. Naturf. Ges. 74: 1-26
- Heer, W., K. Kübler, W.K. Mayer, H. Mischke, A. Regen, J. Rothgeber, I. Jandl u. D. Rodi (1988): Das kalte Feld. *Unicornis* 4: 1-37
- Hegelmaier, F. (1864): Monographie der Gattung *Callitriche*. Ebner u. Seubert : 64 S., 4 Taf.
- Hegelmaier, F. (1873): Über die Moosvegetation des schwäbischen Jura; mit Anhang: Zusammenstellung der im Gebiete des Vereins für vaterl. Naturkunde in Württ. beobachteten Muscineen Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 29: 145-254
- Hegelmaier, F. (1886): Eine verkannte Phanerogame des schwäbischen Jura. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 42: 331-339
- Hegelmaier, F. (1906): *Alchimilla* des schwäbischen Jura. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 62: 1-12
- Hegi, G. (1906-1997, im Druck): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 7 Bände. 1. Aufl. 1906-1931; München (C. Hanser). 2. Aufl. 1936-1979; München (C. Hanser) bzw. Berlin, Hamburg (P. Parey). 3. Aufl. 1966-; Berlin, Hamburg (P. Parey).
- Hegi, G. (1954): *Tussilago*. - In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. C. Hanser; P. Parey
- Hegi, G. (1968): Nachträge, Berichtigungen, Ergänzungen. C. Hanser : 1733-2645
- Heimberger, H. (1950): Der Speierlingsbaum. Baden 2 (3): 8-9
- Heine, A. (1956): *Eragrostis tef* (Zuccagni) Trotter, eine in Hessen und Unterfranken neu eingeführte Kulturpflanze Hess. Flor. Briefe 5 (52): 1-3 (233-235)
- Heine, H.-H. (1952): Beiträge zur Kenntnis der Ruderal- und Adventivflora von Mannheim, Ludwigshafen und Umgebung. Jahresber. Ver. Naturk. Mannheim 117/118 (177/178): 85-132
- Heinrich, W. (1984): Bemerkungen zum binnenländischen Vorkommen des Salzschwadens (*Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.). *Haussknechtia* 1: 27-41
- Heinrich, W. u. R. Lorenz (1996): Frauenschuh (*Cypripedium calceolus* L.) - Die Orchidee des Jahres 1996. Ber. Arbeitskreis Heim. Orch. 13: 61-93
- Heinrich, W., W. Hilbig u. E. Niemann (1972): Zur Verbreitung, Ökologie und Soziologie der Roten Pestwurz (*Petasites hybridus* (L.) Gaertn., Meyer et Scherb.). Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Universität Jena 21: 1099-1124
- Heinz, W. (1953): Das Dürbheimer Ried. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 22: 132-145

- Heitz, C. (1990): Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz (begr. von A. Binz). Schwabe & Co: 659
- Held, F. u. S. Seybold (1987): Die Vegetation des Naturschutzgebiets Wüstrnächstenbach bei Weinheim. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 62: 273-280
- Helfrich, Th. u. W. Lohwasser (1990): Zur Verbreitung der behaarten Karde (*Dipsacus pilosus* L.) und der Schlanken Karde (*Dipsacus strigosus* Willd. ex Roemer et Schultes) in Oberfranken. Ber. Naturf. Ges. Bamberg 65: 25-61
- Heller, M. (1981): Naturschutzgebiet Aalkistensee. Naturkundliche Beschreibung mit Schwerpunkt Vogelwelt. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 53/54: 357-381
- Heller, M. (1984): Der Baiselsberg im Stromberg - ein ökologisch bedeutsamer Lebensraum. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58: 63-78
- Hempel, W. (1970a): *Melica nutans* L. x *Melica uniflora* Retz. (*Melica weinii* hybr. nov.) - ein interessanter Bastard zweier Perlgrasarten. *Hercynia* N. F. 7: 329-336
- Hempel, W. (1970b): Taxonomische und chorologische Untersuchungen an Arten von *Melica* L. Subgen. *Melica*. *Feddes Repertorium* 81/1-5: 131-145
- Hempel, W. (1975): Der Rückgang der Moorfetthenne (*Sedum villosum* L.) in den Bezirken Dresden, Karl-Marx-Stadt und Leipzig. *Arch. Naturschutz Landschaftspflege* 15: 33-45
- Henderson, N.C. (1962): A taxonomic revision of the genus *Lycopus* (Labiatae). *The American Midland Naturalist* 68 (1): 95-138
- Hendrych, R. (1987): Einige Bemerkungen zu den *Echinops*-Arten in der Tschechoslowakei. *Preslia* 59: 135-154
- Hendrych, R. (1990): Dritte Reihe der Ergänzungen zur *Trifolium*-Monographie von Zohary und Heller (*plantae hybridae*). *Preslia* 62: 43-60
- Henker, H. (1979): Neue, seltene oder kritische Adventivpflanzen Mecklenburgs. *Bot. Rundbr. Bez. Neubrandenburg* 10: 33-41
- Henn, K. (1954): Das Herz-Zweiblatt (*Listera cordata*) in einem oberschwäbischen Moor. *Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 109: 133-134
- Henn, K. u. H. Sonnabend (1983): Florenliste des Mindelseegebietes. In: *Der Mindelsee bei Radolfzell. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ.* 11: 303-353
- Henne, P., S. Seelig, P. Zimmermann (1996): Erfassung, Bewertung und Verbreitung der Wacholderheiden im Landkreis Calw. *Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 88: 19-135
- Hennecke, M. (1990): Gemeinsame Orchideen von Eurasien und Nordamerika. *Mitt.-Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 22(4): 727-771
- Henrard, J. T. (1934): Notes on the genus *Digitaria* *Blumea* 1: 90-114
- Hensen, K.J.W. (1987): Het *Echinops*-sortiment van Botanische tuinen en Nederlandse vastplantenkwekers. *Mededelingen Botan. Tuinen Belmonte Arboretum* 9 (4): 84-96
- Hepp, E. (1956): Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefäßkryptogamenflora von Bayern VIII/2. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 31: 24-53
- Herborg, J. (1985): *Senecio ovatus* (P. Gaertn., Mey. & Scherb.) Willd., der korrekte Name für *Senecio fuchsii* C.C. Gmelin. *Willdenowia* 15: 183-186
- Herborg, J. (1987): Die Variabilität und Sippenabgrenzung in der *Senecio nemorensis*-Gruppe (Compositae) im europäischen Teilareal. *J. Cramer Diss. Bot.* 107: 262 S.
- Hermann, F. (1941): Zur Unterscheidung unserer heimischen Erdbeerarten. *Feddes Repertorium* 50: 363-365
- Hermann, J. (1890): Beiträge zur Flora des nördlichen Schwarzwalds. *Aus der Heimat* 3: 90-93
- Hermann, J. (1891): Beiträge zur Schwarzwaldflora. *Aus der Heimat* 4: 100-101
- Herrmann, H. (1965): Interessantes über die geschützten Pflanzen im Gebiet des Rambergs: 38
- Herrmann, H. (1970): Die *Ophrys*-Arten und ihre Variationen in der Baar. *Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar* 28: 260-298

- Herrmann, H. (1976,1977): Farb- und Formabweichungen beim Frauenschuh und bei einigen anderen Orchideenarten der Baar und angrenzender Gebiete. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Baden-Württ. 44-45: 141-165
- Herrmann, H. (1979): Der Naturlehrpfad im NSG Ramberg-Rehletal. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Baden-Württ. 49-50: 107-112
- Herrmann, H. (1980): Bemerkenswerte Funde zur Flora und Fauna der Baar. Schriften Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 33: 145-150
- Herrmann, M. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (54-63). Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 74-75
- Herter, L. (1887): Beiträge zur Moosflora Württembergs. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 43: 176-220
- Herter, L. (1888): Mitteilungen zur Flora von Württemberg. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 44: 177-204
- Herter, W. (1996): Die Xerothermvegetation des oberen Donautales Landesamt für UmweltschutzProjekt "angewandte Ökologie" 10: 274
- Herter, W. (1996): Die Xerothermvegetation des Oberen Donautales. Gefährdung der Vegetation durch mensch und Wild. Landesanstalt für Umweltschutz, Projekt "Angewandte Ökologie" 10: 274
- Herzog, T. (1942): Moosgesellschaften des höheren Schwarzwaldes. Flora 136: 263-308
- Herzog, T. (1948): Die Mooswelt des Feldberggebietes. - In: Der Feldberg im Schwarzwald: 363-379
- Herzog, Th. (1896): Neue Standorte der badischen Flora. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3 (141): 366-368
- Hess, H.E., E. Landolt u. R. Hirzel (1967-1980): Flora der Schweiz. Bd. 1, 858 S. (1967), Bd. 2, 956 S. (1970), Bd. 3, 876 S. (1972). Birkhäuser
- Heusser, C. (1938): Chromoseomenverhältnisse bei schweizerischenn basitonnen Orchideen. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 48: 562-605
- Heyn, C.C. (1970): Lotus. - In: P.H. Davis (ed.): Flora of Turkey. Univ. Press 3: 518-531
- Heywood, V.H. (1978): Flowering plants of the world. Univ. Press
- Heywood, V.H. (1982): Blütenpflanzen der Welt. Birkhäuser: 336
- Heywood, V.H. (Edit.) (1993): Flowering plants of the world: 335
- Heywood, V.H. u. C.J. Humphries (1977): In: V.H. Heywood, J.B. Herborne, B.L. Turner (ed.): The Biology and Chemistry of the Compositae. 2 Bände. Academic Press
- Heywood, V.H. et D. Zohary (1995): A catalogue of the wild relatives of cultivated plants native to Europe. An enumeration of the wild genetic resources of native European pölants that are grown in Europe for food, forage, ornament, timber and other purposes. Flora Mediterranea 5: 375-415
- Hildebrand, F. (1890): Über das Vorkommen von *Campanula rhomboidalis* in der Freiburger Flora. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (80): 237-239
- Hiller, C.F. (1805): Botanische Excursionen auf einen Theil der wirtembergischen Alpen. In Briefen an meinen Freund Raiger. - In: Neues Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst auf das Jahr 1805: 13-33
- Hiller, W. (1987): Orchideen im Landkreis Göppingen. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Bad.-Württ. 19(1): 1-90
- Hilligardt, M. u. F. Weberling (1989): Wuchsformen bei *Trifolium L.* Flora 182: 13-41
- Hitchcock, A. S. (1920): The North American species of *Echinochloa* Contr. U. IS. Nat. Herb. 22: 133-153
- Hobohm, C. u. A. Schwabe (1985): Bestandsaufnahmen von Feuchtvegetation und Borstgrasrasen bei Freiburg im Breisgau ein Vergleich mit dem Zustand von 1954/55. Ber. Naturf. Ges. Freiburg 75: 5-51
- Hochstetter, T. (1896): Über die Orchideenflora der Alb. Bl. Schwäb. Albverein 8: 187-192
- Höck, F. (1903): Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas während des letzten Jahrhunderts VII. Bot. Centralbl. 13: 211-232

- Höck, F. (1910): Neue Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas. Bot. Centralbl. 26: 391-433
- Hofelich, A. (1935): Die Sektion *Alsinebe* Griseb. der Gattung *Veronica* in ihren chromosomalen Grundlagen. Jahrb. wiss. Bot. 81: 541-572
- Hoffmann, A. (1989): Zyto- und ökotaxonomische Untersuchungen über *Bromus ramosus* Huds. und *Bromus benekenii* (Lange) Trimen. Tuexenia 9: 3-28
- Hoffmann, G. (1964): Wirkung des Herbicides "Selest40" bei der Bekämpfung von Robinien (*Robinia pseudoacacia* L.) und unerwünschten Weichlaubhölzern in Mischbeständen. Arch. Forstw. 13: 33-45
- Hoffmann, V., G.Buck, E.Redlingshöfer, W.Schäfer (1982): Orchideen rund um die Teck. Mitt.Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Bad.-Württ. 14(3): 295-389
- Hoffmann, V., G.Buck, R.Flogaus, E. Redlingshöfer, W. Schäfer (1984): Orchideen rund um den Hohenneuffen. Mitt.Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Bad.-Württ. 16(4): 515-597
- Höfle, M. A. (1850): Die Flora der Bodenseegegend mit vergleichender Betrachtung der Nachbarflora. Ferdinand Enke : 175
- Höfler, K. (1950): Durch plasmatische Trockengrenzen bedingte Lebermoosvereine. Proceedings 7: 621-623
- Höfler, K. (1954, 1953): Über einige Lebermoose des Bayreuther Raumes und ihre plasmatischen Trockengrenzen. Ber. Naturw. Ges. Bayreuth
- Hofmann, M. (1994): Weinbergvegetation am Hohenberg bei Ingelfingen. Aktueller Zustand und Auswirkungen des Bewirtschaftungswandels auf die Unkrautflora unter spezieller Berücksichtigung von *Tulipa sylvestris*. Dipl. Arb. Lehrst. Biogeogr. Univ. Bayreuth
- Hofmann, W. (1962): Der Speierling in Franken. Forstwiss. Centralbl. 81 (5/6): 148-155
- Hofmeister, H. u. E. Garve (1983): Lebensraum Acker. P. Parey: 272
- Hohenester, A. (1958): *Artemisia austriaca* Jacq. in Franken. Ber. Bayer. Bot. Ges. 32: 146
- Hohenester, A. (1960): Grasheiden und Föhrenwälder auf Diluvial und Dolomitsanden im nördlichen Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 33: 30-85
- Höll, N u. T. Breunig (1995): Biotopkartierung Baden-Württemberg. Ergebnisse der landesweiten Erhebungen 1981-1989. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 81: 1-544
- Hollick, K. u. D.M. McClintock (1976): *Echinops* in Britain. *Watsonia* 11: 179
- Hollmann, H. (1972): Verbreitung und Soziologie der Schachblume *Fritillaria meleagris* L. Abh. Verh. Naturwiss. Verein Hamburg N.F. 15 Suppl.: 82
- Holub, J. (1962): Beitrag zur Taxonomie der Art *Senecio paludosus* L.. *Novitates Botanicae Horti Bot. Universitatis Carolinae Pragensis*: 25-34
- Holub, J. (1962): Ein Beitrag zur Abgrenzung der Gattungen in der Tribus *Aveneae*: die Gattung *Avenochloa*. *Acta Horti Bot. Prag.* 1962: 75-86
- Holub, J. (1970): New Names in Phanerogamae I *Folia Geobot. Phytotax.* 5: 435-441
- Holub, J. (1972): New nomenclature combinations in *Centaureinae*. *Folia Geobot. Phytotax.* 7: 313-316
- Holub, J. (1972): On correct generic names of *Acrocentron* Cass. and *Acrolophus* Cass. (*Centaurea* L. s.l.). *Preslia* 44: 215-218
- Holub, J. (1973): New Names in Phanerogamae, II. *Folia Geobot. Phytotax.* 8: 155-179
- Holub, J. (1973): Some new nomenclatural combinations in *Centaureinae*. *Preslia* 45: 142-146
- Holub, J. (1974): Neglected plant names from the book "Rostlinictvi" by D. Sloboda *Preslia* 46: 167-171
- Holub, J. (1974): Some new nomenclatural combinations in *Centaureinae*. *Preslia* 46: 225-229
- Holub, J. (1993): *Leonurus intermedius*, species nova - with additional notes on some other *Leonurus* taxa. *Preslia* 65 (2): 97-115
- Holub, J., J. Mesiceck u. V. Javurkova (1971): Annotated chromosome counts of Czechoslovak plants. *Folia Geobot. Phytotax.* 6: 197-214

- Hölzer, A. (1977): Vegetationskundliche und ökologische Untersuchungen im Blindensee-Moor bei Schonach. Diss. Bot. 36: 195
- Hölzer, A. (1978): Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen am Kaiserberg bei Bruchsal. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 37: 55-92
- Hölzinger, J., K. Müller u. K. Schilhansl (1969): Die Pflanzen- und Vogelwelt des Schmiecher Sees. Jh. Ges. Naturk. Württ. 124: 172-184
- Holzner, W. und W. Forstner (1979): Ungräser im österreichischen Maisanbau Bodenkultur 30: 377-400
- Hopf, M. (1968): 1. Früchte und Samen. - In: Zürn, H.: Das jungsteinzeitliche Dorf Ehrenstein (Kreis Ulm), Teil II: Naturwissenschaftliche Beiträge: 7-77
- Hornung, A. (1991): Vegetationskundliche Untersuchungen im Naturschutzgebiet "Bürgle" im Killertal. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66: 141-179
- Hornung, G. (1952): Fremdlinge in der Pflanzenwelt unserer Heimat. Aus der Heimat 60: 312
- Horvat, I., V. Glavac u. H. Ellenberg (1974): Vegetation Südosteuropas. G. FischerGeobotanica selecta (Hrsg.: Tüxen, R.) IV: 768
- Hostrup, O. u. G. Wiegleb (1991): Anatomy of leaves of submerged and emergent forms of *Littorella uniflora* (L.) Ascherson. Aquat. Bot. 39: 195-209
- Hubbard, C.E. (1936): The Species of *Helictotrichon* in Tropical Africa. Bull. Misc. Inform. 1936: 330-336
- Hubbard, C.E. (1985): Gräser. Beschreibung, Verbreitung, Verwendung: 475
- Huber, B. (1935): *Aster linosyris*, ein neuer Typus der Kompaßpflanzen (Gnomonpflanzen). Flora, N.F. 29: 113-119
- Huber, F. (1891): Bemerkenswerte Pflanzenstandorte der Umgebung von Wiesloch. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (82): 257-264
- Huber, F. (1908): Pflanzenstandorte in der Umgebung von Kenzingen. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 5 (239): 297-302
- Huber, F. (1909): Ein Beitrag zur Flora der Pfalz. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 5 (239): 297-302
- Huber, F. (1912): Eine Wanderung durch die Flora von Bühl. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6 (267/268): 123-132
- Huber, F. (1933): Einige Pflanzenstandorte in Baden. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 2 (23): 312-313
- Huber, F., W. Meigen, A. Schlatterer u. A. Thellung (1904): Neue Standorte. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4: 418-420
- Huber, H. (1961): *Droseraceae*. In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. C. Hanser IV/2A: 4-20
- Huber, H. (1963): *Diopogon*. In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. C. Hanser IV/2A: 102-108
- Huber, H. (1964): *Parnassiaceae*. In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. C. Hanser IV/2A: 225-230
- Huber, J. (1935): Unsere Pflanzenwelt. In: J.Keinath (Hrsg.): Untertürkheimer Heimatabuch: 25-90
- Huber, J.Ch. u. J. Rehm (1860): Uebersicht der Flora von Memmingen. J.P. Himmer: 80
- Hübschmann, A.V. (1967): Über die Moosgesellschaften und das Vorkommen der Moose in den übrigen Pflanzengesellschaften des Moseltales. Schriftenreihe für Vegetationskunde 2: 63-121
- Hübschmann, A.V. (1984): Überblick über die epilithischen Moosgesellschaften Zentraleuropas. Phytocoenologia 12 (4): 495-538
- Huck, S. (2004): *Taraxacum nordstedtii* Dahlst. (*Taraxacum* sect. *Celtica* A.J. Richards) in Baden-Württemberg, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 3: S. 15-18
- Hügin, G. & H. Hügin (1998): Botanische Neufunde und Wiederfunde aus Baden-Württemberg und dem Elsaß Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz 17/1: 107-121
- Hügin, G. & H. Hügin (1998): *Gagea villosa* in Südwestdeutschland *Carolinea* 56: 79-89

- Hügin, G. (1956): Wald-, Grünland-, Acker- und Rebenwuchsorte im Markgräfler Land. Diss. Freiburg: 129
- Hügin, G. (1968): Die Rheinaue im Landschaftsschutzgebiet Taubergießen. Naturschutz u. Bildung: 140-158
- Hügin, G. (1979): Die Wälder im Naturschutzgebiet Buchswald bei Grenzach. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 9: 147-199
- Hügin, G. (1982): Die Mooswälder der Freiburger Bucht. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 29: 88
- Hügin, G. (1986): Die Verbreitung von Amaranthus-Arten in der südlichen und mittleren Oberrheinebene sowie einigen angrenzenden Gebieten. Eine Beschreibung der eingebürgerten Arten und ein Versuch, deren Verbreitung zu erklären. Phytocoenologia 14 (3): 289-379
- Hügin, G. (1991): Die Gefäßpflanzen und Wirbeltiere der Gemarkung Freiburg i.Br. Eine Übersicht über die seit 1800 nachgewiesenen Arten und ihre Gefährdung. Mit einem Verzeichnis von Schriften zur Gefäßpflanzen-Flora und Wirbeltier-Fauna der Gemarkung. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 15 (2): 369-406
- Hügin, G. (1991): Hausgärten zwischen Feldberg und Kaiserstuhl. Versuch einer Landschaftsgliederung mit Hilfe von Unkräutern, Zier- und Nutzpflanzen der Gärten in Schwarzwald, Vogesen, Baar und Oberrheintal. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 59: 1-176
- Hügin, G. (1992): Höhengrenzen von Ruderal- und Segetalpflanzen im Schwarzwald. Natur und Landschaft 67 (10): 465-472
- Hügin, G. (1993): Die Herbarien des Freiburger Naturkundemuseums - Bestandsaufnahme und erste Auswertung. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 15 (3/4): 627-633
- Hügin, G. u. U. Koch (1993): Botanische Neufunde aus Südbaden und angrenzenden Gebieten. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 15 (3/4): 607-626
- Hügin, G. u. W. Lohmeyer (1993): Bastardbildung und intraspezifische Sippengliederung bei *Echinops sphaerocephalus* (Asteraceae, Cardueae) in Mitteleuropa. Willdenowia 23: 83-89
- Hügin, G. und H. Hügin (1995): Höhengrenzen von Ruderal- und Segetalpflanzen im Schwarzwald. Nachtrag mit Berücksichtigung der Nachbargebirge (Schwäbische Alb, Vogesen) Caroleina 53: 45-53
- Hügin, G., J. Mazomeit & P. Wolff (1995): *Geranium purpureum* - ein weit verbreiteter Neophyt auf Eisenbahnschotter in Südwestdeutschland. Flor. Rundbr. 29 (1): 37-41
- Hügin, H. u. G. Hügin (1994): *Veronica opaca* in Mitteleuropa - Erkennungsmerkmale, Verbreitung und standörtliches Verhalten. Flora 189: 7-36
- Hügin, G. & H. Hügin (1995): Höhengrenzen von Ruderal- und Segetalpflanzen im Schwarzwald. Nachtrag mit Berücksichtigung der Nachbargebirge (Schwäbische Alb, Vogesen) Caroleina 53: 45-53
- Hugonot, J.-C., M. Kokabi, M. Rösch u. J. Wahl (1991): Die villa rustica von Lomersheim, Stadt Mühlacker, Enzkreis. Fundber. Bad.-Württ. 16: 175-213
- Hultén, E. (1962): The circumpolar plants I Kungl. Vetenskaps Akad., Handl. 8(5)
- Hultén, E. (1962): The circumpolar plants, 1. Vascular Cryptogams, Conifers, Monocotyledons. Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 4/8: 1-175
- Hultén, E. (1964): The circumpolar plants I. Vascular Cryptogams, Conifers, Monocotyledones Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 8/5: 275
- Hultén, E. (1968): Flora of Alaska and neighboring Territories: 1008
- Hultén, E. u. M. Fries (1986): Atlas of North European Vascular plants north of the tropic of Cancer. 3 Bände. S. Koeltz : 1172
- Humphries, C. J. (1980): *Phleum L.* - In Flora Europaea, Vol. 5 (Hrsg.: Tutin, T. G. et al.) Univ. Press : 239-241
- Hurle, K., J. Maier, A. Amann, T. Eishaar, B. Mozer, M. Pulcher-Häussling (1988): Auswirkungen unterlassener Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen auf die Unkrautflora - erste Ergebnisse aus einem mehrjährigen Versuchsprogramm. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzenschutz, Sonderheft 11: 175-187

- Hutchinson, J. (1964): The genera of flowering plants. Vol I, 516 S.; Vol. II, 659 S. Univ. Press
- Ilijin, M.M. (): : Jurinea. - In: Schischkin, B.K., u. E.G. Bobrov: Flora Urss 27: 538-704
- Illig, H. (1979): Die geschützten Pflanzenarten der Luckauer Flora VII. Das Riesenrohr (*Phragmites australis* (Cav.) Trin ex Steud. subsp. *pseudodonax* A. et Gr.) Biologische Studien im Kreis Luckau 8: 23-28
- Ingramm, J. (1966): Notes on the cultivated Liliaceae, 3. *Maianthemum Baileya* Vol. 14:
- Intlekofer (1894): Eine botanische und geologische Wanderung im mittleren Wutachtal. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3: 136
- Irmisch, Th. (1854): Beitrag zur Naturgeschichte der einheimischen Valeriana-Arten, insbesondere der *V. officinalis* und *dioica*. Abh. Naturf. Ges. Halle 1: 19-44
- Irmscher, E. (1912): Über die Resistenz der Laubmoose gegen Austrocknung und Kälte. Jahrb. wiss. Bot. 50: 387-449
- Irsslinger, W. (1983): Das Schwenninger Moos, in der östlich des Schwarzwald gelegenen Baar. Telma 13: 53-71
- Isaac, H. (1992): Die Ringelblume, Botanik, Chemie, Pharmakologie, Toxikologie, Pharmazie und therapeutische Verwendung: 120
- Isler-Hübscher, K. (1980): Beiträge 1976 zu Georg Kummers "Flora des Kantons Schaffhausen mit Berücksichtigung der Grenzgebiete". Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 31 (1977/80): 7-121
- Issler, E. (1929): Les associations végétales des vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante. Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar N.S. 21: 47-167
- Issler, E. (1930): *Deschampsia media* Roem. et Schulth. in Baden Beiträge zur Naturwissenschaftlichen Erforschung Badens 5/6: 97-104
- Issler, E. (1931): Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante. Troisième Partie: Les prairies. Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar N.S. 22 (1929-30): 43-129
- Issler, E. (1937): Beiträge zur Flora des Ostabfalls des südlichen Schwarzwaldes. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 3 (23/24): 329-333
- Issler, E. (1942): Vegetationskunde der Vogesen. G. Fischer: 192
- Issler, E. (1951): Trockenrasen- und Trockenwaldgesellschaften der oberelsässischen Niederterrasse und ihre Beziehungen zu denjenigen der Kalkhügel und der Silikatberge des Osthangs der Vogesen. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 61: 664-699
- Issler, E., E. Loyson u. E. Walter (1965): Flore d'Alsace: 639
- Issler, E., E. Loyson u. E. Walter (1982): Flore d'Alsace (Hrsg.: Société d'étude de la flore d'Alsace): 621
- Ittner, Fr.v. (1819): Beiträge zur Naturgeschichte des Kaiserstuhls in botanischer und mineralogischer Hinsicht. Eleutheria 2 (3)
- Jack, J.B. (1891-1896): Botanische Wanderungen am Bodensee und im Hegau.- Mitt. bad. bot. Ver. 2: 341-356 (1891); 365-404, 419-420 (1892); 3: 25-28 (1893); 363-366 (1896)
- Jack, J.B. (1892): Botanischer Ausflug ins obere Donautal. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3 (102): 13-24
- Jack, J.B. (1893): Anhang zu Botanischen Wanderungen am Bodensee und im Hegau. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3 (1039): 25-32
- Jack, J.B. (1900/1901): Flora des badischen Kreises Konstanz. J.J. Reiff: 132
- Jacob, K., M.Köhler, F.-G. Link, R. Schäfer u. R. Weiland (1988): Die Flußlandschaft der Enz zwischen Niefern und Mühlacker (Enzkreis). Bestandsaufnahme für das Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Enztal zwischen Niefern und Mühlacker". Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 63: 169-210
- Jacomet, S. (1990): Veränderungen von Wirtschaft und Umwelt während des Spätneolithikums im westlichen Bodenseegebiet. Ergebnisse samenanalytischer Untersuchungen an einem Profilblock aus der Horgener Stratigraphie von Sipplingen-Osthafen (Tauchsondierung Ruoff 1980). Siedlungsarchäologie im Alpenvorland 2.Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 37: 295-324

- Jacomet, S. u. H. Schlichtherle (1984): Der kleine Pfahlbauweizen Oswald Heer's - Neue Untersuchungen zur Morphologie neolithischer Nacktweizen-Ähren. In W. van Zeist u. W.A. Casparie (ed.): *Plants and ancient man. Studies in palaeoethnobotany* : 153-176
- Jacquet, P. (1994): History of Orchids in Europe, from Antiquity to the 17th Century. In: J. Arditti (ed.): *Orchid Biology. Reviews and Perspectives*: 35-102
- Jaeger, P., N. Heiligenstein u. M.L. Bach (1958): Sur la presence de la Digitale pourpree (*Digitalis purpurea* L.) dans les Vosges septentrionales. *Bull. Assoc. philomath. Alsace et Lorraine* 10 (3): 52-56
- Jagel, A. (1994): Kartierung der Flora Westfalens. *Flor. Rundbr.* 28 (2): 144-153
- Jäger, E. (1968): Pflanzengeographische Ozeanitätsgliederung der Holarctis und Ozeanitätsbindung der Pflanzenareale. *Feddes Repertorium* 79: 157-335
- Jäger, E. J. (1970): Charakteristische Typen mediterran-mitteuropäischer Pflanzenareale. *Feddes Repertorium* 81(1-5): 67-92
- Jäger, E.J. (1973): Zur Verbreitung und Lebensgeschichte der Wildtulpe (*Tulipa sylvestris* L.) und Bemerkungen zur Chorologie der Gattung *Tulipa* L. *Hercynia* N.F. 10: 429-448
- Jäger, E.J. (1988): Möglichkeiten zur Prognose synanthroper Pflanzenausbreitungen. *Flora* 180: 101-131
- Jalas, J. (1950): Zur Kausalanalyse der Verbreitung einiger nordischen Os- und Sandpflanzen. *Ann. Bot. Fennici* 24: 1-345
- Jalas, J. (1954): Populationsstudien an *Sedum telephium* L. in Finnland. *Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. "Vanamo"* 26 (3): 1-47
- Jalas, J. (1970): *Thymus sectio Serpyllum* in the Southern French Alpes (Alpes francaises du Sud). *Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel* 43: 186-203
- Jalas, J. (1971): Notes on *Thymus* L. in Europe I u. II. *J. Linn. Soc., Bot.* 64: 199-215 u. 247-269
- Jalas, J. (1972): *Thymus* L. - In: *Flora Europaea*, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press
- Jalas, J. u. J. Suominen (eds.; 1972-1986): *Atlas florae europaeae. Distribution of vascular plants in Europe.* Band 1 (1972), Band 2 (1973), Band 3 (1976), Band 4 (1979), Band 5 (1980), Band 6 (1983), Band 7 (1986)
- Jalas, J. u. K. Kaleva (1967): Chromosome studies in *Thymus* L. (Labiatae) V. *Ann. Bot. Fennici* 4: 74-80
- Jalas, J. u. K. Kaleva (1970): Subraspezifische Gliederung und Verbreitungstypen in der Gattung *Thymus* L. (Labiatae). *Feddes Repertorium* 81: 93-106
- Janchen, E. (1903): Beiträge zur Benennung, Verbreitung und Anordnung der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs IV. *Phyton* 5: 55-106
- Janchen, E. (1960): *Catalogus florae Austriae* 4: IX-XII: 711-997
- Janchen, E. (1963): *Catalogus Florae Austriae.* 1. Ergänzungsheft: 1-128
- Janchen, E. (1964): *Catalogus florae Austriae.* 2. Ergänzungsheft: 1-83
- Janchen, E. (1966): *Catalogus florae Austriae.* 3. Ergänzungsheft: 1-84
- Jänichen, H. (1970): Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte des schwäbischen Dorfes. Veröff. Kommiss. Gesch. Landeskunde Bad.-Württ. B 60: 218
- Janssen, J.G.M. (1973): Effects of Light, Temperature and Seed Age on the Germination of the Winter Annuals *Veronica arvensis* L. and *Myosotis ramosissima* Rochel ex. Schult. *Oecologia* 12: 141-146
- Jarvie, J.K. (1992): Taxonomy of *Elytrigia* sect. *Caespitosae* and sect. *Juncae* (Graminae: Triticeae) *Nord. J. Bot.* 12 (2): 155-169
- Jarvis, C. et al. (1993): A list of Linnean generic names and their types. *Regnum vegetabile* 127: 100
- Jarvis, C.E., C.A. Stace & M.J. Wilkinson (1987): Typification of *Festuca rubra* L., *F. ovina* L. and *F. ovina* var. *vivipara* L. *Watsonia* 16 (3): 299-302
- Jauch, F. (1938): Fremdpflanzen auf den Karlsruher Güterbahnhöfen. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland* 3: 76-147

- Jauzein, P. (1988): Remarques sur le genre *Setaria* P. Beauv. en France Monde Plantes 83 (431): 9-12
- Jauzein, P. (1993): Le genre *Echinochloa* en Camargue Monde Plantes 88 (446): 1-5
- Jelitto, C.R. (1960): Echinops. - In: Encke, F. (Hrsg.): Pareys Blumengärtnerei 2: P. Parey : 803-804
- Jenkins, T.J. (1931): Swollen stem internodes and other characters in *Arrhenatherum avenaceum* Beauv. Bull. Welsh Pl. Breed. Sta., Series H 12: 126-147
- Jenniskens, M.-J. P.J. (1984): Crossability and hybridization of *Taraxacum* section *Taraxacum* from central and western Europe. - In: Jenniskens, M.-J. P. J.: Aspects of the Biosystematics of *Taraxacum* section *Taraxacum*: 69-152; Academ. Proefschrift
- Jenniskens, M.-J. P.J., H.C.M. Den Nijs u. B.A. Huizing (1984): Karyography of *Taraxacum* sect. *Taraxacum* and the possible occurrence of facultative agamospermy in Bavaria and north-western Austria. Phytion 24 (1): 11-34
- Jenniskens, M.-J. P.J., J.C.M. Den Nijs u. A.A. Sterk (1985): Crossability and hybridization of *Taraxacum* section *Taraxacum* from central and western Europe. Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. 88 (3): 297-338
- Jenniskens, M.-J. P.J., Wetzels, P.C.J. u. A.A. Sterk (1984): Aspects of the flowering ecology of *Taraxacum* sect. *Taraxacum*. Bot. Jahrb. Syst. 104 (3): 369-400
- Jessop, J.P. (1986): *Poa*. In: J.P.Jessop u. H.R. Toelken: Flora of south Australia. 4: 1896-1901
- Jirásek, V. (1952): Phytogeographical-systematic study of the genus *eragrostis* P. B. Preslia 24: 281-338
- Jirasek, V. (1964): *Poa x powlowskii* V. Jiras. (*P. xhaixii x remota* Pawl.) in der Tschechoslowakei. Acta Horti Pragensis 1963: 69-72
- Johri, J.B. (1963): Embryology and Taxonomy. - In: Maheshwari, P. (Ed.): Recent Advances in the Embryology of Angiosperms. Int. Soc. Plant Morph. : 394-438
- Jones, K. (1958): Cytotaxonomical studies in *Holcus* I: The chromosome complex in *Holcus* L. New Phytologist 57: 191-210
- Jones, M. (1991): Studies into the pollination of *Orobanche*-species in the British Isles.- K. Wegmann, J. Musselmann Lytton (eds.): Progress in *Orobanche* research. Proceedings of the international workshop on *Orobanche* research -Obermarchtal, FRG, August 19-22, 198 6-15
- Jowett, D. (1964): Population studies on lead-tolerant *Agrostis tenuis*. Evolution 18/1: 70-80
- Juhl-Noodt, H. (1955): Apomixis und umweltbedingte Variation bei *Poa pratensis*. Der Züchter 25: 80-86
- Junell, S. (1934): Zur Gynäceummorphologie und Systematik der Verbenaceen und Labiaten. Symbolae Botanicae Upsalienses 4: 219
- Junghans, T. (2001): Bemerkenswerter Neufund der Efeu-Sommerwurz *Orobanche hederarum* in Heidelberg. Carolina 59: 129-130
- Juxip, A.Y. (1960): *Hieracium*. - In: Shishkin, B.K. u. E.G. Bobrov (Hrsg.): Flora URSS, Vol. XXX.
- Kadereit, J.W. (1983): *Senecio vernalis* in Britain. Watsonia 14: 453
- Kadereit, J.W. (1984): The origin of *Senecio vulgaris* (Asteraceae). Plant Syst. Evol. 145: 135-153
- Kaempfert, W. (1942): Sonnenstrahlung auf Ebene, Wand und Hang. Reichsamt für Wetterdienst 9
- Kaempfert, W. u. A. Morgen (1952): Die Besonnung. Zeitschrift für Meteorologie 6: 138-146
- Kahnt, U. (1990): Die Verbreitung submerser Makrophyten in den Fließgewässern Brenz, Pfeffer, Hürbe und Lone. Jh. Ges. Naturk. Württ. 145: 87-107
- Kaiser, E. (1962): Die Pflanzenwelt des Hennebergisch-Fränkischen Muschelkalkgebietes. Feddes Repertorium 44: 280
- Kalela, A. (1965): Über die Kollektivart *Carex brunnescens* (Pers.) Poir. Ann. Bot. Fenn. 2: 174-218
- Kalheber, H. (1970): *Carex humilis*, *Carex strigosa* und *Carex binervis* im Unterlahnggebiet. Hess. Flor. Briefe 19: 33-34

- Kalheber, H. (1979): Zur Verbreitung der Alchemillen in Hessen und seinen Randgebieten. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. 104: 41-117
- Kalheber, H. (1982): *Alchemilla propinqua* Lindb. f. ex Juz., *Alchemilla connivens* Buser und *Alchemilla glomerulans* Buser in deutschen Mittelgebirgen. Hess. Flor. Briefe 31: 44-48
- Kalheber, H. (1983): *Centaurea jacea* L. s.l. im mittleren Hessen. Beitr. Naturk. Osthessen 19: 13-20
- Kalheber, H., D. Korneck, R. Müller, Ch. Nieschalk, H. Sauer u. A. Seibig (1980): Rote Liste der in Hessen ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen.- 2. Fassung, Stand 31.12.1979. Hess. Landesanstalt für Umwelt: 46
- Kämmer, F. u. M. Dienst (1982): Zum Vorkommen der Flaumeiche (*Quercus pubescens* Willd.) in der trockenengefallenen südlichen Oberrheinebene. *Carolinea* 40: 49-64
- Kapp, E. (1938): Quelques remarques sur la végétation du Ried ellorhénan entre Graffenstade et Plobsheim. Bull. Assoc. philomath. Alsace et Lorraine 8: 494-496
- Kapp, E. (1961): Beiträge zur oberrheinischen, speziell eslässischen Adeventivflora, Archäophyten, Epöekophyten und Neophyten. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 8 (1): 159-171
- Kappus, A. (1953): Verwilderte Kulturpflanzen im Oberrhein. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 6: 34-36
- Kappus, A. (2003): Beobachtungen zu *Oenothera*-Sippen im südlichen Oberrheingebiet. *Carolinea* 61: 37-42
- Karg, S. (1988): Pflanzenreste aus zwei Bodenproben der frühmittelbronzezeitlichen Siedlung Uhingen-Römerstraße 91 (Kreis Göppingen). Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 31: 231-237
- Karg, S. (1990): Pflanzliche Großreste der jungsteinzeitlichen Ufersiedlungen Allensbach-Strandbad, Kr. Konstanz. Siedlungsarchäologie im Alpenvorland 2. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 37: 113-166
- Karrer, F. (1864): Die Vegetationsverhältnisse des Schönbuchs. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 20: 153-164
- Karrer, F. (1873): Pflanzen. In: Beschreibung des Oberamts Brackenheim: 41-47
- Karrer, F. (1879): Pflanzen. In: Beschreibung des Oberamts Tuttlingen: 63-74
- Karrer, F. (1881): Vergleichende Untersuchungen über die Flora der vulkanischen Hegauberge. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 37: 127-140
- Kating, H. u. F. Seidel (1967): Anbauversuche mit *Arnica*-Arten. II. Vegetative Vermehrung von *Arnica montana* L.. *Planta Medica* 15: 420-429
- Kaule, G. (1972): Zum Vorkommen von *Carex chordorrhiza* Ehrh. in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 43: 77-83
- Kaule, G. (1973): Zur Verbreitung von *Carex chordorrhiza* Ehrh. in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 44: 183-186
- Kaule, G. (1974): Die Übergangs- und Hochmoore Süddeutschlands und der Vogesen. Diss. bot. 27: 345
- Kaule, G. (1975): Die Vegetation der Moore im Deggendorfer Vorwald. *Hoppea* 34: 5-16
- Kazmi, S.M.A. (1964): Die Gattung *Carduus* in Deutschland. Ber. Bayer. Bot. Ges. 37: 53-59
- Kehrer, G. (1856-1873): Beiträge zur Flora der Heilbronner Stadtmarkung. Programm Gymn. Heilbronn : 1856:1-40; 1866:1-48, 1873: 1-48
- Keller, (1923): *** :
- Keller, G. u. R. Schlechter (1928): Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. Feddes Repert., Sonderbeih. 1
- Keller, G. u. R. von Soo (1930-1940): Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. Feddes Repert., Sonderbeih. 2-5
- Keller, L. (1973): Contribution à la cytogéographie de *Valeriana officinalis* L. en Suisse. Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 96: 67-79

- Keller, R. (1900-1902): Rosa. - In: Ascherson, P. u. P. Graebner: Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Gebr. Borntraeger 6: 32-384
- Keller, R. (1908): Beiträge zur Kenntnis der Brombeerflora von Säkingen-Mumpf. Mitt. Naturwiss. Ges. Winterthur 7: 26-42
- Keller, R. (1931): Synopsis Rosarum spontaneorum Europaea emediae. Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: I-XII: 1-796, pl. 1-40
- Keller, R. u. H. Gams (1923): Rosa. - In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. C. Hanser IV/2: 976-1053
- Keller, W. (1985): Über die soziologische Bindung von *Galanthus nivalis* L. im Aargauer Jura. Bot. helv. 95/2: 291-299
- Keller, W. (1985): Über säureliebende Carpinion-Wälder im Schaffhäuser Stadtwaldrevier Herblingen. Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 32: 223-246
- Kempff, H. (1985): Zur Erhaltung der in der DDR vom Aussterben bedrohten Moorfetthenne (*Sedum villosum*). LandschPflege NatSchutz Thüringen 22: 30-38
- Kerguélen, M. & F. Plonka (1988): Le genre *Festuca* dans la flore française. Taxons nouveaux, observations nomenclaturales et taxinomiques. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S. 19: 15-30
- Kerguélen, M. & F. Plonka (1989): Les *Festuca* de la flore de France (Corse comprise). Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., Num. Spéc. 10: 368 pp.
- Kerguélen, M. (1975): Les Gramineae (Poaceae) de la Flore française essai de mise au point taxonomique et nomenclature. Lejeunia N.S. 75: 343
- Kerguélen, M. (1987): Données taxinomiques, nomenclaturales et chorologiques pour une révision de la Flore de France. Lejeunea N. S. 120
- Kerguélen, M., F. Plonka & É Chas (1993): Nouvelle contribution aux *Festuca* (Poaceae) de France. Lejeunia N.S. 142: 1-42
- Kerner, A. (1879): *Festuca amethystina*. ÖBZ 29: 73-79
- Kerner, J.S. (1783-1792): Beschreibung und Abbildung der Bäume und Gesträuche, welche in dem Herzogthum Württemberg wild wachsen. 9 Hefte. J.F. Cotta
- Kerner, J.S. (1786): Flora Stuttgardiensis oder Verzeichnis der um Stuttgart wildwachsenden Pflanzen: 402
- Kers, L.E. (1991): Konsfordelningen hos *Petasites hybridus*, pestskrap, i Sverige. Svensk Bot. Tidskrift 85 (1): 39-51
- Kersting, G. (1986): Die Pflanzengesellschaften des unteren Schwarza- und Schlüchttales im Südos Schwarzwald. Mit einer Studie zur Habitatswahl des Berglaubsängers (*Phylloscopus bonelli*). Unveröff. Dipl.-Arb. Univ. Freiburg: 160
- Keßler, A. (1996): Rückblick auf das NSG Sommerrain Gemarkung Allmersbach i.T. Journ. Eur. Orch. 28(2): 347-355
- Kiechle, J. (2003): Bemerkenswerte Characeen im Landkreis Konstanz mit Anmerkungen zur Roten Liste, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 2: S. 51-62
- Kiefer, B. (1984): Botanische Untersuchung römerzeitlicher Pflanzenreste aus der archäologischen Ausgrabung in Osterburken. Unveröff. Dipl.-Arb. Univ. Hohenheim: 126
- Kiffe, K. (1993): Ein Erstnachweis von *Carex hostiana* de Candolle x *C. demissa* Hornemann in Mitteleuropa. Decheniana 146: 132
- Kiffe, K. (2001): Anmerkungen und Ergänzungen zu einigen Sippen der Gattung *Carex* in Baden-Württemberg. Carolina 59: 59-65
- Kipp, F. (1978): *Nymphoides peltata*, Familie Menyanthaceae, im St. Anna-See, Löwensteiner Berge - eine für Württemberg neue Pflanzenart. Jh. Ges. Naturk. Württ. 133: 144-145
- Kircher, K. (1983): "Hohes Bühle" bei Albstadt-Truchtlingen. Bund Naturschutz Alb-Neckar 9: 104-108
- Kirchner, O. (1888): Flora von Stuttgart und Umgebung (Ludwigsburg, Waiblingen, Esslingen, Nürtingen, Leonberg, ein Teil des Schönbuches etc.) mit besonderer Berücksichtigung der pflanzenbiologischen Verhältnisse. E. Ulmer : 767

- Kirchner, O. (1900-1902): Mitteilungen über die Bestäubungseinrichtungen der Blüten. - Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 56: 347-384, 1900; 57: 1-42, 1901; 58: 8-67, 1902.
- Kirchner, O. u. J. Eichler (1900): Exkursionsflora für Württemberg und Hohenzollern. E. Ulmer: 440
- Kirchner, O. u. J. Eichler (1913): Exkursionsflora für Württemberg und Hohenzollern. E. Ulmer: 479
- Kirschleger, F. (1852-1858): Flore d'Alsace et des contrées limitrophes. Band 1, 662 S. (1852); Band 2, 612 S. (1857); Band 3, 456 S. (1858)
- Kirschleger, F. (1870): Flore Vogéso-Rhénane. Tom. 1.
- Kirschner, J. u. J. Stepánek (1983): Obrázky ceskoslovenských pampelisek (1-2). Zprávy Českoslov. bot. společnosti 18 (2): 81-88
- Kirschner, J. u. J. Stepánek (1987): Again on the Sections in *Taraxacum* (Cichoriaceae) (Studies in *Taraxacum* 6). *Taxon* 36 (4): 608-617
- Kirschner, J., C.E. Sonck u. J. Stepánek (1993): An Outline of the *Taraxacum subalpinum* Group (T. sect. *Palustria*). *Folia Geobot. Phytotax.* 28: 51-60
- Klapp, E. u. W. Opitz von Boberfeld (1990): Taschenbuch der Gräser. Erkennung und Bestimmung, Standort und Vergesellschaftung. Bewertung und Verwendung. P.Parey
- Klauck, E.-J. (1991): Das Arunco-Petasitetum albae Br.-Bl. et Sutter 1977. *Tuexenia* 11: 253-268
- Klein, H. (1955): Die Verbreitung der *Carex hartmannii* A. Cajander in Hessen, Mainfranken und der Pfalz. *Hess. Flor. Briefe* 4 (45): 1-2
- Klein, H. (1955): Über die Formen von *Teucrium chamaedrys* L. in Hessen. *Hess. Flor. Briefe* 4 (40): 1-2
- Klein, L. (1908): Bemerkenswerte Bäume im Großherzogtum Baden (Forstbotanisches Merkbuch). C. Winter: 372
- Klein, L. (Bearb.) (1891): Exkursionsflora für Baden (begr. von M. Seubert). E. Ulmer: 434
- Klein, H. (1955): Flora von Hessen und Mainfranken. Eine Vorschau. Unveröff. Manuskript
- Kleinstauber, A. (1992): Die Bärwurz (*Meum athamanticum* Jacq.) im Nordschwarzwald. *Carolinea* 50: 67-78
- Kleinstauber, A. u. Th. Wolf (1993): *Utricularia stygia* und *Hammarbya paludosa* am Blauensee bei Vogt/Kreis Ravensburg. *Carolinea* 51: 107-108
- Kleinstauber, A. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (64-73). *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 1: 76-77
- Kleinstauber, A. (2003): Die Gattung *Filago* in Karlsruhe und Umgebung, *Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland*, Band 2: S. 63-77
- Klepser, H.-H. (1981): Naturschutzgebiet Lindenweiher. Botanische Bestandsaufnahme 1977/78. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 53/54: 313-356
- Klepser, H.-H. (1988): Geschützte Pflanzen im Landkreis Biberach: 232
- Klepser, H.-H. u. W. Wunsch (1979): Das Naturschutzgebiet "Blauer Steinbruch" bei Ehingen, ein schutzwürdiger Biotop aus zweiter Hand. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 49/50: 31-50
- Kleyer, M. (1993): Acker-Unkrautbestände im Naturraum Kraichgau (SW-Deutschland) und ihre Abhängigkeit von der landwirtschaftlichen Produktionsintensität. *Tuexenia* 13: 503-517
- Klokov, M. (1957): *Conspectus generis Melittis* L. *Not. Syst. ex Herb. Inst. Bot. nomine V.L. Komarovii Acad. Sci. URSS* 18: 183-217
- Klopfer, K. (1973): Florale Morphogenese und Taxonomie der *Saxifragaceae sensu lato*. *Feddes Repertorium* 84: 475-516
- Klotz, A. (1887): Einige interessante Standorte des Freiburger Florengebietes. *Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden* 1 (34): 301-302
- Knaben, G. (1961): Continued studies on the life cycles of Norwegian *Saxifraga* sp. *Blyttia* 19: 148-157
- Knapp, G. (1946): Ackerunkraut-Gesellschaften des unteren Neckarlandes. Manuskript-Vervielf: 12

- Knapp, G. (1946): Die Ackerunkraut-Gesellschaften im mittleren Odenwald. Manuskript-Vervielf: 26
- Knapp, G. (1964): Ackerunkraut-Vegetation im unteren Neckarland. Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilk. N.F. 33 (4): 395-402
- Knapp, H.D. (1976): Zur Verbreitung einigee Waldorchideen in der DDR und angrenzenden Gebieten. *Hercynia* 13: 30-77
- Knapp, H.D. (1979): Geobotanische Untersuchungen an Waldgrenzstandorten des hercynischen Florengebietes. Teil 1 und Teil 2. *Flora* 168: 276-319, 468-510
- Knapp, H.D. (1986/1976): Ökogeographisches Verhalten und Gefährdung von Orchideen xerothermer Standorte in Mitteleuropa. Teil 1: Chorologisches Verhalten. Teil 2 Standörtliches und soziologisches Verhalten. *Arch. Naturschutz Landsch.forsch.* : 26(1):65-89, 26(2): 149-167
- Knapp, R. (1946): Über Sumpf- und Wasserpflanzengesellschaften der nordöstlichen Oberrheinebene. vervielfältigtes Manuskript: 8
- Knapp, R. (1953): Über die natürliche Verbreitung von *Arnica montana* L. und ihre Entwicklungsmöglichkeit auf verschiedenen Böden. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 66 (4): 168-179
- Knapp, R. (1963): Die Vegetation des Odenwaldes *Schriftenr. Inst. Naturschutz Darmstadt* 6 (4): 1-150
- Knetsch (1902): In: *Neue Standorte. Mitt. Bad. Bot. Ver.* 4 (178): 246-247
- Kneucker (1882): siehe Baumgartner et al. 1882
- Kneucker, A. (1884): Zur Karlsruher Flora. *Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden* 1 (11): 101-105
- Kneucker, A. (1886): *Führer durch die Flora von Karlsruhe und Umgegend.* J.J. Reiff : V + 167
- Kneucker, A. (1887): Ein Ausflug durch die Sand- und Sumpfflora von Walldorf und Waghäusel. *Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden* 1 (34): 295-302
- Kneucker, A. (1887): Weitere Beiträge zur Flora von Karlsruhe. *Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden* 1 (39): 339-343
- Kneucker, A. (1888): Beiträge zur Flora von Karlsruhe *Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden* 1 (47/48): 411-420
- Kneucker, A. (1889): Eine kleine Pflingstexkursion im Kraichgau 1889. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 2 (66): 130-132
- Kneucker, A. (1889): Fragmentarische Beiträge zur wissenschaftlichen Bedeutung teratologischer Vorkommnisse bei *Carex* mit besonderer Berücksichtigung auf *Carex praecox* Jacq. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 2: 125-130
- Kneucker, A. (1890): Das Welzthal, ein Beitrag zur Flora unserer nördlichsten Landesteile. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 2 (71/72): 165-174
- Kneucker, A. (1890): *Inula britannica* L. var. *Oetelliana* (Rchbch) = *I. Oetelliana* Rchb. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 2 (75): 200-201
- Kneucker, A. (1891): Beiträge zur Karlsruher Flora. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 2(86): 296-299
- Kneucker, A. (1891): *Carex*. In: Seubert, M. u. L. Klein: *Exkursionsflora für das Großherzogtum Baden.* : 49-70
- Kneucker, A. (1891): *Mixtum compositum botanicum.* *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 2(86): 292-294
- Kneucker, A. (1895): Nachträge und Berichtigungen zur Flora der Umgegend von Karlsruhe mit Berücksichtigung von Funden aus anderen badischen Landesteilen und derangrenzenden Rheinpfalz. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 3 (133/134): 295-312
- Kneucker, A. (1896): Bemerkungen zu den *Carices exsiccatae.* *Allg. Bot. Zeitschr.* 2: 24-26, 44-46, 69-71, 88-90, 104-105, 183-185
- Kneucker, A. (1896): Zwei interessante rechtsrheinische Pflanzenstandorte. *Allg. Bot. Z. Syst.* 31/32: 126-127
- Kneucker, A. (1897): Bemerkungen zu den *Carices exsiccatae.* *Allg. Bot. Zeitschr.* 3: 10-12, 26-30, 177-179, 198-200

- Kneucker, A. (1898): Bemerkungen zu den Carices exsiccatae. Allg. Bot. Zeitschr. 4: 9-10, 26-28, 60-62, 125-130, 163-166, 201-202
- Kneucker, A. (1899): Bemerkungen zu den Carices exsiccatae. Allg. Bot. Zeitschr. 5: 7-11, 26-28, 65-66, 81-82, 99-100, 127-130, 161-166, 177-179, 194-196
- Kneucker, A. (1899): Bemerkungen zu den Carices exsiccatae. Allg. Bot. Zeitschr. 1: 55-64
- Kneucker, A. (1900): Bemerkungen zu den Carices exsiccatae. Allg. Bot. Zeitschr. 6: 7-8, 43-44
- Kneucker, A. (1901): Bemerkungen zu den Carices exsiccatae. Allg. Bot. Zeitschr. 7: 29-36, 51-57, 70
- Kneucker, A. (1903): Bemerkungen zu den Carices exsiccatae. Allg. Bot. Zeitschr. 9: 50-55
- Kneucker, A. (1903): Pfingstexkursion 1903. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (187/188): 313-321
- Kneucker, A. (1904): Bemerkungen zu den Carices exsiccatae. Allg. Bot. Zeitschr. 10: 189-194
- Kneucker, A. (1905): Carex. In: Seubert, M. u. L. Klein: Exkursionsflora für das Großherzogtum Baden. : 54-74
- Kneucker, A. (1913): Die adventiven Trifoliumformen der Karlsruher Flora. Allg. Bot. Z. Syst. 19 (1/2): 5-8
- Kneucker, A. (1921): Einige pflanzengeographisch interessante Pflanzenformen Badens und des angrenzenden Gebietes. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Natursch. 1: 125-127
- Kneucker, A. (1924): Die Schweinsweide bei Au a.Rh. mit Berücksichtigung der Schweinsweide bei Illingen a.Rh. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1 (12/13): 290-294, 294-298
- Kneucker, A. (1924): Kurzer Bericht über den derzeitigen Zustand einiger phytogeographisch interessanter Gebiete unseres Landes nebst verschiedenen floristischen Einzelbeobachtungen. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1 (12/13): 294-298
- Kneucker, A. (1926): Die Vegetationsformationen unserer fränkischen Wellenkalkhügel. II. Der Kalmut mit Berücksichtigung der Flora seiner Umgebung. Jb. histor. Ver. Alt-Wertheim 1925: 88-126
- Kneucker, A. (1931): Mitteilungen und Berichtigungen zur Flora Badens und seiner Grenzgebiete. Beitr. Naturw. Erforsch. Badens 7: 111-120
- Kneucker, A. (1935): Ergebnisse systematischer, floristischer und phytographischer Beobachtungen und Untersuchungen über die Flora Badens und seiner Grenzgebiete. Verh. Naturwiss. Ver. Karlsruhe 31: 209-239
- Kneucker, A. et al. (1883, 1884): In: Baumgartner, L.: Neue Standorte. (1882-1887). Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (8/9): 85-92
- Knuth, B. (1899): Handbuch der Blütenbiologie, II. Band, 2. Teil: Lobeliaceae bis Gnetaceae. Wilhelm Engelmann: 705
- Koch, W.J.D. (1857): Synopsis Florae Germanicae et Helveticae, Pars Prima. Lipsiae: 875
- Koch, E. (2001): Campanula glomerata im Hegau, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 1: S. 53
- Koch, E. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (74). Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 76
- Koch, H. u. E. von Gaisberg (1938): Die standörtlichen und forstlichen Verhältnisse des Naturschutzgebiets Untereck. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 14: 5-58
- Koch, L. (1887): Die Entwicklungsgeschichte der Orobanchaceae mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu den Kulturpflanzen. : 389 S.
- Koch, S. D. (1974): The Eragrostis pectinacea-pilosa complex in North America and Central America (Gramineae: Eragrostideae) Illinois Biol. Monogr. 48:
- Koch, S. D. and I. Sanchez Vega (1985): Eragrostis mexicana, E. neomexicana, E. orcuttiana, and E. virescens: the resolution of a taxonomic problem Phytologia 58 (6): 377-381
- Koch, U. (1992): Eragrostis multicaulis Steudel, ein Neophyt auf Friedhöfen in Deutschland Flor. Rundbr. 26: 110-111

- Koch, W. (1943): *Carex hartmanni* A. Cajander, eine für die Schweizerflora neue boreale Seggenart. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 53: 457-460
- Koch, W. D. J. (1865): Taschenbuch der deutschen und schweizer Flora. : LXXX+583 S.
- Koch, W. u. G. Kummer (1926): Nachtrag zur Flora des Kantons Schaffhausen. III. Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 3 (5): 37-84
- Koch, W. u. G. Kummer (1929): Beitrag zur Hieracienflora Südbadens. Beitr. Naturw. Erforsch. Badens 2/3: 33-43
- Koch, W.D.J. (1837-1838): Synopsis Florae Germanicae et Helveticae. ed. IIa.
- Koch, W.D.J. (1840): Zusätze und Verbesserungen zu meiner Synopsis Florae germanicae et helveticae. Flora 23: 353-363
- Koch, W.D.J. (1842): Ueber die deutschen Erdbeeren. Flora 25: 529-539
- Kohler, A. (1963): Zum pflanzengeographischen Verhalten der Robinie in Deutschland. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 22: 3-18
- Kohler, A. (1964): Das Auftreten und die Bekämpfung der Robinie in Naturschutzgebieten. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 32: 43-46
- Kohler, A. (1978): Wasserpflanzen als Bioindikatoren. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 11: 259-281
- Kohler, A. u. G.-H. Zeltner (1974): Verbreitung und Ökologie von Makrophyten in Weichwasserflüssen des Oberpfälzer Waldes (Naab, Pfreimd und Schwarzach). Hoppea 33: 171-232
- Kohler, A., H. Vollrath u. E. Beisl (1972, 1971): Zur Verbreitung, Vergesellschaftung und Ökologie der Gefäß-Makrophyten im Fließwassersystem Moosach (Münchener Ebene). Arch. Hydrobiol. 69: 333-365
- Kohler, A., R. Wonneberger u. G. Zeltner (1973): Die Bedeutung chemischer und pflanzlicher "Verschmutzungsindikatoren" im Fließgewässersystem Moosach (Münchener Ebene). Arch. Hydrobiol. 72: 533-549
- Köhler, A.F. (1839): Tuttlingen. Beschreibung und Geschichte dieser Stadt und ihres Oberamts-Bezirks. :
- Kohns, P., H. Neumann, D. Rückbrodt, H.-E. Salkowski u. C. Stark (1990): Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. : 144 S.
- Kokabi, M. u. M. Rösch (1991): Knochen und Pflanzenreste des frühen Mittelalters von Lauchheim-Mittelhofen (Ostalbkreis). Arch. Ausgr. 1990:
- Koltzenburg, M. (1995): Vegetationskundliche Untersuchungen im Naturschutzgebiet Nägelesfelsen bei Bad Urach. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 70: 199-290
- Koltzenburg, M. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (75-81). Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 77
- König, A. (1989): Über die Pontische Quecke *Elymus elongatus* (Host) Runemark subsp. *ponticus* (Podpera) Melderis in Hessen und angrenzenden Ländern Botanik und Naturschutz in Hessen 3: 5-13
- König, K. (1841): Der botanische Führer durch die Rheinpfalz oder Übersicht aller bisher in der Rheinpfalz aufgefundenen, sowohl wildwachsenden, als auch verwilderten, phanerogamischen Pflanzen.... F. Götz: 248
- Konold, W. (1987): Oberschwäbische Weiher und Seen. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 52: 1-634
- Konold, W. u. K.F. Eisele (1990): Dr. Johann Nepomuk Zengerles "Verzeichnis aller bisher im Oberamtsbezirk Wangen aufgefundenen Pflanzen" aus dem Jahr 1838. Jh. Ges. Naturk. Württ. 145: 109-148
- Kopecky, K. u. S. Hejny (1965): Allgemeine Charakteristik der Pflanzengesellschaften des Phalaridion arundinaceae-Verbandes. Preslia (Praha) 37: 53-78
- Koppe, F. (1931): Beobachtungen über Frostschäden an Moosen 1927-1930. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 49: 35-51

- Koppe, F. (1955): Moosvegetation und Moosgesellschaften von Altötting in Oberbayern. Feddes Repertorium 58: 92-144
- Koppe, F. (1966): Bryologische Beobachtungen im Gebiet der oberen Donau. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N. F. 9: 345-370
- Körber-Grohne, U. (1978): Pollen-, Samen- und Holzbestimmungen aus der mittelalterlichen Siedlung unter der oberen Vorstadt in Sindelfingen (Württemberg). In: Scholkmann, B.: Sindelfingen/Obere Vorstadt. Forsch. Ber. Archäol. Mittelalt. Bad.-Württ. 3: 184-199
- Körber-Grohne, U. (1979): Samen, Fruchtsteine und Druschreste aus der Wasserburg Eschelbronn bei Heidelberg (13. Jh.) Forsch. Ber. Mittelalter Bad.-Württ. 6: 113-129
- Körber-Grohne, U. (1981): Pflanzliche Abdrücke in eisenzeitlicher Keramik - Spiegelbild damaliger Nutzpflanzen? Fundber. Bad.-Württ. 6: 165-211
- Körber-Grohne, U. (1985): Die biologischen Reste aus dem hallstattzeitlichen Fürstengrab von Hochdorf, Gemeinde Eberdingen (Kreis Ludwigsburg).- Hochdorf I. Forsch. u. Ber. z. Vor- u. Frühgesch. in Baden-Württ. 19: 95-265
- Körber-Grohne, U. (1987, 1988): Nutzpflanzen in Deutschland. Kulturgeschichte und Biologie. 1. Aufl. 1987, 2. Aufl. 1988. Theiss: 490
- Körber-Grohne, U. (1990): Gramineen und Grünland-Vegetation vom Neolithikum bis zum Mittelalter in Mitteleuropa. Bibliotheca Botanica 139: 105
- Körber-Grohne, U. (in Vorb.): Der Schacht der keltischen Viereckschanze von Fellbach-Schmidlen, Rems-Murr-Kreis, in botanischer und stratigraphischer Sicht. Forsch. Ber. Vor- und Frühgeschichte Bad.-Württ.
- Körber-Grohne, U. u. M. Rösch (1988): Römerzeitliche Brunnenfüllung im Vicus von Mainhardt, Kreis Schwäbisch Hall. Fundber. Bad.-Württ. 13: 307-323
- Körber-Grohne, U. u. O. Wilmanns (1977): Eine Vegetation aus dem hallstattzeitlichen Fürstengrabhügel Magdalenenberg bei Villingen - Folgerungen aus pflanzlichen Großresten. - In: Spindler, K.: Magdalenenberg. V: 51-68
- Körber-Grohne, U. u. U. Piening (1979): Verkohlte Nutz- und Wildpflanzenreste aus Bondorf, Kreis Böblingen. Fundber. Bad.-Württ. 4: 152-169
- Körber-Grohne, U. u. U. Piening (1983): Die Pflanzenreste aus dem Ostkastell von Welzheim mit besonderer Berücksichtigung der Graslandpflanzen. - Flora und Fauna im Ostkastell von Welzheim. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 14: 17-88
- Kornas, J. (1988): Speirochore Ackerwildkräuter: von ökologischer Spezialisierung zum Aussterben Flora 180: 83-91
- Korneck, D. (1955): *Carex buxbaumii* Wahlb. ssp. *subulata* A. Caj. an zwei linksrheinischen Wuchsstellen der nördlichen Oberrheinebene. Hess. Flor. Briefe 4 (46): 2-3
- Korneck, D. (1958): Der Haarblättrige Schwingel (*Festuca trichophylla* Ducros = *F. rubra* ssp. *trichophylla* (Ducros) Gaud.) in der nördlichen Oberrheinebene. Hess. Florist. Briefe 7: 79
- Korneck, D. (1958): Die Grundblütige Segge (*Carex halleriana* Asso = *C. gynobasis* Vill.) in Südwestdeutschland nicht nur in Südbaden, sondern auch im Nahegebiet. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N. F. 7: 205-211
- Korneck, D. (1960): Beobachtungen an Pflanzengesellschaften im Jahr 1959. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 19: 101-110
- Korneck, D. (1960): Beobachtungen an Zwergbinsengesellschaften im Jahr 1959. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 19 (1): 101-110
- Korneck, D. (1960): Das Bunte Perlgras (*Melica picta* Koch) im Oberen Donautal. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 7: 485-486
- Korneck, D. (1960): Der Amethyst-Schwingel (*Festuca amethystina* L. ssp. *eu-amethystina* [Saint-Yves] Krajina var. *genuina* [Saint-Yves] Krajina) im badischen Jura. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 7(6): 481-483
- Korneck, D. (1961): Strand-Beifuß und Sandsegge bei Viernheim, Südhessen. Hess. Flor. Briefe 10 (114): 28
- Korneck, D. (1961): Über einige in Baden und im Elsaß vorkommende Schafschwingel (*Festuca ovina* L. s. lat.) Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N.F. 8 (1): 187-196

- Korneck, D. (1962): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. II. Gruppe nässeliebender Niederungs-Molinion-Gesellschaften. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 21 (2): 165-190
- Korneck, D. (1962): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet I. Das Molinietum medio-europaeum. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 21/1: 55-77
- Korneck, D. (1963): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. III. Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl. 22:19-44
- Korneck, D. (1966): *Artemisia verlotorum* Lamotte als Neubürger im unteren Maingebiet. Hess. Flor. Briefe 15 (177): 45-47
- Korneck, D. (1966): Das siebenbürgische Perlgras (*Melica transsilvanica* Schur) im Naturschutzgebiet "Mainzer Sand". Hess. Flor. Briefe 15 (174): 29-32
- Korneck, D. (1969): Das Sclerochloo- Polygonetum *avicularis*, eine seltene Trittgemeinschaft in Trockengebieten Mitteleuropas. Mitt. florist.-soziolog. Arbeitsgem. 14: 193-210
- Korneck, D. (1972): *Orobanche elatior* Sutt. in Rheinhessen und Nachbargebieten. Hess. Flor. Briefe 21 (2):
- Korneck, D. (1974): Xerothermvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten. LandwirtschaftsverlagSchriftenreihe Vegetationskde. 7: 196
- Korneck, D. (1975): Beitrag zur Kenntnis mitteleuropäischer Felsgrus-Gesellschaften (Sedo-Scleranthetea). Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 18: 45-102
- Korneck, D. (1975): Das Narduretum *lachenalii*, eine neue Thero-Airion-Assoziation. Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl. 34: 161-166
- Korneck, D. (1976/1977): Klasse: Sedo-Scleranthetea Br.Bl. 55 em. TH. MÜLLER 61.- In: OBERDORFER, E. (Hrsg., 1978): Süddeutsche Pflanzengesellschaften II, 13-85.
- Korneck, D. (1978): In: E. Oberdorfer: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil II. G. Fischer
- Korneck, D. (1982): *Erysimum odoratum* und *Scleropoa rigida* im mittleren Lahntal. Hess. florist. Briefe 31(4): 50-61
- Korneck, D. (1984): Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet, 3. Folge. Hess. Flor. Briefe 33 (3): 34-42
- Korneck, D. (1985): Beobachtungen von Farn- und Blütenpflanzen in Mittel- und Unterfranken sowie angrenzenden Gebieten. Ber. Bayer. Bot. Ges. 56: 53-80
- Korneck, D. (1987): Die Pflanzengesellschaften des Mainzer Sandgebietes. Mainzer Naturw. Archiv 25: 135-200
- Korneck, D. (1988): Die Felsenleimkraut-Mauerpfeffer-Gesellschaft (*Sileno rupestris*-Sedetum *annui*) in den Südvogesen. Carolina 46: 139-140
- Korneck, D. (1990): Der Österreichische Beifuß (*Artemisia austriaca* Jacq.) im nördlichen Oberrheingebiet. Hess. Flor. Briefe 39 (3): 37-41
- Korneck, D. (1992): Das Acker-Leinkraut (*Linaria arvensis* (L.) Desf.) in der Vulkaneifel. Natur und Landschaft 67 (10): 473-475
- Korneck, D. u. H. Sukopp (1988): Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für den Arten- und Biotopschutz. Schriftenreihe für Vegetationskunde 19: 210
- Korneck, D. u. H.G. Fink (1979): Der Schweizer Alant (*Inula helvetica* Weber) noch immer in Südbaden. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 38: 53-59
- Korneck, D. u. M. Schnittler (1994): *Glyceria striata* und *Scirpus atrovirens* im Rheinland. Floistische Rundbriefe 28/1: 29-36
- Korneck, D. u. T. Müller (1967): *Galium anisophyllum* Vill auf der Schwäbischen Alb. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 35: 28-31
- Korneck, D., M. Schnittler u. I. Vollmer (1996): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. Schr.Reihe Vegetationskunde 28: 21-187

- Korneck, D., W. Lang u. H. Reichert (1981): Rote Liste der in Rheinland-Pfalz ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für den Arten- und Biotopschutz. Beitr. Landespflege Rheinland-Pfalz 8: 7-137
- Korneck, D., W. Lang u. H. Reichert (1986): Rote Liste der in Rheinland-Pfalz ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen (zweite, neu bearbeitete Fassung, Stand 31.12.1985). Ministerium für Umwelt und Gesundheit: 43
- Körner, Ch. u. H. Meusel (1986): Zur ökophysiologischen und ökogeographischen Differenzierung nah verwandter *Carlina*-Arten. Flora 178: 209-232
- Kovanda, M. (1972): *Cynoglossum* L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press : 119-121
- Kowarik, I. (1990): Zur Einführung und Ausbreitung der Robinie (*Robinia pseudoacacia* L.) in Brandenburg und zur Gehölzsukzession ruderaler Robinienbestände in Berlin. Verh. Berl. Bot. Ver. 8: 33-67
- Krach, E. u. B. Koepff (1980): Beobachtungen an Salzschwaden in Südfranken und Nordschwaben. Göttinger Florist. Rundbriefe 13: 61-75
- Krach, J.E. (1976): Samenanatomie der Rosifloren. I. Die Samen der Saxifragaceae. Bot. Jahrb. Syst. 97: 1-60
- Krach, J.E. u. R. Fischer (1979): Bemerkungen zur Verbreitung einiger Pflanzensippen in Südfranken und Nordschwaben. Ber. Bayer. Bot. Ges. 50: 161-172
- Krach, J.E. u. R. Fischer (1982): Bemerkungen zum Vorkommen einiger Pflanzenarten in Südfranken und Nordschwaben. Ber. Bayer. Bot. Ges. 53: 155-173
- Krahulcova, A. (1993): New Chromosome Numbers in *Taraxacum* with Reference to SAT-Chromosomes. Folia Geobot. Phytotax. 28: 289-294
- Kraiss, A. (1955): Verzeichnis von Habichtskräutern der Untergattung *Ehieracium* des Zähringer Burgenlandes bei Freiburg i.Br. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 6: 190-194
- Kraiss, A. (1966): Zweite Liste neuer Aufsammlungen von Habichtskräutern (Gattung *Hieracium*) aus dem südlichen Schwarzwald und Oberrheinland. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 9: 133-149
- Kraiss, A. (1970): Die Spuren unserer Habichtskräuter (*Hieracien*) ohne fossile Reste in der geologischen Vergangenheit, ein Versuch. Mit einer Ergänzungsliste unserer heimischen Funde. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 10: 349-352
- Krajina, V. (1930): Adnotationes ad species generis *Festuca* in Flora Cechoslovenica exsiccata. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., Num. Spéc. 10: 368 pp.
- Krause, E. (1919): Die Gräser Elsaß-Lothringens. Bruchstück einer Landesflora Mitt. Philomathische Ges. Elsaß-Lothringen 21: 1-161
- Krause, E.H.L. (1917): Die Korb- und Röhrenblütler (*Syngenesistae* und *Tubutae*) Elsaß-Lothringens. Bot. Centralbl. 35: 1-220
- Krause, E.H.L. (1920): Beiträge zur Flora von Baden. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1 (4): 130-133
- Krause, E.H.L. (1921): Beiträge zur Flora von Baden. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1 (5): 130-133
- Krause, K. (1930): Liliaceae. - In Engler, A.: Die natürlichen Pflanzenfamilien. Bd. 15a. W. Engelmann : 227-386
- Krause, R. (1989): Römische Brunnen im Kastellvicus von Murrhardt, Rems-Murr-Kreis. Arch. Ausgr. 1988: 114-118
- Krause, W. (1971): Die makrophytische Wasservegetation der südlichen Oberrheinaue. Arch. Hydrobiol. Suppl. 37: 387-465
- Krause, W. (1978): Gezielte Bodenentblößung und Anlage frischer Wasserflächen als Mittel der Bestanderneuerung in Naturschutzgebieten. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 11: 247-250
- Krauss, H.A. (1913): Blütenverdopplung bei *Himantoglossum hircinum* Spr. Allg. Bot. Zeitschr. 19(7-8): 115-116

- Krauss, H.A. (1925): Das Kommen und Gehen einer Orchis-Art in Württemberg. Veröff. Staatl. Stelle Naturschutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 2: 42-46,139
- Kreh, W. (1929): Pflanzensoziologische Beobachtungen an den Stuttgarter Wildparkseen. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 85: 175-203
- Kreh, W. (1933): Das Pflanzenkleid der Umgebung von Stuttgart. Veröff. st. Stelle NatSchutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 9 (1932): 37-74
- Kreh, W. (1938): Verbreitung und Einwanderung des Blausterns (*Scilla bifolia*) im mittleren Neckargebiet. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 94: 41-94
- Kreh, W. (1941-1945 (ersch. 1949)): Die Pflanzenwelt der Keuperklingen in der Umgebung von Stuttgart. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 94: 41-94
- Kreh, W. (1948): Verlust und Gewinn der Stuttgarter Flora im letzten Jahrhundert. Jh. Ver. Vaterl. Naturkunde Württ. 106: 69-124
- Kreh, W. (1949): Beiträge zur Vegetationskunde von Württemberg. I-III. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 97-101: 199-219
- Kreh, W. (1949): Das Bittersüß (*Solanum dulcamara*) als Ubiquitist. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 97-101: 207-211
- Kreh, W. (1949): Die Pflanzenwelt der Keuperklingen in der Umgebung von Stuttgart (1941-1945). Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 97-101: 212-219
- Kreh, W. (1950): Die Pflanzenwelt einer beim Bau der Autobahn zerstörten Stubensandgrube. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 102/105: 71-74
- Kreh, W. (1950): Über den Rückgang der Knabenkräuter in der Stuttgarter Umgebung während des letzten Jahrhunderts. Veröff. Staatl. Stelle Naturschutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 19: 64-70
- Kreh, W. (1950/1951): Verlust und Gewinn der Stuttgarter Flora im letzten Jahrhundert. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 106: 69-124
- Kreh, W. (1952): Der Fliederspeer (*Buddleia variabilis*) als Jüngsteinwanderer unserer Flora. Aus der Heimat 60: 20-25
- Kreh, W. (1954): Verlust und Gewinn der Stuttgarter Flora im letzten Jahrhundert. Nachtrag 1953. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 109: 63-82
- Kreh, W. (1955): Auf dem Stuttgarter Trümmerschutt erzeugte Samenmengen. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 110: 212-215
- Kreh, W. (1955): Der schwarzfrüchtige Zweizahn (*Bidens melanocarpus*) neu für Württemberg. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 110: 264-265
- Kreh, W. (1955): Verlust und Gewinn der Stuttgarter Flora im letzten Jahrhundert. Nachtrag 1955. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 110: 199-211
- Kreh, W. (1957): Verlust und Gewinn der Stuttgarter Flora im letzten Jahrhundert. Nachtrag 1957. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 112: 188-200
- Kreh, W. (1958): Die Verbreitung der Mistel im mittleren Neckarland. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 113: 132-142
- Kreh, W. (1958): Übersicht über die Orchideenwuchsorte des mittleren Neckarlands. Florist. Ber. Stuttgarter Blümleszunft 3, Nr. 16
- Kreh, W. (1959): Verbreitungsbilder aus der Pflanzenwelt des mittleren Neckarraumes. - Florist. Ber. Stuttgarter Blümleszunft, 4. Jg., Verbreitungsbilder Nr.1-9
- Kreh, W. (1959): Verlust und Gewinn der Stuttgarter Flora im letzten Jahrhundert. Nachtrag 1959. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 114: 138-165
- Kreh, W. (1960): Die Pflanzenwelt des Güterbahnhofs in ihrer Abhängigkeit von Technik und Verkehr Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N. F. 8: 86-109
- Kreh, W. u. G. Schaaf (1931): Neue Glieder der der Stuttgarter Pflanzenwelt. II Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 87: 131-146
- Kreh, W. u. G. Schaaf (1931): Neue Glieder der Stuttgarter Pflanzenwelt. II. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 87: 131-146

- Krendl, F. (1967): Cytotaxonomie der Galium mollugo-Gruppe in Mitteleuropa (Zur Phylogenie der Gattung Galium VIII.). Österr. Bot. Zeitschr. 114: 508-549
- Krendl, F. (1993): Chromosomenzahlen und geographische Verbreitung in der Gattung Galium L. (Sect. Leptogalium - Rubiaceae). Österr. Akademie der Wissenschaften Biosystematics and Ecology Series 4: 51-112
- Krendl, F. u. A. Polatschek (1984): Die Gattung Ononis L. in Österreich. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 122: 77-91
- Kretschmar, F. (1992): Die Wiesengesellschaften des Mittleren Schwarzwaldes: Standort - Nutzung - Naturschutz. Diss. Bot. 189: 1-146
- Kretschmar, F. (1992): Die Wiesengesellschaften des Mittleren Schwarzwaldes: Standort-Nutzung-Naturschutz. Diss. Bot. 189: 146
- Kreutzer, B. (1988): Zur Geschichte der einheimischen Orchideen unter besonderer Berücksichtigung ihrer pharmazeutisch-medizinischen Anwendung. Quellen Stud. Gesch. Pharm. (Hrsg. R. Schmitz) 42: 1-311
- Kreuz, A. (1985): Archäobotanische Untersuchung eines Bischheimer Hauses bei Creglingen-Frauental. Unveröff. Dipl.-Arb. Univ. Frankfurt: 51
- Krieglsteiner, G.J. u. L.G. Krieglsteiner (1982): Der Widerbart, *Epipogium aphyllum* (F.W.Schmidt) Sw. - ein wichtiges Argument für die Erweiterung des Naturschutzgebietes Ohrsägmühle/Rosenberg. *Unicornis* 2(1): 36-38
- Krieglsteiner, L. (1987): Farn- und Blütenpflanzen sowie höhere Pilze im Raum Schwäbisch Hall. - Stadtplanungsamt Schwäbisch Hall, Arbeitsbericht 16
- Krieglsteiner, L., H. Muhle u. R. Sailer (1993/1995): *Melica picta* C. Koch, das "Bunte Perlgras" im Ulmer Raum wiederentdeckt. Mitt. Ver. Naturwissenschaft Mathematik Ulm (Donau) 36/37: 105-109
- Krisch, H. (1986): *Agropyron x obtusiusculum* Lange und die anderen *Agropyron*-Sippen an der Ostseeküste der Deutschen Demokratischen Republik *Gleditschia* 14 (1): 119-134
- Kronberger, K. (1972): Die Schachblume, das Juwel unserer Auwiesen. Ber. naturforsch. Ges. Bamberg 46: 40-41
- Krüss, A. u. U. Rohde (1990): Pflegeproblematik und Bestandsentwicklung in den Naturschutzgebieten "Sandhauser Dünen". *Carolinea* 48: 109-120
- Krüssmann, G. (1976-1978): Handbuch der Laubgehölze. 3 Bände. P. Parey
- Kübler-Thomas, M. (1988): Schutzprogramm für Ackerwildkräuter. Arbeitsblätter zum Naturschutz 8: 16
- Kübler-Thomas, M. (1994): Extensivierung zum Schutz von Ackerwildkräutern. *Carolinea* 52: 35-44
- Kübler-Thomas, M. u. P. Thomas (1989): Über ein Vorkommen von *Teucrium scordium* und *Opioglossum vulgatum* am östlichen Hochrhein. *Carolinea* 47: 147-148
- Kuhmichel, F. (1991): Moltbeere (*Rubus chamaemorus* L.). Biologie und Anbau einer arktischen Wildfrucht. *Der Palmengarten* 55 (2): 38-46
- Kühn, F. (1978): *Alopecurus myosuroides* Huds. wird ein schwieriges Unkraut *Zpravy Cesk. Bot. Spol* 13 (1): 62
- Kuhn, J. (1989): Die Vegetation des Schmiechener Sees. *Jh. Ges. Naturk. Württ.* 144: 69-118
- Kuhn, J. u. W. Kramer (1995): Vegetation und Flora des Schmiecher Sees (Gefäßpflanzen). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 78: 150-306
- Kuhn, K. (1937): Die Pflanzengesellschaften im Neckargebiet der Schwäbischen Alb. (Hsrg.: Württ. Landesst. Naturschutz u. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.). F. Rauh: 340
- Kuhn, L. (1954): Die Verlandungsgesellschaften des Federseerieds bei Buchau in Oberschwaben. Diss. Tübingen. :
- Kuhn, L. (1961): Die Verlandungsgesellschaften des Federseerieds. In: Zimmermann, W. (Hrsg.): *Der Federsee. Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ.* 2: 1-69
- Kühner, E. (1971): Soziologische und ökologische Untersuchungen an Moosen mecklenburgischer Ackerböden. *Feddes Repertorium* 82: 449-560

- Kükenthal, G. (1892): Carikologische Beiträge. Mitt. Thür. Bot. Ver. N. F. 2: 38-45
- Kükenthal, G. (1899): Die Carexvegetation des außertropischen Südamerika (ausgenommen Paraguay und Südbrasilien). Bot. Jahrb. Syst. 27: 485-563
- Kükenthal, G. (1909): Cyperaceae-Caricoideae. In: Engler, A (Hrsg.): Das Pflanzenreich. IV/20: 1-824
- Kükenthal, G. (1938): Beiträge zur Kenntnis der Brombeeren des Schwarzwaldes. Feddes Repertorium 43: 154-160, 289-295
- Kullenberg, B. (1961): Studies in Ophrys Pollination. Almquist u. Wiksells : 340
- Kummer, G. (1934): Die Flora des Rheinfallgebietes. Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 11: 1-128
- Kummer, G. (1937-1946): Die Flora des Kantons Schaffhausen, mit Berücksichtigung der Grenzgebiete. Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 13: 49-157 (1937); 15: 37-201 (1939); 17: 123-260 (1941); 18: 11-110 (1943); 19: 1-130 (1944); 20: 69-208 (1945); 21: 75-194 (1946);
- Kunick, W. (1983): Pilotstudie Stadtbiotopkartierung Stuttgart. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 36: 139
- Künkele, S. (1970): Bemerkungen zu den autogamen Epipactis-Sippen in Württemberg. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 23: 104-105
- Künkele, S. (1970): Zur Bedeutung des NSG Silberberg als Orchideenschutzgebiet. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 2(6): 90-96
- Künkele, S. (1972): Probleme des Artenschutzes, dargestellt am Beispiel der Orchideen von Baden-Württemberg. Die Orchidee 23(3,4): 112-115, 147-158
- Künkele, S. (1972): Ziele und bisherige Ergebnisse der Orchideen-Kartierung in Baden-Württemberg. Göttinger Flor. Rundbr. 6: 86-90
- Künkele, S. (1975): Zur Verbreitung von Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. in Baden-Württemberg. Jahresh. Ges. Naturk. Württ. 130: 236-248
- Künkele, S. (1975): Zusammenstellung der Vorkommen von Orchideenbastarden in Baden-Württemberg. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 7(2): 26-76
- Künkele, S. (1976): Ziele und Ergebnisse der Orchideen-Kartierung ins Südwestdeutschland. Proceed. 8. World Orchid Conf. Frankfurt 1975 : 287-297
- Künkele, S. (1977): Über positive Arealveränderungen bei einigen Orchideen in Baden-Württemberg unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzprobleme. Göttinger Flor. Rundbr. 11: 58-79
- Künkele, S. (1977): Zur Verbreitung und Gefährdung der Orchideen im Raum Albstadt (Schwäb. Alb). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 46: 19-48
- Künkele, S. (1978): Zum Stand der Orchideenkartierung und ihrer Auswertung. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 11: 55-98
- Künkele, S. (1982): Die Orchideenflora um Münsingen in Vergangenheit und Gegenwart. In: Münsingen: Geschichte, Landschaft, Kultur; Festschr. zum Jubiläum d. württ. Landesvereinigungsvertrags von 1482. auch in Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 14(3): 281-294
- Künkele, S. (1987): Beiträge zur Geschichte der europäischen Orchideen. I. Leonhart Fuchs, der Vater der Väter der Botanik. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 19(2): 197-383
- Künkele, S. (1996): Beiträge zur horizontalen und vertikalen Verbreitung der Orchideen von Baden-Württemberg. Journ. Eur. Orch. 28(1): 3-83
- Künkele, S. u. A. Vogt (1973): Zur Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Baden-Württemberg. Beih. Veröff. Landest. Natursch. Landschaftspflege Bad.-Württ. 1: 8-72
- Künkele, S. u. E. Willing (1976): Interimskarten zur Verbreitung der Orchideenarten in Mitteleuropa (1. Fassung). Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Bad.-Württ. 8: 30-100
- Künkele, S. u. R. Lorenz (1990): Die Orchideen in dem Bilderwerk des Carolus Clusius (Libri picturati A16-31). Beiträge zur Geschichte der europäischen Orchideen im 16. Jahrhundert. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Bad.-Württ. 22(3): 541-691
- Künkele, S. u. R. Lorenz (1994): Liparis loeselii (L.)Rich. - Die Orchidee des Jahres 1994. Journ. Eur. Orch. 26(1): 17-36

- Künkele, S. u. S. Seybold (1970): Überblick über das Herbarmaterial aus Württemberg. Jahresh. Ges. Naturk. Württ. 125: 145-157
- Kunz, H. (1956): *Ranunculus polyanthemophyllus* Koch et Heß, *Neslia apiculata* Fischer et Meyer und *Callitriche obtusangula* Le Gall in Südbaden. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 15: 52-55
- Kurr, G. (1850): 7. Pflanzen- und Tier-Reich. A. Pflanzen. In: Beschreibung des Oberamtes Böblingen. : 32-35
- Kurr, G. u. C.A. Rösler (1854): Pflanzen- und Thierreich. In: Beschreibung des Oberamts Aalen: 36-41
- Kurtz, K.M. (1880-1881): Flora des Bezirks Ellwangen in: Programm des Königlichen Gymnasiums zu Ellwangen vom Schuljahre 1880-1881, Nr. 510, 24
- Kurtz, K.M. (1882/83): Programm des Königlichen Gymnasiums zu Ellwangen. Flora des Bezirks Ellwangen: 1-24
- Kurtz, K.M. (1886): Pflanzen- und Thierreich, a) Pflanzen. In: Beschreibung des Oberamts Ellwangen: 61-81
- Kurz, G. (1973): Ulmer Flora. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 29: 1-304
- Küster, H. (1983): Rekonstruktionsversuche zur neolithischen Landwirtschaft nach botanischen Funden aus Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg). Archäolog. Korrespondenzbl. 13: 37-39
- Küster, H. (1985): Herkunft und Ausbreitungsgeschichte einiger *Secalietea*-Arten. Tuexenia 5: 89-98
- Küster, H. (1985): Neolithische Pflanzenreste aus Hochdorf, Gemeinde Eberdingen (Kreis Ludwigsburg) Forsch. Ber. Vor- und Frühgeschichte Bad.-Württ. 19: 15-72
- Küster, H. (1988a): Granatäpfel (*Punica granatum* L.) im mittelalterlichen Konstanz. Arch. Korrespondenzbl. 18 (1): 103-107
- Küster, H. (1988b): Mittelalterliche Pflanzenreste aus Konstanz am Bodensee. Diss. Bot. 133: 201-216
- Küster, H. (1991): 9. Mitteleuropa südlich der Donau, einschließlich Alpenraum. In W. van Zeist, K. Wasylkova u. K. E. Behre (eds.): Progress in Old World Palaeoethnobotany 179-187
- Küster, H. (1992): Kultur- und Nutzpflanzen in Konstanz. - Die Stadt um 1300. Katalog zur Ausstellung.
- Lachenal, W. de (1787): Emendationum et Auctariorum ad Jll. Halleri Historiam Stirpium Helveticarum. Nov. Act. Helv. Phys. Math. Anat. Bot. Med. 1: 270-307
- Ladewig, K. (1976): *Eragrostis tef* (Zuccagni) Trotter in der BRD Gött. Flor. Rundbr. 10 (2): 24-27
- Läpple, H. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (82-83). Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 77-78
- Lainz, M. (1960): *Lotus uliginosus* Schkuhr (1804), ein unausrottbarer Name? Bull. Jard. Bot. Brux. 30: 35-36
- Lambinon, J. (1981): (590) Proposition de rejet *Carex muricata* L. Sp. pl. ed 1: 974, 1753 (Cyperaceae). Taxon 30: 362
- Lambinon, J. (1981): Proposition de rejet *Bromus hordeaceus* L. Taxon 30 (1): 362
- Lambinon, J., J.-E. de Langhe, L. Delvosalle u. J. Duvigne (1992): Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines. - CXX+1092 S., 4. Aufl.; Meise (Editions du Patrimoine du Jardin botanique nat. de Belgique).
- Landolt, E. (1967): Gebirgs- und Tieflandsippen von Blütenpflanzen im Bereich der Schweizer Alpen. Bot. Jahrb. Syst. 86: 463-480
- Landolt, E. (1977): Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Veröff. Geobot. Inst. der ETH, Stift. Rübel, Zürich 64: 1-208
- Landolt, E. (1985): Höhendifferenzierung einiger Artengruppen von Blütenpflanzen in Fettwiesen des Davoser Gebietes (Graubünden, Schweiz), (vorläufige Mitteilung). Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel 52: 117-139

- Landolt, E. (1995): Beiträge zur Flora der Stadt Zürich. II. Monokotyledonen. Bot. Helv. 105: 75-95
- Landolt, E., H. P. Fuchs, Ch. Heitz und R. Sutter (1982): Bericht über die gefährdeten und seltenen Gefäßpflanzenarten der Schweiz ("rote Liste"). Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel 49: 195-218
- Lang, B. (1986): Die Schafweiden des unteren Sackentals bei Gerstetten in ihrer Abhängigkeit von der Nutzung. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 61: 43-65
- Lang, G. (1954): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. I. Der Hotzenwald im Südschwarzwald. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 13: 3-42
- Lang, G. (1962): Vegetations- und Standortsuntersuchungen in der Grenzzone des Bodenseeuferes. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 75: 366-377
- Lang, G. (1962): Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen der Magdalénienstation an der Schussenquelle. Veröff. Geobot. Inst. der ETH, Stift. Rübel, Zürich 37: 129-154
- Lang, G. (1967): Die Ufervegetation des westlichen Bodensees. Arch. Hydrobiol. Suppl. 32 (4): 437-574
- Lang, G. (1968): Vegetationsänderungen am Bodensee in den letzten hundert Jahren. Schriften Ver. Gesch. Bodensee 86: 295-313
- Lang, G. (1970): Florengeschichte und mediterran-mitteleuropäische Florfenbeziehungen. Feddes Repertorium 81: 315-335
- Lang, G. (1971): Die Vegetationsgeschichte der Wutachschlucht und ihrer Umgebung. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 6: 323-349
- Lang, G. (1973): Das Baldenwegermoor und das einstige Waldbild am Feldberg. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 32: 31-51
- Lang, G. (1973): Die Vegetation des westlichen Bodenseegebietes. G. FischerPflanzensoziologie 17: 452
- Lang, G. (1973): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. IV. Das Baldenwegermoor und das einstige Waldbild am Feldberg. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschl. 32: 31-51
- Lang, G. (1983): Die Vegetation des Mindelsees und ihre Geschichte. - In: Der Mindelsee bei Radolfzell. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 11: 271-302
- Lang, G. (1990): Die Vegetation des westlichen Bodenseegebietes. G. Fischer: 462
- Lang, G. (1994): Quartäre Vegetationsgeschichte Europas. Methoden und Ergebnisse: 462
- Lang, H. (1872): Beiträge zur württembergischen Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 28: 113-118
- Lang, K. H. (1843): Standpunkte der seltenen Pflanzen in der Umgebung von Müllheim. In: G. Wever: Badenweiler mit seinen Umgebungen: 143-175
- Lang, O. F. (1843): Beiträge zur Kenntnis einiger Carex-Arten. II. Carex muricata und deren Verwandte. Flora 26: 144-147
- Lang, W. (1974): Solanum nitidibaccatum Bitter (Argentinischer Nachtschatten), eine neue Art der Pfälzer Flora. Mitt. Pollichia III. Reihe 21: 39-45
- Lang, W. (1975): Der Saracho-Nachtschatten (Solanum sarachoides Sendtner em. Bitter), eine weitere südamerikanische Art, neu für die Pfalz. Mitt. Pollichia 63: 45-48
- Lang, W. (2003): Zur Verbreitung und Vergesellschaftung des Purpur-Storchschnabels (Geranium purpureum Vill.) in der Pfalz und angrenzenden Gebieten, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 2: S. 79-86
- Lang, W. u. N. Hailer (1979): Flora der Pfalz III. Weitere Ergebnisse. Mitt. Pollichia Pfälzer Vereins für Naturkunde 67: 158-173
- Lang, W. u. P. Wolff (1993): Flora der Pfalz. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete. Veröff. Pfälz. Ges. Förd. Wiss. Speyer 85: 1-444
- Lange, D. (1995): Untersuchungen zur Systematik und Taxonomie der Gattung Helictotrichon Besser ex. J.A. Schlutes & J.H. Schultes (Poaceae) in Südosteuropa und Vorderasien. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung Bibliotheca Botanica: 238

- Lange, O.H. (1955): Untersuchungen über die Hitzeresistenz der Moose in Beziehung zu ihrer Verbreitung. *Flora* 142: 381-399
- Langer, H. (1958): Die Vegetationsverhältnisse des Benninger Riedes und ihre Verknüpfung mit der Vegetationsgeschichte des Memminger Tales. *Bot. Jahrb. Syst.* 77 (4): 355-422
- Langhe, J. E. de (1944): Sur le groupe du *Carex muricata* L. en Belgique. *Bull. soc. Roy. Bot. Belg.* 76: 39-50
- Läpple, H. (1995): Orchideen im Landkreis Rastatt. *Heimatbuch Landkreis Rastatt*: 193-208
- Läpple, H. (1996): Orchideen im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden. Ein Beitrag zur Kartierung der Orchideen in Baden-Württemberg. *Journ. Eur. Orch.* 28(2): 219-322
- Lara Ruiz, J. (1995): Rapport (559-589). In: Kamari, G., F. Felber u. F. Garbari (eds.): *Mediterranean chromosome number reports - 5*. *Flora Mediterranea* 5: 363-373
- Larcher, W. et al. (1989): Temperaturreistenz inneralpiner Trockenrasen. *Flora* 183: 115-131
- Laschinger, R. (1966): Untersuchungen über Standortbedingungen einiger Orchideen des Hüfing Waldes. *Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar* 26: 138-161
- Lassen, P. (1989): A new delimitation of the genera *Coronilla*, *Hippocrepis* and *Securigera* (Fabaceae). *Willdenowia* 19: 49-62
- Lauber, K. u. G. Wagner (1996): *Flora Helvetica*: 1613
- Laudien, H. (1972): Beiträge zur Biologie, Ökologie, wirtschaftlichen Bedeutung und Verbreitung der Schadhirschen *Echinochloa crus-galli* L., *Digitaria sanguinalis* L. Scop., *Setaria glauca* L. und *Setaria viridis* L. in der Bundesrepublik Deutschland Diss. Univ. Hohenheim: 109
- Lauffer (1894): Eine kleine Albwanderung und ein Stück Albflora. *Aus der Heimat* 7: 47-53
- Lauterborn, R. (1921): Zur Charakteristik der Pflanzenwelt am nordwestlichen Bodensee. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F.* 1 (7): 202-204
- Lauterborn, R. (1927): Beiträge zur Flora der Oberrheinischen Tiefebene und der benachbarten Gebiete. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F.* 2 (7/8): 77-88
- Lauterborn, R. (1941): Beiträge zur Flora des Oberrheins und des Bodensees. *Mitt. Naturk. Natursch., N.F.* 4 (8): 287-301
- Lauterborn, R. (1941/42): Beiträge zur Flora des Oberrheins und des Bodensees. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F.* 4: 287-301 (1941), 313-321 (1942)
- Lauterer, J. (1874): *Excursions-Flora für Freiburg und seine Umgebung (von Lahr bis Efringen, vom Rhein bis St. Blasien, Neustadt und Triberg)*. Herder: 224
- Lebeau, J. (1967): Observations et trouvailles floristiques en 1966. *Natura Mosana* 20 (1/2): 1-8
- Lebeau, J. (1967): Une plante fréquente et pourtant méconnue en Belgique: l'hybride *Mentha x villosa* ssp. *velutina*. *Natura Mosana* 20 (1/2): 9-13
- Lebeau, J. (1974): Appellations nouvelles de *Mentha* (Labiatae) hybrides, et proposition du rang nouveau de subhybride. *Bull. Jard. Bot. Nat. Belg.* 44: 249-257
- Lebeau, J. (1975): Nouvelles mises au point dans le genre *Mentha*. *Natura Mosana* 27 (4): 109-141
- Lebeau, J. (1986): Notes destinées à faciliter et encourager l'étude du genre *Mentha*. *Feuille de contact trimestrielle driemaandelijks contactblad* : 60-74
- Lebeau, J. (1992): *Mentha* L. In: *Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines* (Hrsg.: Langhe, J.-E., Delvosalle, L., Duvigneaud, J. u. J. Lambinon). : 536-541
- Lechler, W. (1844): Supplement zur Flora von Württemberg. E. Schweizerbart: 72
- Lechler, W. (1845): Über neue Phanerogamen in Württemberg. *Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 1: 159-160
- Lechler, W. (1847): Zur Flora von Württemberg. *Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 3: 147-148
- Leinfellner, W. (1962): Über die Variabilität der Blüten von *Tofieldia calyculata* I-III Österr. *Bot. Zeitschr.* 109: 1-17; 113-124; 395-430
- Lenski, I. u. W. Ludwig (1964): *Poa supina* und *Poa annua x supina* in Hessen. *Hess. Florist. Briefe* 13(154): 41-50

- Lenski, I. u. W. Ludwig (1972): Über *Potentilla anglica* und *P. anglica x erecta* in Hessen. Hess. Flor. Briefe 21 (3): 34-36
- Leopold, J.D. (1728): *Deliciae sylvestres florae ulmensis* oder Verzeichniß deren Gewächsen, welche um deß H. Röm. Reichs Freye Stadt Ulm in Aeckern, Wiesen, ... zu wachsen pflegen .. J.C. Wohler: 180
- Lesins, K.A. u. I. Lesins (1979): Genus *Medicago* (Leguminosae). A taxogenetic study. W. Junk : XI + 228
- Leslie, A.C. (1976): *Dipsacus strigosus* Willd. in Cambridgeshire V. C. 29. *Watsonia* 11: 67-68
- Leutz, F. (1883): Beiträge zur Karlsruher Flora. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (8/9): 77-82
- Leutz, F. (1884): Verschiedenes. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (12): 114
- Leutz, F. (1899): Vereins-Ausflug nach Ichenheim. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (165-168): 154-156
- Levan, A. (1936): Zytologische Untersuchungen an *Allium schoenoprasum*. *Hereditas* 1: 126
- Lewejohann, K. (1971): Die Gattung *Orobancha* im südlichen Niedersachsen und angrenzenden Gebieten. I. Teil. Gött. Flor. Rundbr. 5 (1): 6-10
- Lewin, R.A. (1948): Biological Flora of British Isles. - *Sonchus* L. (*S. oleraceus* L. and *S. asper* (L.) Hill). *J. Ecol.* 36: 203-223
- Libbert, W. (1939): Pflanzensoziologische Untersuchungen im mittleren Kocher- und Jagsttale. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 15: 65-102
- Lid, J. (1974): Norsk og Svensk Flora. Det Norske Samlaget: 808
- Lid, J. (1987): Norsk, svensk, finsk Flora: 837
- Liebheit, K. (1979): Teil A: Flora. In: Liebheit, K. u. W. Schäfer: Eine geschützte Waldwiese im Mahdenbachtal südlich von Stuttgart-Rohr, ihre Vegetation und Makrolepidopteren-Fauna. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 49/50: 455-484
- Liebheit, K. (1979-1981): Typische Habichtskräuter der *Hieracium murorum*- und *glaucinum*-Gruppe Südwest-Deutschlands. - Gött. Flor. Rundbr. 13: 33-41 (1979); 13: 85-90 (1980); 14: 57-62 (1980); 15: 65-70 (1981).
- Liehl, H. (1898): Die Kiesgrube an der Basler Landstraße bei Freiburg. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (159): 78-80
- Liehl, H. (1900): Neue Funde in der Kiesgrube an der Baslerstraße bei Freiburg. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (173/174): 200-201
- Liepelt, S. u. R. Suck (1992): Zur Verbreitung und Soziologie von *Carex hartmannii* A. Cajander in Franken. Ber. Bayer. Bot. Ges. 63: 109-116
- Limmeroth, Th. u. N. von Wiren (1989): Standortkundliche Exkursion am 17.6.1988 auf die Ostalb. Bund Naturschutz Alb-Neckar 15: 70-78
- Linck, O. (1938): Der Sperberbaum in Württemberg. Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege 14: 168-179
- Linder, H.P. (1986): Poaceae. Diverse notes on southern African pooids. *Bothalia* 16: 59-61
- Linder, Th. (1903): Ein Vegetationsbild vom Oberrhein (Fortsetzung). Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (187/188): 322-328
- Linder, Th. (1903): Ein Vegetationsbild vom Oberrhein (Schluss). Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (1899: 329-335
- Linder, Th. (1903): Ein Vegetationsbild vom Oberrhein. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4: 297-311, 322-328, 329-335
- Linder, Th. (1904): *Saxifraga decipiens* Ehrh. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (194/195): 383 S.
- Linder, Th. (1905): Bemerkenswerte Pflanzenstandorte (1) und (2). Mitt. Bad. Bot. Ver. 5(205/206): 41-44, 5(207):47-51
- Linder, Th. (1907): Ein Beitrag zur Flora des badischen Kreises Konstanz. Mitt. Bad. Bot. Ver. 5 (222/223): 165-174

- Linder, Th. (1910): Nachtrag zu "Ein Beitrag zur Flora des badischen Kreises Konstanz". Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 5 (246): 363-364
- Lindman, C. A. M. (1909): *Poa remota* Forselles, eine wiederherzustellende europäische Art. Bot. Jahrb. Syst. 44: 36-45
- Lingg, C. (1832): Beiträge zur Naturkunde Oberschwabens. Inaug. Diss.: 32
- Link, F.-G. u. W. Link (1989): Heiden im Enzkreis. Veröff. Naturschutz Landschaftspfl. Bad.-Württ. 64/65: 17-79
- Linke, K.-H. u. M.C. Saxena (1991): Study on viability and longevity of *Orobanche* seed under laboratory conditions.- In: Wegmann, K. u. L.J. Musselmann (eds.): Progress in *Orobanche* research. Proceedings of the international workshop on *Orobanche* research - Obermarchtal, FRG, August 19-22, 1989: 110-114; :
- Linke, K.-H., J. Sauerborn u. M.C. Saxena (1989): *Orobanche* Field Guide.: 42
- Linnaeus, C. von (1763): *Species Plantarum*. Tom. 2. Ed. 2. Holmiae.
- Linné, C. v. (1753): *Species Plantarum*. I+II: 1199
- Linné, C. v. (1767): *Systema Naturae*, Vol. 2: 736
- Lippert, W. (1966): Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes Berchtesgaden. Ber. Bayer. Bot. Ges. 39: 67-122, 70
- Lippert, W. (1978): Zur Gliederung und Verbreitung der Gattung *Crataegus* in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 49: 165-198
- Lippert, W. (1984): Zur Kenntnis des *Aphanes microcarpa*-Komplexes. Mitt. Bot. Staatssammlungen München 20: 451-464
- Lippert, W. (1986): Beiträge zu kritischen oder wenig beachteten Arten und Artengruppen der bayerischen Flora. Ber. Bayer. Bot. Ges. 57: 113-120
- Lippert, W. u. G.R. Heubl (1988): Chromosomenzahlen von Pflanzen aus Bayern und angrenzenden Gebieten. Ber. Bayer. Bot. Ges. 59: 13-22
- Lippert, W. u. H. Merxmüller (1974-1982): Untersuchungen zur Morphologie und Verbreitung der bayerischen *Alchemilla*. Ber. bayer. bot. Ges. 45: 37-50 (1974); 46: 5-46 (1975); 47 5-19 (1976); 50: 29-65 (1979); 53: 5-45 (1982);
- Litzelmann, E. (1927): Die Orchideen des Kaiserstuhls. Der Naturforscher 3: 113-120
- Litzelmann, E. (1931): Die Dingelorchis (*Limodorum abortivum*). Aus der Heimat 44: 211-215
- Litzelmann, E. (1933): *Orchis pallens*, das Bleiche Knabenkraut. Aus der Heimat 46: 173-174
- Litzelmann, E. (1935): Die Lebensgeschichte unserer Moderorchideen. Aus der Heimat 48(5): 129-148
- Litzelmann, E. (1938): Pflanzenwanderungen im Klimawechsel der Nacheiszeit. F. RauhSchriften Deutsch. Naturk. Ver. N.F. 7: 48
- Litzelmann, E. (1951): Neue Pflanzenfundberichte aus Südbaden. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 5 (4/5): 191-196
- Litzelmann, E. (1953): Die Glockenheide in einem neu entdeckten Moor des Südschwarzwaldes. Natur und Landschaft 28: 113-115
- Litzelmann, E. u. M. Litzelmann (1959): Physiologie und Ökologie der Felsflurvegetation auf dem Isteiner Klotz. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 18: 144-174
- Litzelmann, E. u. M. Litzelmann (1960): Das Vegetationsbild des Dinkelbergplateaus. *Bauhinia* 1: 222-250
- Litzelmann, E. u. M. Litzelmann (1961): Verbreitung von Glazialpflanzen im Verbreitungsgebiet des Schwarzwaldes. Ber. Naturf. Ges. Freiburg 51: 209-244
- Litzelmann, E. u. M. Litzelmann (1963): Neue Pflanzen-Fundberichte aus Südbaden II. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 8 (3): 463-475
- Litzelmann, E. u. M. Litzelmann (1966): Die Felsflurgesellschaften auf dem Sporn. In: H. Schäfer u. O. Wittmann:; Der Isteiner Klotz. Zur Naturgeschichte einer Landschaft am Oberrhein. Natu- u. Landschaftsschutzgeb. Bad.-Württ. 4: 117-151

- Litzelmann, E. u. M. Litzelmann (1967): Die Mooregebiete auf der vormals vereist gewesenen Plateaulandschaft des Hotzenwaldes. Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 28 (1963/67): 21-99
- Litzelmann, E. u. O. Wittmann (1951): Exkursion zum Isteiner Klotz und ins Rheinvorland (21.5.1950). Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N.F. 5: 254-258
- Litzelmann, E., M. Litzelmann u. H. Schäfer (1966): Die Pflanzenwelt am Isteiner Klotz. - In: Der Isteiner Klotz, zur Naturgeschichte einer Landschaft am Oberrhein. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 4: 111-268
- Loch, D. S. and J. B. Hacker (1995): Tropical and subtropical grasses, various genera (Chloridoideae). - In Smartt, J. and N. W. Simmonds (eds.): Evolution of crop plants Longman : 225-228
- Loeselius, J. (1703): Flora Prussica. I-XVI: 1-294
- Loesener, O. (1926): Studien über die Gattung *Veratrum* und ihre Verbreitung Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 68 (2): 105-166
- Loesener, O. (1927/28): Übersicht über die Arten der Gattung *Veratrum*. Teil I Repert. spec. nov. regni vegetabilis 24: 61-72
- Loesener, O. (1928): Übersicht über die Arten der Gattung *Veratrum*. Teil II Repert. spec. nov. regni vegetabilis 25: 1-10
- Lohmeyer, W. (1986): Der Besenginster (*Sarothamnus scoparius*) als bodenständiges Strauchgehölz in einigen natürlichen Pflanzengesellschaften der Eifel. Abh. Westf. Mus. Naturk. 48: 157-174
- Lohmeyer, W. (1991): Die Kugeldisteln *Echinops sphaerocephalus* L. und *Echinops exaltatus* Schrad. sowie deren Bastard als Neophyten im Gebiet der Pellenzvulkane (Kreis Mayen-Koblenz). Natur und Landschaft 66 (6): 326-330
- Lohmeyer, W. u. H. Sukopp (1992): Agriophyten in der Vegetation Mitteleuropas. BFANLSchriftenreihe für Vegetationskunde 25: 1-185
- Lohmeyer, W. u. W. Trautmann (1974): Zur Kenntnis der Waldgesellschaften des Schutzgebietes "Taubergießen - Erläuterungen zur Vegetationskarte. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 7: 422-437
- Lohmeyer, W., W. Trautmann u. D. Korneck (1973): Gutachten über die Vegetation des Landschaftsschutzgebietes "Isteiner Klotz" und deren Schutzwürdigkeit (Hrsg.: Bundesanstalt für Vegetationskunde, Naturschutz und Landschaftspflege): 59
- Lojtnant, B. u. N. Jacobsen (1977): The biology and taxonomy of the orchids of Greenland. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 29: 17-40
- Loos, G. H. (1991): Notizen zur Behaarung bei *Lotus corniculatus* L. Flor. Rundbr. 25: 109-112
- Loos, G. H. (1994): Untersuchungen zur Taxonomie, Ökologie und Soziologie der *Poa pratensis*-Gruppe. I. Viatische Linienmigration bei *Poa humilis* Ehrh. ex Hoffm. Tuexenia 14: 403-414
- Loos, G.H. (1996): Zur Identität von *Carex leersiana* Rauschert, *C. chabertii* F. W. Schultz, *C. polyphylla* Kar. & Kir. und *C. guestfalica* (Boenn. ex Rchb.) Boenn. ex O.F. Lang. Feddes Rep. 107: 61-74
- López González, G. (1994): Nota sobre el género *Anthoxanthum* L. (Gramineae) Anales Jardín Botánico Madrid 51: 309-312
- Lörch, Ph.J. (1890): Die Flora des Hohenzollerns und seiner nächsten Umgebung. - Wiss. Beilage zum Programm d. kgl. Höh. Bürgerschule Hechingen 1890: 68; 1891: 69-118; 1892: 119-166. :
- Lötschert, W. (1964): Die zweinervige Segge im Unterwesterwald. Natur und Museum 94: 361-367
- Lötschert, W. (1964): *Carex binervis* im Unterwesterwald. Jahrbücher Nass. Ver. Naturk. 97: 93-94
- Löve, A. u. D. Löve (1961): Chromosome numbers of Central and West European plant species. Opera Botanica 5: 1-581
- Löve, D. et A. (1975): Nomenclatural Adjustments in some European Monocotyledons Folia Geobot. Phytotax. 10 (3): 271-276
- Löve, D. u. P. Dansereau (1959): Biosystematic studies on *Xanthium*: Taxonomic appraisal and ecological status. Canad. J. Bot. 37: 173-208

- Lövkvist, B. (1962): Chromosome and differentiation studies in Flowering plants of Skåne, South Sweden. Bot. Notiser 115 (3): 261-267
- Luceno, M. u. C. Aedo (1994): Taxonomic revision of the Iberian species of *Carex* L. section *Phacocystis* Dumort. (Cyperaceae). Bot. J. Linn. Soc. 114: 183-214
- Lude, A. (1993): Untersuchungen über die heterokarpen Achänen bei der Gartenringelblume *Calendula officinalis* L. (Asteraceae). Jh. Ges. Naturk. Württ. 148: 111-126
- Ludemann, Th. (1992): Im Zweribach - Vom nacheiszeitlichen Urwald zum "Urwald von morgen". Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 63: 1-268
- Ludemann, Th. (1994): Vegetations- und Landschaftswandel im Schwarzwald unter anthropogenem Einfluß. Ber. Reinh. Tüxen-Ges. 6: 7-39
- Ludwig (1890): *Fritillaria meleagris*. Korresp.bl. Gelehrten- Realschulen Württ. 37: 320-322
- Ludwig, G. u. M. Schnittler (1996): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. Schriftenr. Vegetationsk. 28: 1-744
- Ludwig, W. (1955): Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten III 14. Das sogenannte *Symphytum asperum*. Die Gartenbauwissenschaft 20 (3): 334-335
- Ludwig, W. (1955): *Carex demissa* Hornem., eine verkannte Seggenart aus der Flava-Gruppe. Hess. Flor. Briefe 39: 2-4
- Ludwig, W. (1964): Kritische Anmerkungen zu Lötschert, W.: Die Zweinervige Segge im Unterwesterwald. - Natur und Museum 94: 361-367. Frankfurt a. M. Hess. Flor. Briefe 13: 53-54
- Ludwig, W. (1968): *Aphanes microcarpa*, der "Kleinfrüchtige Ackerfrauenmantel", auch in Hessen. Abh. Ver. Naturk. Kassel 62 (4): 1-2
- Ludwig, W. (1968): Bemerkungen über die Phanerogamenflora des Schwarzwälder Belchens. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 27: 21-25
- Ludwig, W. (1970): Über *Callitriche obtusangula*, eine Wasserstern-Art der südhessischen Flora. Jahresber. d. wetterauischen Ges. f. d. gesamte Naturkde. 121/122: 39-44
- Ludwig, W. (1973): Das südamerikanische *Solanum nitidibaccatum*, ein Neubürger in Hessen. Jahresber. d. wetterauischen Ges. f. d. gesamte Naturkde. 123/124: 67-73
- Ludwig, W. (1982): Über *Dipsacus strigosus* bei Frankfurt a.M. und an anderen Orten Deutschlands sowie in Botanischen Gärten. Hess. Flor. Briefe 31 (2): 25-28
- Ludwig, W. (1985): Über die Zweifelhafte oder Täuschende Borstenhirse *Setaria verticilliformis* Dumort (*S. ambigua* [Guss.] Guss., *S. decipiens* C. Schimper ex Dosch & Scriba, *S. gussonei* Kerguélen) und ihr Vorkommen in Hessen Jber. wetterau. Ges. ges. Naturkunde 136/137: 53-61
- Ludwig, W. (1986): *Galeopsis pubescens* Bess. (Lamiaceae) - eine Pflanze hessischer Dörfer. Hess. Flor. Briefe 35 (3): 35-44
- Ludwig, W. (1987): Über die "Dorfpflanze" *Leonurus cardiaca* L. s. lat. (Lamiaceae) und ihre Vorkommen in Hessen. Jahresber. d. wetterauischen Ges. f. d. gesamte Naturkde. 138-139: 17-29
- Ludwig, W. (1989): Über Kugeldisteln (*Echinops*-Arten) in Hessen. Hess. Flor. Briefe 38: 2-6
- Ludwig, W. (1993): Neuere Funde der Reisquecke (*Leersia oryzoides*) in Hessen. Hess. florist. Briefe 42(4): 57-62
- Ludwig, W. (1994): *Bidens frondosa* var. *anomala* in Hessen. Hess. Flor. Briefe 43 (2): 17-19
- Ludwig, W. (1996): Zu *Setaria adhaerens* (Forrsk.) Chiov. Literaturhinweise anlässlich eines Fundes in Frankfurt a. M. Hess. Flor. Briefe 45 (2): 26-27
- Ludwig, W. u. I. Lenski (1969): Zur Kenntnis der hessischen Flora Jb. nass. Ver. Naturkunde 100: 112-133
- Luetke, N. (1975): Einige Hinweise zur Verbreitung, Systematik und Biologie von *Poa supina* Schrad. Rasen, Turf, Gazon 6(1): 11-13
- Lüönd, B. u. R. Lüönd (1980): Hybridization in *Ajuga* populations. Candollea 35 (1): 87-109
- Lüpping, W. u. C.M. Schröder (1972): Zur Bestimmung unserer *Galeopsis*-Arten im blütenlosen Zustand. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schl.-Holst. 4 (3): 46-48
- Lüth, M. (1990): Die Pflanzengesellschaften des Wurzacher Riedes. - Unveröff. Gutachten für die BNL Tübingen (Hrsg.: Bezirksstelle Natursch. Landschaftspf. Tübingen): 90

- Lüth, Michael (2000): *Rosa abietina* und andere Funde von Wildrosen aus Südbaden Acta Rhodologica 2: 65-74
- Lutz, F. (1884): In: Neue Standorte. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (13): 120-123
- Lutz, F. (1885): Die Mühlau bei Mannheim als Standort seltener Pflanzen. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (19): 164-168
- Lutz, F. (1889): Ergänzende Beiträge zu unserer einheimischen Flora. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (65): 117-121
- Lutz, F. (1910): Zur Mannheimer Adventivflora seit ihrem ersten Auftreten bis jetzt. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 5 (247/248): 365-376
- Mabberley, D.J. (1987): The Plant-Book. A portable dictionary of the higher plants utilizing Cronquist's integrated system of classification of flowering plants 1984 and current botanical literature arranged largely on the principle of editions 1-6 (1986/97-1931) of Willis's d Cambridge Univ. Press dictionary of the flowering plants and ferns: 707
- Machule, M. (1957): Die mitteleuropäischen Thymus-Arten, Formen und Bastarde. Mitt. Thüring. Bot. Ges. I (4): 13-89
- Machule, M. (1959): Thymus alpestris Tausch in Hessen. Hess. Flor. Briefe 8 (88): 3
- Machule, M. (1960): Die mitteleuropäischen Thymus-Arten, Formen und Bastarde. Mitt. Thüring. Bot. Ges. II (1): 176-207
- Machule, M. (1962): Die wichtigsten intraspezifischen Thymus-Sippen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 35: 57-72
- Machule, M. (1975): Bestimmungsschlüssel für die im deutschen Raum vorkommenden Arten der Gattung Thymus L. nach dem System von Jalas und Schmidt. Pollichia 63: 67-71
- Mägdefrau, K. (??): Untersuchungen über die Wasserdampfaufnahme der Pflanzen. Zeitschrift für Botanik 24: 417-450
- Magnin, A. (1904): Notes sur les Thesium du Jura. Arch. Flore jurass. 5 (47-48): 57-61
- Maguire, B. (1943): A Monograph of the Genus Arnica. Brittonia 4: 386-511
- Mahler (1912): Neue Standorte. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6 (267-268): 138
- Mahler, G. (1898): Übersicht über die in der Umgebung von Ulm wildwachsenden Phanerogamen. Nachr. kgl. Gymnas. Ulm Schuljahr 1897-98: 1-39
- Mahler, K. (1952/1953/1956): Über die Verbreitung einiger Pflanzen auf der Ostalb und ihrem Vorland. - Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ 107: 176-190; 108: 74-89, 111: 141-152. :
- Mahler, K. (1953): Die Flora der Goldshöfer Sande. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 22: 62-67
- Maier, U. (1988): Botanische Untersuchungen zur Umwelt- und Wirtschaftsgeschichte der jungsteinzeitlichen Siedlung Ödenahlen im nördlichen Federseemoor. Jh. Ges. Naturk. Württ. 143: 149-176
- Maier, U. (1995): Moorstratigraphische und paläoethnobotanische Untersuchungen in der jungsteinzeitlichen Moorsiedlung Ödenahlen am Federsee. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 46: 143-253
- Maillefer, A. (1946): Etudes du Valeriana officinalis L. et des espèces affines. Mem. soc. vaud. sc. nat. 8/6: 277-340
- Maire, R. (1955): Flore de l'Afrique du Nord. Vol. III : 399
- Majovsky, J. & A. (1981): Biologia 36 (1): 85-88
- Makepeace, W. (1980): Ecological studies of Hieracium pilosella and H. praealtum. Ph.D. thesis, Univ. of Canterbury, New Zealand
- Malkmus, W. (1994): Orchideen. Flora u. Fauna im Landkreis Main-Spessart 1: 116 S.
- Mang , F. (1972): Eine kleine Schlehenkunde. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schl.-Holst. 4 (4): 50-54
- Mang , F.W.C. (1990): Goldnessel-Probleme. Ber. Bot. Ver. Hamburg 11: 100-102, 112

- Mangelsdorf, P. C. (1974): Corn. Its origin, management and improvement.
- Mansfeld, R. (1952): Zur Systematik und Nomenklatur der Hirsen. *Der Züchter* 22: 304-315
- Mansfeld, R. (Hrsg.) (1986): Verzeichnis landwirtschaftlicher und gärtnerischer Kulturpflanzen (ohne Zierpflanzen) in 4 Bänden Akademie-Verlag: 1998
- Maricek, L., L. Poldini u. M. Zupancic (1983): *Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum* ass. nov. in Slowenien und Friaul-Julisch-Venetien. *Razprave Dissertationes XXIV/5*: 261-328
- Markgraf-Dannenberg, I. (1950): Die Gattung *Festuca* in den Bayrischen Alpen. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 28: 195-211
- Markgraf-Dannenberg, I. (1958): Zur *Festuca duvalii*-Frage im mitteleuropäischen Raum. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 32: 83-93
- Marsden-Jones, E.M. and W.B. Turrill (1954): *British Knapweeds: a Study in Synthetic Taxonomy*. Ray Society : 201 S.
- Marstaller, R. (1979): Die Moosgesellschaften der Ordnung *Ctenidietalia mollusci* Hadac & Smarda 1944. 1. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens *Feddes Repertorium* 89: 629-661
- Marstaller, R. (1980): Die Moosgesellschaften des Verbandes *Phascion mitriformis* Waldheim 1947. 7. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens *Feddes Repertorium* 91: 363-387
- Marstaller, R. (1980a): Die Moosgesellschaften des Verbandes *Schistidion apocarpi* Jezek & Vondráček 1962. 6. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens *Feddes Repertorium* 91: 337-361
- Marstaller, R. (1980b): Zur Verbreitung einiger basiphiler Bryophyten im östlichen Thüringen. 2. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens *Hercynia* 17: 117-143
- Marstaller, R. (1982): Die Moosgesellschaften der Ordnung *Racomitrietalia heterostichi* Philippi 1956. 8. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens *Feddes Repertorium* 93: 443-479
- Martens, G. von (1822): Bemerkungen auf einer Reise von Stuttgart nach Ulm. *Corr.-Bl. württ. landw. Ver.* 1: 357-408, 445-480
- Martens, G. von (1822-1828): Über Württembergs Flora. - *Corr.-Bl. württ. landwirtsch. Ver.* 1: 321-332 (1822); 3: 227-254 (1823); 7: 333-341 (1825); 13: 301-324 (1828)
- Martens, G. von (1826): Ueber die württembergische Alp. *Hertha* 6: 59-128
- Martens, G. von (1858): Zuwachs der Vereinssammlungen. IX. Pflanzen. *Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 14: 10-13
- Martens, G. von (1863): Botanische Sammlung. *Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 19: 11-16
- Martens, G. von u. C. A. Kemmler (1865): Flora von Württemberg und Hohenzollern. Osiander: CXIV + 844
- Martens, G. von u. C. A. Kemmler (1872): Flora von Württemberg und Hohenzollern. A. Scheurlen: 844
- Martens, G. von u. C. A. Kemmler (1882): Flora von Württemberg und Hohenzollern, 2 Bde. Gebr. Henninger : 296 u. LXXIII + 413
- Martensen, H. O. u. W. Probst (1990): Farn- und Samenpflanzen in Europa mit Bestimmungsschlüsseln bis zu den Gattungen. G.Fischer: 525
- Martinovsky, J. O. (1965): Die italienischen *Stipa*-Sippen der Sektion *Pennatae* *Webbia* 20(2): 711-736
- Martinovsky, J. O. u. F. Radics (1967): Bemerkungen über die Phytogeographie und Ökologie der in Ungarn vorkommenden *Stipa*-Arten. *Fragmenta Botanica Musei Historico-Naturalis Hungarici* 5/1-4: 23-68
- Marvicka, A. (1992): Liste der Chromosomenzahlen europäischer Orchideen. *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 24(1): 125-140
- Matfield, B. (1972): Experimental synthesis of the allopolyploid *Potentilla anglica* Laich. *Watsonia* 9 (1): 61
- Mathew, B. (1989): A review of *Veratrum* *Plantsman* 11: 35-61
- Mathew, B. (1996): A review of *Allium* sect. *Allium*: 176

- Mattern, H. (1962): Die Algenflora stehender Gewässer der Umgebung von Crailsheim. Teil I. Die Gewässer des Gipskeupers. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 117: 227-284
- Mattern, H. (1962): Heiden und Haine der Keuperhöhen bei Crailsheim: 16
- Mattern, H. (1972): Heiden und Haine der Keuperhöhen bei Crailsheim: 16
- Mattern, H. (1972): Natur- und Landschaftsschutz. - In: Um Stromberg und Mittlere Enz. : 69-79
- Mattern, H. (1980): Das Jagsttal von Crailsheim bis Dözbach. Wanderung durch ein Landschaftsschutzgebiet. Selbstverlag: 207
- Mattern, H. (1983): Die Hülsen der nordöstlichen Schwäbischen Alb - Bestandsaufnahme, Erhaltungsmaßnahmen. I. Albuch und angrenzende Gebiete. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 55/56: 101-166
- Mattern, H. (1987): Die Hülsen der nordöstlichen Schwäbischen Alb - Bestandsaufnahme, Erhaltungsmaßnahmen. II Härtsfeld. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 62: 7-139
- Mattern, H. (1992): Auf Naturschutzfahrten im nördlichen Württemberg (1 und 2). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67: 49-96
- Mattern, H. (1995): Auf Naturschutzfahrten im nördlichen Württemberg (4). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 70: 11-68
- Matzke-Hajek, G. (2001): Taxonomie und Verbreitung von *Rubus fissipetalus* P.J. Müller und *Rubus elegans* P.J. Müller im westlichen Mitteleuropa, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 1: S. 35-45
- Matzke-Hajek, G. (2004): Bestimmungshilfe für die Haselblatt-Brombeeren der Serie *Subcanescentes* H.E. Weber (*Rubus* L., Rosaceae) in Deutschland, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 3: S. 19-32
- Matzke-Hajek, G. & A. Kleinsteuber (1999): Zur *Rubus*-Flora des nördlichen Oberrheingebietes (Baden-Württemberg) *Carolinea* 57: 19-26
- Maus, H. (1888, 1889): Die Faule Waag am Kaiserstuhl. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (60): 79-81
- Maus, H. (1889): Botanische Wanderungen um Alt-Breisach in den Monaten Juli und August. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (60): 77-81
- Maus, H. (1890): Beiträge zur Flora von Karlsruhe. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (73/74): 181-191
- Maus, H. (1891): Beiträge zur Kenntnis unserer badischen Orchideen. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2(85): 281-291
- Maus, H. (1892): Dölls Herbar. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3: 6-10
- Maw, C.C. (1974): A note on *Bromus unioloides* and *B. willdenowii* (Gramineae). *Kew Bull.* 29 (2): 431-434
- May, Th. (1985): Vorkommen, Zustand und Gefährdung der atlantischen Arten *Anagallis tenella* und *Scutellaria minor* in Süddeutschland, unter besonderer Berücksichtigung des Hotzenwaldes. Unveröff. Gutachten für die LfU Bad.-Württ. : 23
- May, Th. (1987): *Anagallis tenella* und *Scutellaria minor* im Hotzenwald - hängen diese Vorkommen mit der Wiesenbewässerung zusammen?. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 14 (2): 303-314
- Mayer, A. (1904): Flora von Tübingen und Umgebung, Schwäbische Alb vom Plettenberg bis zur Teck, Balingen, Hechingen, Reutlingen, Urach, Rottenburg, Herrenberg, Böblingen. F. Pietzker: 313
- Mayer, A. (1910): Die Orchidaceen-Standorte in Württemberg und Hohenzollern. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 66: 401-407
- Mayer, A. (1913): Die Orchideenstandorte in Württemberg und Hohenzollern. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 69: 357-401
- Mayer, A. (1914): *Lathyrus pannonicus* Garcke. Allg. Bot. Z. Syst. 20: 75
- Mayer, A. (1916): Abnormitäten, Varietäten und Bastarde unserer Ophrydeen. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 72: 197-203,4ZTaf.
- Mayer, A. (1924): Orchideen am Hundsrück. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 80: XII
- Mayer, A. (1925): Die Verarmung der Pflanzenwelt der Schwäb. Alb, ihre Ursachen und Abhilfe. *Aus der Heimat* 38: 91-95

- Mayer, A. (1926): Die Flora von Tübingen und Umgebung. Veröff. Württ. Landesamt Denkmalpfl. 3: 122-127
- Mayer, A. (1927): Orchideenausbreitung in Württemberg und Hohenzollern. Allg. Bot. Zeitschr. 33: 39-41
- Mayer, A. (1927): Über das "Dr. FINCKH'sche Herbar". Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 83: LXXVIII
- Mayer, A. (1929, 1930): Exkursionsflora der Universität Tübingen. Mittlere und südliche Alb, württembergischer Schwarzwald, oberes und mittleres Neckargebiet, Schönbuch, Gäu, Schwarzwaldvorland. 519 S.; Tübingen (Tübinger Chronik)
- Mayer, A. (1939): Auf der Jagd nach Orchis Spitzeli. Süddeutsche Apoth.-Zeitung 79(56): 571-572
- Mayer, A. (1950): Exkursionsflora von Südwürttemberg und Hohenzollern mit besonderer Berücksichtigung der Universitätsstadt Tübingen. Wiss. Verlagsgesellschaft: 527
- Mayer, L. (1954): Vorkommen seltener Pflanzen und Tiere im Kreis Waldshut. Mitt. Bad. Landesver.Naturk. Natursch. 6: 140-141
- Mayer, L. (1958): Exkursion am 7.7.1957 ins Hochrheingebiet. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N.F. 7: 255-257
- Mazomeit, J. (1991): *Senecio inaequidens* DC. - nun auch in Baden, im Saarland und in der Pfalz. Flor. Rundbr. 25 (1): 37-39
- Mazomeit, J. (1995): Zur Adventivflora (seit 1850) von Ludwigshafen am Rhein - mit besonderer Berücksichtigung der Einbürgerungsgeschichte der Neophyten Mitt. Pollichia 82: 157-246
- Mazomeit, J. (2000): Bürgert sich *Abutilon theophrasti* Med. im Oberrheingraben ein? Floristische Rundbriefe 34(1): 49-60
- McNeill, J. et al. (1987): American code and later lectotypifications of Linnean generic names dating from 1753: a case study of discrepancies. Taxon 36: 350-401
- McVaugh, R. (1983): Gramineae. - In Anderson, W. R.: Flora Novo-Galiciana, Vol. 14 University of Michigan Press: 436
- Mehl, J. (1984): *Eoorchis miocaenica* nov. gen., nov. sp. aus dem Ober-Miozän von Öhningen, der bisher älteste fossile Orchideen-Fund. Ber. Arbeitskreis Heim. Orch. 1(1): 9-21
- Mehl, J. (1986): Die fossile Dokumentation der Orchideen. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 39(1): 121-133
- Meierott, L. (1991): Neues und Bemerkenswertes zur Flora Unterfrankens (2. Folge). Ber. Bayer. Bot. Ges. 62: 97-105
- Meigen, W. (1902): Gegenwärtiger Stand unserer pflanzengeographischen Durchforschung Badens. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (179/180): 247-264
- Meigen, W. (1904): Neue Standorte. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (200): 418-420
- Meigen, W. (1908): Ein botanischer Pfingstausflug ins Bauland. Mitt. Bad. Bot. Ver. 5: 256-260
- Meigen, W. in A. Kneucker (1903): Pfingstexkursion 1903. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (187/188): 313-321
- Meigen, W. in A. Schlatterer (1920): Neue Standorte. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1 (4): 109-112
- Meili-Frei, E. (1965): Cytogenetik und Cytotaxonomie einheimischer Arten von *Epipactis*, *Listera*, *Neottia* (Orchidaceae). Ber. Schweiz. Bot. Ges. 75: 219-293
- Meisel, K. (1985): Gefährdete Ackerwildkräuter - historisch gesehen. Natur und Landschaft 60: 62-66
- Meisel, K. u. A. von Hübschmann (1976): Veränderungen der Acker- und Grünlandvegetation im nordwestdeutschen Flachland in jüngerer Zeit. Schriftenreihe für Vegetationskunde 10: 109-124
- Meister, J. (1887): Flora von Schaffhausen. Beil. Osterprogramm Gymnasiums Schaffhausen: VII + 202 S. + VIII; Schaffhausen (H. Meier)
- Melderis, A. (1968): *Bromus* (sect. *Ceratochloa*) in Britain. Proc. Bot. Soc. Brit. Isles 7 (3): 392-393

- Melderis, A. (1978): Taxonomic notes on the tribe Triticae (Gramineae), with special reference to the genera *Elymus* L. sensu lato, and *Agropyron* Gaertner sensu lato Botanical Journal of the Linnean Society 76: 169-384
- Melzer, A. (1976): Makrophytische Wasserpflanzen als Indikatoren des Gewässerzustandes oberbayerischer Seen. Diss. Bot. 34: 195
- Melzer, H. (1977): Weitere Beiträge zur Erforschung Kärntens. Carinthia II, 167/87: 263-276
- Melzer, H. (1984): Neues und Kritisches über Kärntner Blütenpflanzen Carinthia II 177/94: 189-203
- Melzer, H. (1986): Bemerkungen zu "Schmeil-Fitschen. Flora von Deutschland und seinen angrenzenden Gebieten". Gött. Flor. Rundbr. 20 (2): 155-162
- Melzer, H. (1988): Über *Eragrostis Frankii* C.A.Meyer ex Steudel, *Polygonum pensylvanicum* L. und weitere Pflanzenfunde in Friaul-Julisch Venetien (Italien) Linz. biol. Beiträge 20 (2): 771-777
- Melzer, H. (1992): Neues zur Flora von Steiermark, XXXIII Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 122: 123-133
- Melzer, H. (1993): Über *Amaranthus bouchonii* Aellen, Bouchons Fuchsschwanz, *Agrostis castellana* Boissier & Reuter, das Kastilische Straußgras, und andere bemerkenswerte Blütenpflanzen Kärntens Carinthia II 183/103: 715-722
- Memminger (1825): Pflanzenreich. J.B.Cotta Beschreibung des Oberamts Münsingen : 52-54
- Memminger, J.D.G. (1823): Beschreibung von Württemberg, nebst einer Uebersicht seiner Geschichte. Cotta
- Memminger, J.D.G. (1828): Pflanzenreich. - In: Beschreibung des Oberamts Rottenburg: 60-62; Stuttgart, Tübingen (Cotta)
- Memminger, J.D.G. von (1841): Das Pflanzenreich. In: Beschreibung von Württemberg. Cotta : 278-300
- Mennema, J. (1989): A taxonomic revision of *Lamium* (Lamiaceae). Leiden Botanical Series 11: 206 S.
- Mennema, J. et al. (Hrsg.) (1985): Atlas van de Nederlandse. Flora, 2. Band Bohn, Scheltema & Holkema : 349
- Menz, E. (1950): Unsere Orchideen. Festschrift 600jährigem Stadtjubiläum Neresheim : 81-90
- Merkel, J. u. E. Walter (1981): Bestandssituation und Gefährdung der Schachblume (*Fritillaria meleagris* L.) in Oberfranken. Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth 17: 47-77
- Merxmüller, H. (1955): Beiträge zur Taxonomie der Compositen. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 67: 23-24
- Merxmüller, H. (1957): Compositen-Studien VI, *Cichorium calvum* Schultz-Bip. ex Asch. in Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. 143 (1867). Mitt. Bot. Staatssammlungen München 2 (17/18): 317-318
- Merxmüller, H. (1973): Neue Übersicht der im rechtsrheinischen Bayern einheimischen Farne und Blütenpflanzen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 44: 221-238
- Merxmüller, H. (1975): Diploide Hieracien. Anal. Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 189-196
- Merxmüller, H. (1977): Neue Übersicht der im rechtsrheinischen Bayern einheimischen Farne und Blütenpflanzen. Teil IV. Ber. Bayer. Bot. Ges. 48: 5-26
- Merxmüller, H. (1980): Neue Übersicht der im rechtsrheinischen Bayern einheimischen Farne und Blütenpflanzen. Teil V. Ber. Bayer. Bot. Ges. 51: 5-29
- Merxmüller, H. u. J. Grau (1963): Chromosomenzahlen aus der Gattung *Myosotis* L. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 76: 23-29
- Merxmüller, H. u. W. Lippert (1978): Studien an bayerischen Sumpf-Löwenzähnen. Hoppea 37: 273-290
- Merxmüller, H. u. W. Sauer (1972): *Pulmonaria* L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press : 100-102
- Messikomer, J. (1883): Archäologische Mitteilungen. Antiqua 1: 7
- Meszmer, F. S. (1995): Flora von Mosbach. Verbreitungsatlas gefährdeter, geschützter sowie weiterer charakteristischer Gefäßpflanzen und thermophiler Edflechten: 160

- Meszmer, F.S. (1989): Verbreitung ausgewählter Feuchtgebiets- und Auwaldpflanzen. In: Historischer Atlas der Region Mosbach.
- Meszmer, F.S. (1992 (erschienen 1993)): Flora von Mosbach. Mosbacher Jahreshft 1993, 3: 19-65
- Mettin, D. u. P. Hanelt (1964): Cytosystematische Untersuchungen in der Artengruppe um *Vicia sativa* L. I. Kulturpflanze 12: 163-225
- Metzger, G. (1950): Eine neue Orchidee aus Württemberg (Bastard oder neue Art bzw. Rasse?). Veröff. Landestelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 24: 523-525
- Meusel, H. (1993): Arealanalysen an *Carlina biebersteinii* Bernh. ex Hornem.- Versuch einer ökogeographischen Sippencharakteristik. Flora 188: 73-84
- Meusel, H. (Hrsg.) (1978): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Text und Karten, Band II.- XI+418, (5)+259-421
- Meusel, H. u. A. Kästner (1972): Übersicht zur systematischen Gliederung der Gattung *Carlina*. Feddes Repertorium 83: 213-232
- Meusel, H. u. A. Kästner (1990): Lebensgeschichte der Gold- und Silberdisteln. Monographie der mediterran-mitteuropäischen Compositen-Gattung *Carlina* 1. Springer : 294 S. u. XXXII Taf.
- Meusel, H. u. E.J. Jäger (1972): Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. Bd. III. G. Fischer : Textteil 1-333. Kartenteil 422-688
- Meusel, H. u. H. D. Knapp (1983): Ökogeographische Analyse der Areale einiger mediterraner und mediterran-mitteuropäischer Orchideen. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 36: 80-94
- Meusel, H. u. H. Ohle (1966): Zur Taxonomie und Cytologie der Gattung *Calendula*. Österr. Bot. Zeitschr. 113: 191-210
- Meusel, H. u. K. Werner (1962): Über die Gliederung von *Carlina acaulis* L. und *Carlina vulgaris* L. Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturw. Reihe 11: 279-292
- Meusel, H., E. Jäger u. E. Weinert (1964, 1978): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. 2 Bände. G. Fischer
- Meusel, H., E. Jäger u. E. Weinert (1965): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Textband 583 S., Kartenband 258 S.; G. Fischer
- Mez et al. (1883): siehe Baumgartner et al.
- Mez, C. (1883): Zur Flora des Isteiner Klotz. Deutsche Bot. Monatsschr. 1: 91
- Michael, P. W. (1983): Taxonomy and distribution of *Echinochloa* species with special reference to their occurrence as weeds of rice. - In I.R.R.I.: Weed Control in Rice. Proc. Conf. 1981 : 291-306
- Milbradt, J. (1976): Nordische Einstrahlungen in der Flora und Vegetation von Nordbayern, dargestellt an ausgewählten Beispielen. Hoppea 35: 131-210
- Mill, R. R. (1982): *Leonurus* L. - In: Flora of Turkey, Vol. 7 (Hrsg.: Davis, P.H.): 152-153; Univ. Press
- Miotk, P. (1983): Das Eriskircher Ried. - Ein Führer durch das bedeutendste Naturschutzgebiet am nördlichen Bodenseeufer. Führer Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 6: 188
- Mitnacht, A. (1980): Segetalflora der Gemarkung Mehrstetten 1975-78 im Vergleich zu 1948/49. Diss. Univ. Hohenheim: 105
- Moeslund, B., B. Lojtnant, H. Mathiesen, L. Mathiesen, A. Pedersen, N. Thyssen u. J.C. Schou (1990): Danske vandplanter. Miljøent 2: 192
- Mogie, M. u. A.J. Richards (1983): Satellite chromosomes, systematics and phylogeny in *Taraxacum*. Plant Syst. Evol. 141: 219-229
- Mohl, H. von (1845): Über die Flora von Württemberg. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 1: 69-109
- Mohl, H. von (1867): Pflanzen. In: Beschreibung des Oberamts Tübingen : 34-41
- Mohr, G. (1898): Flora der Umgebung von Lahr, Teil 1 und 2. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (153-156): 17-50, 33-50
- Monschau-Dudenhausen, K. (1982): Wasserpflanzen als Belastungsindikatoren in Fließgewässern. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 28: 118 S.

- Montebaur, J. (1929): Ein süddeutsches Herbarium in der Vatikanischen Bibliothek. Arch. Gesch. Naturwiss. 11 N.F. 2: 271-276
- Moor, M. (1936): Zur Soziologie der Isoetetalia. Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz 20: 148 S.
- Moor, M. (1940): Pflanzensoziologische Beobachtungen in den Wäldern des Chasseralgebietes (Berner und Neuenburger Jura). Ber. Schweiz. Bot. Ges. 50: 545-566
- Moor, M. (1962): Einführung in die Vegetationskunde der Umgebung Basels. : 464 S.
- Moor, M. (1967): X *Sorbus latifolia* (Lam.) Pers. in der Nordwestschweiz, Fundorte und soziologische Bindung. Bauhinia 3 (2): 117-128
- Moore, D.M., R. de Soo, D.A. Webb (1980): Orchidaceae. In: T. Tutin et al.: Flora Europaea 5: 325-350
- Moraldo, B. (1986): Il genere *Stipa* L. (Gramineae in Italia. Webbia 40/2: 203-278
- Morton, J.K. (1956): Studies on *Ononis* in Britain. 1. Hybridity in the Durham Coast Colonies of *Ononis*. Watsonia 3: 307-316
- Mrkvicka, A. Ch. (1992): Liste der Chromosomenzahlen europäischer Orchideen. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 24(1): 125-140
- Mrkvicka, A. Ch. (1994): Anatomie und Morphologie der Samen heimischer Orchideenarten. Journ. Eur. Orch. 26(2): 168-314
- Müller, H. (1868): Beobachtungen an westfälischen Orchideen. Verh. Naturhist. Ver. Preußen Rheinl. Westfal. 25: 1-62
- Müller, H. (1873): Die Befruchtung der Blüten durch Insekten und die gegenseitige Anpassung beider. W.Engelmann: 478
- Müller, H. (1962): Pollenanalytische Untersuchung eines Quartärprofils durch die spät- und nacheiszeitlichen Ablagerungen des Schleinsees (Südwestdeutschland). Geol. Jb. 79: 493-526
- Müller, I. (1988): Vergleichende blütenökologische Untersuchungen an der Orchidengattung *Epipactis*. Mit.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 20(4): 701-803
- Müller, K. (1901): Über die Vegetation des Feldseekessels am Feldberge, speciell über dessen Moose. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (176/177): 217-234
- Müller, K. (1909): Untersuchung über die Wasseraufnahme durch Moose und verschiedene andere Pflanzen und Pflanzenteile. Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik 46: 587-598
- Müller, K. (1925-29): Beiträge zur Flora der Ulmer und Blaubeurer Alb. Mitt. Ver. Naturwiss. Math. Ulm 19: 51-59
- Müller, K. (1931): Beiträge zur Kenntnis der Habichtskräuter Württembergs. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 20: 7-36 ("1929-30")
- Müller, K. (1935): Beitrag zur Kenntnis unserer heimischen Farn- und Blütenpflanzen. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 21: 63-77
- Müller, K. (1935): Beiträge zur Kenntnis der eingeschleppten Pflanzen Württembergs. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 21: 29-62
- Müller, K. (1935): Über das Vorkommen von Kalkpflanzen im Urgesteingebiet des Schwarzwaldes. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 3: 129-139, 164-176
- Müller, K. (1935-1942): Beitrag zur Kenntnis unserer heimischen Farn- und Blütenpflanzen. I. Nachtrag. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 22: 43-68
- Müller, K. (1937): Pflanzen-Fundberichte aus Baden. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 3 (23/24): 349-354
- Müller, K. (1938): Weiterer Beitrag zum Kalkpflanzen-Vorkommen im Schwarzwald. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 3: 389-396
- Müller, K. (1942): Beiträge zur Kenntnis unserer heimischen Farn- und Blütenpflanzen. 1. Nachtrag, abgeschlossen im Herbst 1940. Mitt. Ver. Naturwiss. Mathem. Ulm 22: 43-68
- Müller, K. (1942): Über eine interessante Kalkpflanzengesellschaft im Wehratal im südlichen Schwarzwald. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N. F. 4: 329-331
- Müller, K. (1942-1950): Beiträge zur Kenntnis der eingeschleppten Pflanzen Württembergs. 1. Nachtrag. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 23: 86-116

- Müller, K. (1948): Die Vegetationsverhältnisse im Feldberggebiet. In K. Müller (Hrsg.): Der Feldberg im Schwarzwald: 211-362. L. Bielefeld
- Müller, K. (1949): Die Stromtalpflanzen der oberen Donau. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 97-101: LXII-LXIV
- Müller, K. (1950): Beiträge zur Kenntnis der eingeschleppten Pflanzen Württembergs. II. Nachtrag. Mitt. Ver. Naturw. Mathematik Ulm/Donau 23: 86-116
- Müller, K. (1954): Die Kleinblättrige Stendelwurz (*Epipactis microphylla*) am oberen Neckar. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 109: 132-133
- Müller, K. (1957): Ulmer Flora. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 25: 1-229
- Müller, K. (1961): Zur Flora der östlichen Altmoränen- und Deckenschotterlandschaft Oberschwabens (bearbeitet von G. W. Brielmaier) Mitt. Ver. Nat. Math. Ulm 26: 107-116
- Müller, K. (1969): Die Pflanzenwelt des Schmiecher Sees. In: J. Hölzinger, K. Müller u. K. Schilhansl: Die Pflanzen- und Vogelwelt des Schmiecher Sees. Jahresh. Ges. Naturk. Württ. 124: 172-178
- Müller, K. (Hrsg.) (1948): Der Feldberg im Schwarzwald. L. Bielfelds Verlag KG : (7)+586 S., 66
- Müller, K. u. G.W. Brielmaier (1965): Nachtrag 1964 zur Ulmer Flora. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 27: 25-72
- Müller, N. u. H. Sukopp (1993): Synanthrope Ausbreitung und Vergesellschaftung des Fadenförmigen Ehrenpreises - *Veronica filiformis* Smith. Tuexenia 13: 399-413
- Müller, P., A. Gössmann u. W. Wucherpennig (1992): Verbreitungsübersicht der heimischen Orchideen in Bayern. Ber. Arbeitskreis Heim. Orch., Beih. 3: 138
- Müller, R. (1989, 1990): Verbreitung der Spitzkletten an der Elbe. Mitt. Nat. u. Umweltschutz Hamburg 4/5: 86-99
- Müller, R. (1990): *Taraxacum nordstedtii* Dahlst. neu im Landkreis Harburg. Ber. Bot. Ver. Hamburg 11: 66-69
- Müller, Th. (1958): Die Pflanzenwelt des Favoriteparks. Veröff. Natursch. Landschaftspf. Bad.-Württ. 26: 47-87
- Müller, Th. (1961): Einige für Südwestdeutschland neue Pflanzengesellschaften. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 20: 15-21
- Müller, Th. (1961): Ergebnisse pflanzensoziologischer Untersuchungen in Südwestdeutschland. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 20 (2): 111-122
- Müller, Th. (1961): Zwei für das Naturschutzgebiet Untereck neue Pflanzen. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 29: 7-14
- Müller, Th. (1962): Die Fluthahnenfußgesellschaften unserer Fließgewässer. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 30: 152-163
- Müller, Th. (1962): Die Saumgesellschaften der Klasse *Trifolio-Geranietea sanguinei*. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 9: 95-140
- Müller, Th. (1964): Ergebnisse von Windschutzversuchen in Baden-Württemberg. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 32: 71-126
- Müller, Th. (1966): Die Wald-, Gebüsch-, Saum-, Trocken- und Halbtrockenrasengesellschaften des Spitzbergs. Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 3: 278-475
- Müller, Th. (1966): Vegetationskundliche Beobachtungen im Naturschutzgebiet Hohentwiel. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 34: 14-61
- Müller, Th. (1967): Die geographische Gliederung des *Galio-Carpinetums* und des *Stellario-Carpinetums* in Südwestdeutschland. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 26: 47-65
- Müller, Th. (1968): Die Waldvegetation im Naturschutzgebiet Schenkenwald. Veröff. Landesst. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 36: 55-64
- Müller, Th. (1969): Die Vegetation im Naturschutzgebiet Zweribach. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 37: 81-101
- Müller, Th. (1973): *Leontodon hyoseroides* Welwitsch und seine Vergesellschaftung auf der Schwäbischen Alb. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 41: 7-23

- Müller, Th. (1974): Gebüschgesellschaften im Taubergießengebiet. In: Das Taubergießengebiet, eine Rheinauenlandschaft. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 7: 400-421
- Müller, Th. (1974): Zur Kenntnis einiger Pioniergesellschaften im Taubergießengebiet. - In: Das Taubergießengebiet, eine Rheinauenlandschaft. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 7: 284-305
- Müller, Th. (1975): Natürliche Fichtengesellschaften der Schwäbischen Alb. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 34: 233-249
- Müller, Th. (1975): Natürliche Fichtengesellschaften der Schwäbischen Alb Beitr. Naturkd. Forsch. Südwestdeutschland 34: 233-249
- Müller, Th. (1977): Buchenwälder mit Fiederzahnwurz (*Dentaria heptaphyllos*) in Südwestdeutschland. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. 19/20: 383-392
- Müller, Th. (1977): *Trifolio-Geranietea sanguinei* Th. Müller 61. In: Oberdorfer, E. (Hrsg.; 1978): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil II: 249-298; Stuttgart, New York (G. Fischer)
- Müller, Th. (1978): In: Oberdorfer, E. (1978): Süddeutsche Pflanzengesellschaften.
- Müller, Th. (1978): Klasse: *Agropyretea intermedii-repentis* (Oberd. et al. 67) Th. Müller et Görs 69. - In: Oberdorfer, E. (1983, Hg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften III, 278-299
- Müller, Th. (1980): Der Scheidenkronwicken-Föhrenwald (*Coronillo-Pinetum*) und der Geißklee-Föhrenwald (*Cytiso-Pinetum*) auf der Schwäbischen Alb. *Phytocoenologia* 7: 392-412
- Müller, Th. (1981a): Klasse: *Chenopodietea* Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 52. - In: Oberdorfer, E. (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften III, 48-114
- Müller, Th. (1981b): Klasse *Artemisietea vulgaris* Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 50. - In: Oberdorfer, E. (Hrsg., 1983): Süddeutsche Pflanzengesellschaften III, 135-277
- Müller, Th. (1982): Weißdorne und Rosen auf der Münsinger Alb. In: Münsingen. Geschichte, Landschaft, Kultur -Festschrift zum Jubiläum des württ. Landeseinigungsvertrages von 1482: 640-658; Sigmaringen
- Müller, Th. (1983): In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil III. G. Fischer : 135-212
- Müller, Th. (1985): Das *Ribeso sylvestris-Fraxinetum* Lemée 1937 corr. Pass. 1958 in Südwestdeutschland. *Tuexenia* 5: 395-412
- Müller, Th. (1985): Die Vegetation. In: Ökologische Untersuchungen an der ausgebauten unteren Murr, Landkreis Ludwigsburg 1977-1982, 1: 113-194
- Müller, Th. u. D. Kast (1969): Die geschützten Pflanzen Deutschlands. : 348
- Müller, Th. u. S. Görs (1958): Zur Kenntnis der Auenwaldgesellschaften im württembergischen Oberland. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 17 (2): 88-165
- Müller, Th. u. S. Görs (1960): Pflanzengesellschaften stehender Gewässer in Baden-Württemberg. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 19 (1): 60-100
- Müller, Th. u. S. Görs (1969): Halbruderale Trocken- und Halbtrockenrasen. *Vegetatio* 18: 203-221
- Müller, Th. u. S. Görs (1974): Flora der Farn- und Blütenpflanzen des Taubergießengebietes. In: Das Taubergießengebiet. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 7: 209-284
- Müller-Schneider, P. (1957): Ist der Gegenblättrige Steinbrech am Bodensee ausgestorben? (*Saxifraga oppositifolia* L. var. *amphibia* Sündermann). Schweiz. Naturschutz 23: 14-15
- Müller-Schneider, P. (1983): Verbreitungsbiologie (Diasporologie) der Blütenpflanzen. Veröff. Geobot. Inst. Rübel 61
- Müller-Stoll, W.R. (1935/1936): Ökologische Untersuchungen an Xerothermpflanzen des Kraichgaus. *Zeitschrift für Botanik* 29: 161-253
- Mullin, J.M. (1988a): *Poa compressa* - a case of mistaken identity. *B.S.B.I. News* 49: 48
- Mullin, J.M. (1988b): *Poa compressa* L. In: Rich, Rich u. Perring
- Mürdel, H. (1926): *Florula Regenbacensis*. Verzeichnis der in der Pfarrei Unterregenbach und Umgebung wild wachsenden Pflanzen. Manuskript (STU)
- Murmann-Kristen, L. (1987): Das Vegetationsmosaik im Nordschwarzwälder Waldgebiet. *J. CramerDiss. Bot.* 104: 290

- Naegeli, O. (1917): Über die Verbreitung von *Carex ericetorum* Poll. in der Schweiz. Ber. Zür. Bot. Ges. 13: 1-17
- Naegeli, O. (1933): Das Bodenseegebiet als Ausstrahlung wärmeliebender Pflanzen. Mitt. Thurg. Naturf. Ges. 29: 66-95
- Nägele, G. (1894): Einige Bemerkungen über *Nigritella angustifolia* Rich. und *Mimulus luteus* L. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3(120): 183-186
- Nägeli, C. von u. A. Peter (1885): Die Hieracien Mitteleuropas. Monographische Bearbeitung der Piloselloides. Oldenbourg
- Nägeli, C. von u. A. Peter (1886-1889): Die Hieracien Mitteleuropas. 2. Band. Monographische Bearbeitung der Archieracien. 1. Heft: 1-99 (1886); 2. Heft: 100-240 (1886); 3. Heft: 241-340 (1889). Oldenbourg
- Nägeli, O. (1916): Württembergische Ophrydeen der Apifera-Gruppe und Vergleich mit schweizerischen. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 72: 204-209
- Naylor, R. L. (1972): *Alopecurus myosuroides* Huds. (*A. agrestis* L.) J. Ecol. 60: 611-622
- Nebel, M. (1984): Die Verbreitung der Roggengerste (*Hordeum secalinum*) in Baden-Württemberg. Jh. Ges. Naturk. Württ. 139: 61-66
- Nebel, M. (1986): Vegetationskundliche Untersuchungen in Hohenlohe. Diss. Bot. 97: 253
- Nebel, M. (1990): Zur Verbreitung und Ökologie von *Tortula ruraliformis* (Besch.) Ingh. und *Pleurochaete squarrosa* (Brid.) Lindb. in Südwestdeutschland. Jh. Ges. Naturk. Württ. 145: 163-176
- Negri, V. u. C.A. Cenci (1988): Morphological characterization of natural populations of *Onobrychis viciifolia* (Leguminosae) from Central Italy. Willdenowia 17: 19-31
- Nelmes, E. (1947): Two critical groups of British sedges. Rep. Bot. Soc. Exch. Club Br. Isl. 13: 95-105
- Nelmes, E. (1959): De Caricibus Britannicis notae, IX. Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. V. A. Komarov 19: 74-78
- Nepomnaschtschaja, O.A. (1987): Sistemaroda *Adoxa* (Adoxaceae). Bot. Zurn. 17 (1): 87-91.
- Neu, F. (1973): Über den Moosbewuchs an Mauern im westfälischen Münsterland Herzogia 3 (1): 31-36
- Neuberger, J. (1885): Pflanzenstandorte in der Baar und Umgebung. Schriften Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 5: 15-24
- Neuberger, J. (1889): Bemerkungen zur Flora Heidelbergs. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (60): 81-84
- Neuberger, J. (1896): Zwei Orchideenbastarde. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3: 369-373
- Neuberger, J. (1898): Flora von Freiburg im Breisgau (Südl. Schwarzwald, Rheinebene, Kaiserstuhl). Herder: 266
- Neuberger, J. (1900): Neue Pflanzen und neue Standorte aus dem Freiburger Florengebiet. Mitt. Bad. Bot. Ver. 173/174: 199-200
- Neuberger, J. (1912): Flora von Freiburg im Breisgau. 3. u. 4. Aufl; XXIV + 319 S.; Freiburg i. Br. (Herder). :
- Neuberger, J. (1914, 1925): Schulflora von Baden. 3.-4. Aufl. und 7.-8. Aufl. Herdersche Verlagshandlung
- Neuberger, J., G. Zimmermann u. W. Zimmermann (1911): Neue Standorte. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6 (261-262): 95-96
- Neue Standorte (1882-1885, 1903): Mitt. bad. bot. Ver. (Mitt. bot. Ver. Kreis Freiburg Land Baden) 1:12-16, 25-27 (1882); 74-76, 85-92 (1883); 105-108, 120-123, 153-154 (1884); 208-209 (1885); 4: 335-336 (1903)
- Neumann, A. (1952): Vorläufiger Bestimmungsschlüssel für *Carex*-Arten im blütenlosen Zustande. Mitt. Flor.-soz. Arb.gem. N. F. 3: 44-77
- Neumann, R. (1905): Übersicht über die Badischen Orchidaceen. Mit. Bad. Bot. Ver. 5(201-204): 1-26

- Neumann, R. (1906): Beiträge zur Kenntnis der Badischen Orchidaceen. Mit. Bad. Bot. Ver. 5(208-209): 53-62
- Neumann, R. (1907): Neue und bemerkenswerte Standorte. Mitt. Bad. Bot. Ver. 5: 162-163
- Neumann, R. (1908): Weitere Beiträge zur Kenntnis der badischen Orchidaceen. Mit. Bad. Bot. Ver. 5(224): 177-186
- Neumayr, L. (1971): Moosgesellschaften der südöstlichen Frankenalb und des Vorderen Bayrischen Waldes Hoppea 29 (1/2): 364
- Nezadal, W. (1975): Ackerunkrautgesellschaften Nordostbayerns. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 34: 17-149
- Nickl-Navratil, Hilde (1960): Mooskleingesellschaften der Städte Nova Hedwigia 2: 425-462
- Nicolson, D.H. (1992): Proposals to conserve or reject. Taxon 41: 552-583
- Nicolson, D.H. (1994): Report of the General Committee: 6 Taxon 43: 279-281
- Nieschalk, A. u. Ch. Nieschalk (1968): Orobanche libanotidis Ruprecht (=Orobanche bartlingii Grisebach) in Hessen. Hess. Flor. Briefe 17: 35-42
- Nieschalk, A. u. Ch. Nieschalk (1974): Die Felsen-Traubenkirsche, Padus avium Mill. subsp. petraeum (Tausch) Pawl., am Meißner (Nordhessen). Philippia 2 (3): 147-153
- Nieschalk, A. u. Ch. Nieschalk (1974): Mitteilungen zur Verbreitung von Orobanche bartlingii Grisebach (=Orobanche libanotidis Ruprecht, O.alsatica Kirschleger var. libanotidis (Ruprecht) Beck) in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. Erforsch. Heim. Fl. 45: 71-74
- Nieschalk, A. u. Ch. Nieschalk (1975-1981): Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens. - I: Philippia 2 (5): 299-316 (1975); II: Philippia 3 (5): 389-407 (1978); III: Philippia 4 (3): 213-233 (1980); IV: Philippia 4 (5): 388-413 (1981)
- Nieschalk, A. u. Ch. Nieschalk (1978): Einige Mitteilungen zur Verbreitung der Gattung Thymus L. in Nordhessen. Hess. Flor. Briefe 27 (3): 35-40
- Nieschalk, Ch. (1986): Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens. V. Philippia 5 (4): 318-345
- Nieschalk, Ch. (1989): Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens. VI. Philippia 6 (2): 155-199
- Niklfeld, H. (1971): Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. Taxon 20: 545-571
- Nilson, Ö. (1967): Rosa L. In: Drawings of Scandinavian plants. Lund.Bot. Notiser 120: 1-8, 137-143, 249-254, 393-408
- Nilsson, L. A. (1979): The pollination ecology of Herminium monorchis (Orchidaceae). Bot. Notiser 132(4): 537-549
- Nilsson, L. A. (1980): The pollination ecology of Dactylorhiza sambucina (Orchidaceae). Bot. Notiser 133(3): 367-385
- Nilsson, L. A. (1983): Mimesis of bellflower (Campanula) by the red helleborine orchid (Cephalanthera rubra). Nature 305: 799-800
- Nilsson, L. A. (1983): Processes of isolation and introgressive interplay between Platanthera bifolia (L.)Rich. and P. chlorantha (Custer)Reichenb.(Orchidaceae). Bot. Journ. Linnean Soc. 87: 325-350
- Nilsson, L. A. (1984): Anthecology of Orchis morio (Orchidaceae) at its outpost in the North. Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal. 5: 167-180
- Nilsson, Ö. (1985): Carex. In: Davies, P.H. (ed.): Flora of Turkey Vol. 9 : 73-158
- Nilsson, Ö. u. H. Hjelmqvist (1967): Studies on nutlet structure of South Scandinavian species of Carex. Bot. Notiser 129: 460-485
- Noack, M. (1983): Untersuchungen an außeralpinen Sippen von Galium Sekt. Lepto-Galium in Bayern. Diplomarbeit Univ. München
- Nold, R. u. A. Kraiss (1956): Naturkundliche Exkursion zur Heidburg am 10.7.1955. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N. F. 6: 392-399
- Nordenskjöld, H. (1946): Cyto-genetic Studies in the Genus Phleum Acta Agric. Suec. 1 (1): 1-138

- Nordenstam, B. (1977): Senecioneae and Liabeae - systematic review. In: Heywood, V.H., Harborne, J.B. and B.L. Turner (eds.): The Biology and Chemistry of the Compositae. Academic Press Vol. II: 799-830
- Nordenstam, B. (1978): Taxonomic studies in the tribe Senecioneae (Compositae). Opera Botanica 44: 1-84
- Nothdurft, H. (1950): Erster Nachweis der Zweifelhafte Flockenblume in der Rhein-Mainischen Flora. Natur und Volk 80: 238-240
- Nowack, R. (1993): Bemerkungen zum Vorkommen von *Elytrigia pontica* (Podp.) Holub in der Vorderpfalz Floristische Rundbriefe 27(1): 22-24
- Nowack, R. (1993): Massenvorkommen von *Dittrichia graveolens* (L.) Greut. (Klebriger Alant) an Autobahnen Süddeutschlands. Flor. Rundbr. 27 (1): 38-40
- Nowak, W. (1979): Die Immergrüne Trespe (*Bromus unioloides* H.B.K.) - eine Futterpflanze. Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Nat. Reihe 28: 107-114
- Nuber, H.-U. (1984): Römischer Kultbezirk in Sontheim/Brenz, Kreis Heidenheim. Arch. Ausgr. 1983: 163-166
- Nyman, C.F. (1889): Conspectus florae europaeae. Suppl 2 (1) : 1-224
- Oberdorfer, E. (1927): *Cotoneaster integerrima* Med. am Feldberg im Schwarzwald. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 2: 125-126
- Oberdorfer, E. (1934): Die Felsspaltflora des südlichen Schwarzwaldes. Neufunde von den Kaiserwachteln (Höllental). Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 3 (1/2): 1-14
- Oberdorfer, E. (1934): Die höhere Pflanzenwelt am Schluchsee. Ber. Naturf. Ges. Freiburg 34: 213-247
- Oberdorfer, E. (1934): Zur Geschichte der Wälder und Sümpfe zwischen Mannheim und Karlsruhe. - Ver. f. Naturk. Mannheim, 100/101 (Festschrift zur Jahrhundertfeier): 99-124
- Oberdorfer, E. (1936): Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften und Pflanzenformen des Oberrheingebietes. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 1: 49-88
- Oberdorfer, E. (1936): Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Oberrheingebietes bei Bruchsal. Beitr. zur Naturdenkmalpfl. (Hrsg.: Schoenichen, W.) XVI,2: 125
- Oberdorfer, E. (1936): Floristische und pflanzensoziologische Notizen vom Bruhrain (Umgebung von Bruchsal). Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 3: 204-210, 245-252
- Oberdorfer, E. (1937): Betreff: Botanisches Gutachten über den zum Naturschutzgebiet vorgeschlagenen Königsee (adressiert an das Ministerium des Kultus u. Unterrichtes, einzusehen bei der BNL Karlsruhe). - Unveröff. Gutachten, 2
- Oberdorfer, E. (1937): Die Bedeutung des Naturschutzgebiets am Michelsberg (Kaiserberg) bei Untergrombach. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 2: 124-142
- Oberdorfer, E. (1938): Ein Beitrag zur Vegetationskunde des Nordschwarzwaldes. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 3: 149-270
- Oberdorfer, E. (1938): Pflanzensoziologische Beobachtungen und floristische Neufunde im Oberrheingebiet. Verh. Naturhist.-Med. Ver. Heidelberg, N.F. 18: 183-201
- Oberdorfer, E. (1943/49 erschienen 1949): Die Pflanzengesellschaften der Wutachschlucht. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 8: 22-60
- Oberdorfer, E. (1949, 1962, 1970): Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süddeutschland und die angrenzenden Gebiete. 1. Aufl. 1949, 411 S.; 2. Aufl. 1962, 987 S.; 3. Aufl. 1970, 987 S. E. Ulmer
- Oberdorfer, E. (1949/50): Zur Frage der natürlichen Waldgesellschaften auf der Ostabdachung des Südschwarzwaldes. Allg. Forst- u. Jagdztg. 121: 16-19, 50-60
- Oberdorfer, E. (1950): Beitrag zur Vegetationskunde des Allgäus. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 9: 29-98
- Oberdorfer, E. (1951): Botanische Neufunde aus dem badischen Oberrheingebiet nach Aufzeichnungen. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 5 (4/5): 186-191

- Oberdorfer, E. (1952): Die Vegetationsgliederung des Kraichgaus. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 11: 12-36
- Oberdorfer, E. (1952): Die Wiesen des Oberrheingebiets. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 11: 75-88
- Oberdorfer, E. (1953): Der europäische Auenwald - Eine soziologische Studie über die Gesellschaften des Alneto-Ulmion. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 12 (1): 12-70
- Oberdorfer, E. (1956): Botanische Neufunde aus Baden (und angrenzenden Gebieten). Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 6 (4): 278-284
- Oberdorfer, E. (1956): Die Vergesellschaftung der Eissegge (*Carex frigida* All.) in alpinen Rieselfluren des Schwarzwaldes, der Alpen und der Pyrenäen. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 24: 452-465
- Oberdorfer, E. (1957): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. G. Fischer : 564 S.
- Oberdorfer, E. (1969): Zur Soziologie der Cymbalario-Parietarietea, am Beispiel der Mauerteppich-Gesellschaften Italiens. Vegetatio 17: 208-213
- Oberdorfer, E. (1971): Die Pflanzenwelt des Wutachgebietes. In: Die Wutach - Naturkundliche Monographie einer Flußlandschaft. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 6: 261-321
- Oberdorfer, E. (1971): Zur Syntaxonomie der Trittpflanzengesellschaften. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 30 (2): 95-112
- Oberdorfer, E. (1973): Die Gliederung der Epilobietea angustifolii-Gesellschaften am Beispiel süddeutscher Vegetationsaufnahmen. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 19: 235-253
- Oberdorfer, E. (1973): Thymian, Quendel, Thymus L. Gött. Flor. Rundbr. 7 (4): 67-69
- Oberdorfer, E. (1974): Galium lucidum am Schwarzwaldrand des südlichen Oberrheingebietes. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 33: 107-111
- Oberdorfer, E. (1979, 1983, 1990, 1994): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 4.-7. Aufl. 7. Aufl. 1050 S. E. Ulmer :
- Oberdorfer, E. (1980): Klasse: Secalietea Br.-Bl. 52. - In: Oberdorfer, E. (Hrsg., 1983): Süddeutsche Pflanzengesellschaften III, 15-47
- Oberdorfer, E. (1982): Die hochmontanen Wälder und subalpinen Gebüsch. - In: Der Feldberg im Schwarzwald. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 12: 317-365
- Oberdorfer, E. (1982): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte Feldberg 1:25 000. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 27: 1-83
- Oberdorfer, E. (1985): *Tellima grandiflora* (Pursh) Douglas ex Lindley (Saxifragaceae), ein nordwestamerikanischer Neuankömmling im Südschwarzwald. Gött. Flor. Rundbr. 19 (1): 26-28
- Oberdorfer, E. (Hrsg.) (1977, 1978, 1983, 1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil I-IV. G. Fischer
- Oberdorfer, E. u. D. Korneck (1976): Klasse: Festuco-Brometea BR.-BL. et TX. 43. - In: Oberdorfer, E. (Hrsg., 1978): Süddeutsche Pflanzengesellschaften II, 86-180
- Oberdorfer, E. u. D. Korneck (1978): In: Oberdorfer, E. (1978): Süddeutsche Pflanzengesellschaften
- Oberdorfer, E. u. Th. Müller (1984): Zur Synsystematik artenreicher Buchenwälder, insbesondere im präalpinen Nordsaum der Alpen. Phytocoenologia 12 (4): 539-562
- Oberdorfer, E., J. Bartsch, J. Hruby, H. Wolf, W. Drescher u. H. Heine (1951): Botanische Neufunde aus dem badischen Oberrheingebiet nach Aufzeichnungen. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 5 (4/5): 186-191
- Obermeyer, A. (1962): A Revision of the South African Species of *Anthericum*, *Chlorophytum* and *Trachyandra*. Bothalia 7: 669-767
- Oberprieler, Ch. (1994): Die *Senecio nemorensis*-Gruppe (Compositae, Senecioneae) in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 64: 7-54
- Ockendon, D.J. (1976): *Valeriana*. - In: Flora Europaea, Vol. 4 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). University Press : 52-55
- Oesau, A. (1972): Zur Soziologie von *Limosella aquatica*. Beitr. Biol. Pflanzen 48: 371-397

- Oesau, A. (1973): Ackerunkrautgesellschaften im Pfälzer Wald. Mitt. Pollichia 20: 5-32
- Oesau, A. (1976): Zur Biologie von *Alopecurus aequalis* L. (Gramineae) Mz. Naturw. Arch. 14: 151-181
- Oesau, A. (1978): Zwei übersehene Ackerunkräuter, die Hundskamillen *Anthemis austriaca* und *Anthemis ruthenica* im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz. Mitt. Pollichia 66: 96-102
- Oesau, A. (1981): Untersuchungen über *Veronica triloba* (Opiz) Kerner in Rheinhessen. Tuexenia 1: 39-44
- Oesau, A. (1987): Ackerrandstreifenprogramm des Pflanzenschutzdienstes. Ergebnisse 1984-1986. Landespflanzenschutzdienst Rheinland-Pfalz 1987
- Oettingen, H. von (1925): Kritische Betrachtungen über die Systematik der Gattung *Poa* L., besonders über die Sektion *Pachyneurae* Aschers. Feddes Repert. 21: 306-316,368
- Ogden, J. (1974): The reproductive strategies of higher plants. 2. The reproductive strategies of *Tussilago farfara*. J. Ecol. 62: 291-324
- Ohle, H. (1974): Beiträge zur Taxonomie der Gattung *Calendula*. Feddes Repertorium 85: 245-283
- Olesen, M. (1974): Identification of seeds of *Phleum pratense* L. and *P. bertolonii* DC. (*P. nodosum* L.) on the basis of morphological differences. Seed Sci. Techn. 2: 194-197
- Ollgaard, H. (1983): Hamata, a New Section of *Taraxacum*. Plant Syst. Evol. 141: 199-217
- Oltmanns, F. (1922): Das Pflanzenleben des Schwarzwaldes. 1. Aufl., Band 1, I-XVI, 1-708 S.; Band 2, 17 Karten, 200 Bilder; Freiburg i. Br. (Badischer Schwarzwaldverein)
- Oltmanns, F. (1927): Das Pflanzenleben des Schwarzwaldes: 690
- Oosterveld, P. (1984): Plantesoorten als indicator, toegelicht aan het voorbeeld van de paardebloem. - In: Best, E. P. H. u. J. Haeck: Ecologische indicatoren voor de Kwaliteitsbeoordeling van lucht, water, bodem en ecosystemen: 208-217:
- Opiz, P.M. (1852): Seznam rostlin kveteny České V. Kommissi u Fr. Riunace : 216
- Opravit, E. (1983): *Xanthium strumarium* L.- ein europäischer Archäophyt? Flora 173: 71-79
- Oskarsson, I. (1966): Synopsis and Revision of Islandic *Hieracia*. Soc. Scient. Islandica 37: 1-142, 59 pl.
- Osswald, L. (1908): *Hieracium aurantiacum* L. im Harz. Mitt. Thüring. Bot. Ver. N.F. 23: 30-33
- Ostenfeld, C.H. (1917): Nogle bemaerkninger om vore enaarige *Sonchus*-Arter. Bot. Tidsskr. 34: 343-346
- Ostermann, R. u. W. Hochhardt (1993): Vegetation, Standort und Nutzung der Edelkastanien-Niederwälder von Ödsbach/Oberkirch (Mittlerer Schwarzwald). Mitt. Bad. Bot. Ver. n.F. 15(3/4): 533-567
- Otte, A. (1989): Kalkfels-Balmengesellschaft von *Lappula squarrosa* (Retz.) Dum. (*Lappulo-Asperugetum procumbentis* Br.-Bl. 1919 im Tal der Schwarzen Laaber (Lkrs. Regensburg). Ber. Bayer. Bot. Ges. 60: 183-189
- Otte, A. u. Th. Ludwig (1987): Dörfliche Ruderalpflanzengesellschaften-Gesellschaften im Stadtgebiet von Ingolstadt. Ber. Bayer. Bot. Ges. 58: 179-227
- Page, S.E. u. J.O. Rieley (1985): The ecology and distribution of *Carex chordorrhiza* L. f. *Watsonia* 15: 253-259
- Pak, J.-H u. K. Bremer (1995): Phylogeny and Reclassification of the Genus *Lapsana* (Asteraceae, Lactuceae). Taxon 44: 13-21
- Palisot de Beauvois, A. M. F. J. (1812): Essai d'une nouvelle Agrostographie. : 182 S.
- Pallas, J. (1994): *Bromus carinatus* Hooker & Arnott in Deutschland. Floristische Rundbriefe 27(2): 84-89
- Palmgren, A. (1959): *Carex*-gruppe *Fulvellae* Fr. Flora Fennica 2: 1-165
- Papp, C. (1932): Monographie der europäischen Arten der Gattung *Melica* L. Bot. Jahrb. Syst. 65/2-3: 275-348

- Parent, G.H. (1974): Etudes ecologiques et chorologiques sur la flora lorraine. I. - *Carex praecox* Schreb. en Lorraine orientale et remarques sur *Carex curvata* Knaf (Cyperaceae). Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 44: 173-184
- Passarge (1956): Die Pflanzengesellschaften der Wiesenlandschaft des Lübbenauer Spreewaldes Feddes Repertorium, Beihefte 135: 194-251
- Passarge, H. (1981): Gartenunkraut-Gesellschaften. Tuexenia 1: 63-79
- Passarge, H. (1993): Lianenschleier-, fluviatile und ruderale Staudengesellschaften in den planaren Elb- und Oderauen. Tuexenia 13: 343-371
- Patzak, A. (1958): Revision der Gattung *Ballota* Section *Ballota*. Ann. Naturh. Mus. Wien 62: 57-86
- Patzak, A. (1972): *Ballota* L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press : 149-151
- Patzke, E. & G. Brown (1990): *Festuca aquisgranensis* sp. nova, ein neuer Vertreter der Kollektivart *Festuca ovina* L. (Poaceae). Decheniana 143: 194-195
- Patzke, E. (1960): Die Sippen der *Festuca ovina* L. im nördlichen Rheingebiet. Decheniana 113 (2): 275-283
- Patzke, E. (1961): Vorschlag zur Gliederung der *Festuca ovina* L.-Gruppe in Mitteleuropa. Österr. Bot. Z. 108 (4-5): 505-507
- Patzke, E. (1969): Anleitung zur Bestimmung der beiden hessischen Blauschwengel *Festuca pallens* Hostu. *F. stricta* Host ssp. *duvalii* (St.-Yves) Patzke. Hess. Florist. Briefe 18 (207): 15-18
- Patzke, E. u. D. Podlech (1960): Die Verbreitung der *Carex flava*-Gruppe im nördlichen Oberrheingebiet. Decheniana 113: 265-273
- Paul, H. (1923): Pilze, Flechten, Moose und Gefäßpflanzen. In: Ammann et al.: Das Naturschutzgebiet am Federsee in Württemberg. Beitr. Naturdenkmalpflege 8: 115-159
- Paul, H. (1937): Beiträge zur Kenntnis des Formenkreises des Besenriedes *Molinia caerulea* Moench in Bayern. Ber. Bayer. Botan. Ges. 22: 15-22
- Paul, H. (1941): Botanische Kurzbeiträge. IV. 1. *Sphagnum balticum* Russow. 2. *Equisetum maximum* Lam. 3. *Carex hartmani* A. Cajander. 4. *Galeopsis pubescens* Bess. Ber. Bayer. Bot. Ges. 25: 112-119
- Paul, H. (1947): Die Höhenverbreitung der in den Bayerischen Alpen bisher beobachteten Gefäßpflanzen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 27: 144-174
- Paulus, F., L. Sautermeister u. J. Scheuerle (1875): In: Lindemann, H. (1875): Beschr. des Oberamts Rottweil. : 47-54
- Paulus, H.F. (1996): Zur Bestäubungsbiologie und Artberechtigung von *Ophrys tetraloniae* Teschner 1987 und *Ophrys elatior* Gumprecht ex H. F. Paulus spec. nov. (Orchidaceae). Ber. Arbeitskreis Heim. Orch. 13(2): 4-13
- Pawlowski, B. (1972): *Symphytum* L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press : 103-105
- Payne, R.M. (1987): *Artemisia biennis* Willd. B.S.B.I. News 45: 25
- Peintinger, M. (1990): Bestandsschwankungen bei seltenen Pflanzenarten in Pfeifengraswiesen des westlichen Bodenseegebietes. Carolea 48: 69-84
- Peintinger, M. (1988): Die Vegetation des Litzelsees bei Markelfingen (Westliches Bodenseegebiet). Carolea 46: 17-22
- Peintinger, M. (1993): Zur Verbreitung und Soziologie der Hain-Kresse, *Arabis nemorensis* (Hoffm.) Koch, im westlichen Bodenseegebiet. Jh. Ges. Naturk. Württ. 148: 127-134
- Peintinger, M. (1994): Verbreitung, Rückgang und Soziologie von *Gratiola officinalis* L. am Bodensee. Carolea 52: 25-34
- Peintinger, M. (1995): Die Strandschmielengesellschaft (*Deschampsietum rhenanae* OBERDORFER 1957) im westlichen Bodenseegebiet - ein Vergleich von Vegetationsaufnahmen 1959 und 1993. Carolea 53: 67-74
- Peintinger, M., S. Schuster u. H.-P. Fischer (1990): Halbinsel Mettnau (Bodensee) - Veränderungen der Vegetation und Vogelbestände in acht Jahrzehnten. Naturschutzforum 3/4: 17-37

- Peitz, E. (1972): Zusammenstellung aller bisher bekannten Bastarde der in Deutschland verbreiteten Orchideen. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 167-200
- Perleb, C.J. (1829): *Catalogus Plantarum Horti Botanici Friburgensis*
- Perner, H. (1996): Die Gattung *Cypripedium* L. in einer stammesgeschichtlichen Übersicht. Jour. Eur. Orch. 28(1): 84-107
- Perring, F.H. (1976): *Arctium* L. - In: *Flora Europaea*, Vol. 4 (Hrsg: Tutin, T.G. et al.). University Press :
- Perring, F.H. u. S.M. Walters (1962): *Atlas of the British Flora* : XXIV + 432
- Perry, L.M. (1933): A revision of the north american species of *Verbena*. Ann. Missouri Bot. Gard. 20
- Persoon, C. M. (1805): *Synopsis Plantarum seu Enchiridium Botanicum* Vol. 1.: 546
- Peskova, G.A. u. L.I. Malyshev (1990): *Cyperaceae*. In: *Flora Sibiriae* 3: 1-276
- Pesmen, H. (1972): *Potentilla*. In: Davies, P.H. (ed.): *Flora of Turkey* Univ. Press 4: 41-68
- Petersen, A. (1973): Die Sauergräser. Schlüssel zu ihrer Bestimmung im blütenlosen Zustand. 84
- Petersen, A. (1981): Die Gräser als Kulturpflanzen und Unkräuter auf Wiese, Weide und Acker Akademie-Verlag: 280
- Petit, D.P. (1988): Le genre *Echinops* L. (Compositae, Cardueae). 1. Position phylétique et interprétation de l'incapitulescence. *Candollea* 43: 467-481
- Petitpierre (1806): *Correspondenz Nachrichten*. Bot. Zeitung 5: 207-208, 239-240, 254-256
- Petrák, F. (1912): Der Formenkreis des *Cirsium eriophorum* (L.) Scop. in Europa. *Bibliotheca Bot.* 78: 98
- Pfadenhauer, J. u. G. Erz (1980): Standort und Gesellschaftsanbindung von *Ophrys apifera* und *Ophrys holosericea* im Naturschutzgebiet. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 51/2: 411-424
- Pfadenhauer, J., F. Lütke-Twenhöven, B. Quinger u. S. Tewes (1985): Trittbelastung an Seen und Weihern im östlichen Landkreis Ravensburg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 45: 1-80
- Pfister, C. (1985 a): Klimageschichte der Schweiz 1525-1860. Das Klima der Schweiz von 1525-1860 und seine Bedeutung in der Geschichte von Bevölkerung und Landwirtschaft. *Academica Helvetica* 6: 184+163
- Pfister, C. (1985 b): Veränderungen der Sommerwitterung im südlichen Mitteleuropa von 1270-1400 als Auftakt zum Gletscherhochstand der Neuzeit. *Geographica Helvetica* 40,4: 186-195
- Philbrick, C.T. u. G.J. Anderson (1992): *Pollination Biology in the Callitrichaceae*. *Systematic Botany* 17: 282-292
- Philippi, G. (1960): Zur Gliederung der Pfeifengraswiesen im südlichen und mittleren Oberrheingebiet. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland* 19: 137-187
- Philippi, G. (1961): Botanische Neufunde aus dem badischen Oberrheingebiet (und angrenzenden Gebieten). *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F.* 8 (1): 173-186
- Philippi, G. (1962): Soziologische und experimentell-ökologische Untersuchungen an Moosen saurer Erdraine, des morschen Holzes und des Rohhumus. - Inaug. Diss.
- Philippi, G. (1963): Zur Gliederung der Flachmoorgesellschaften des Südschwarzwaldes und der Hochvogesen. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland* 22 (2): 113-135
- Philippi, G. (1963): Zur Soziologie von *Anagallis tenella*, *Scutellaria minor* und *Wahlenbergia hederacea* im südlichen und mittleren Schwarzwald. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F.* 8 (3): 477-484
- Philippi, G. (1966): Sporenkeimung und Protonemawachstum von Moosen verschiedener Standorte in Abhängigkeit vom pH-Wert *Flora*, Abt. B 156: 319-349
- Philippi, G. (1968): Zur Kenntnis der Zwergbinsengesellschaften (Ordnung der *Cyperetalia fuscii*) des Oberrheingebietes. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 36: 65-130
- Philippi, G. (1969): Besiedlung alter Ziegeleigruben der Rheinniederung zwischen Speyer und Mannheim. *Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F.* 14: 238-254

- Philippi, G. (1969): Laichkraut- und Wasserlinsengesellschaften des Oberrheingebietes zwischen Straßburg und Mannheim. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 37: 102-172
- Philippi, G. (1969): Zur Verbreitung und Soziologie einiger Arten von Zwergbinsen- und Strandlingsgesellschaften im badischen Oberrheingebiet. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 10: 139-172
- Philippi, G. (1970): Botanische Neufunde aus Südbaden. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 10: 331-348
- Philippi, G. (1970): Calamagrostis phragmitoides Hartm., das Purpurreitgras, im Schwarzwald und in den Vogesen. Beitr. Naturkundl. Forschung Südwestdeutschl. 29/2: 107-110
- Philippi, G. (1970): Die Kiefernwälder der Schwetzingen Hardt (nordbadische Oberrheinebene). Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 38: 46-92
- Philippi, G. (1970): Vorkommen basi- und neutrophiler Pflanzen im Buntsandsteingebiet des Nordschwarzwalds. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 29: 17-23
- Philippi, G. (1971): Beiträge zur Flora der nordbadischen Rheinebene und der angrenzenden Gebiete. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 30 (1): 9-47
- Philippi, G. (1971): Sandfluren, Steppenrasen und Saumgesellschaften der Schwetzingen Hardt (nordbadische Rheinebene) unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzgebiete bei Sandhausen. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 39: 67-130
- Philippi, G. (1971): Zur Kenntnis einiger Ruderalgesellschaften der nordbadischen Flugsandgebiete um Mannheim und Schwetzingen. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 30 (2): 113-131
- Philippi, G. (1972): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25 000 Blatt 6617 Schwetzingen. Landesvermessungsamt Bad.-Württ. : 60
- Philippi, G. (1973): Sandfluren und Brachen kalkarmer Flugsande des mittleren Oberrheingebietes. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 41: 24-62
- Philippi, G. (1973): Zur Kenntnis einiger Röhrichtgesellschaften des Oberrheingebietes. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 32: 53-95
- Philippi, G. (1977): Vegetationskundliche Beobachtungen an Weihern des Stromberggebietes um Maulbronn. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 44/45: 9-50
- Philippi, G. (1978): Die Vegetation des Altrheingebiets bei Rußheim. In: Der Rußheimer Altrhein, eine nordbadische Auenlandschaft. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 10: 103-267
- Philippi, G. (1978): Veränderungen der Wasser- und Uferflora im badischen Oberrheingebiet. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 11: 99-134
- Philippi, G. (1980): Die Vegetation des Altrheins Bodensee bei Karlsruhe. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 39: 71-114
- Philippi, G. (1981): Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Tauber-Main-Gebietes. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 53/54: 541-591
- Philippi, G. (1982): Erlenreiche Waldgesellschaften im Kraichgau und ihre Kontaktgesellschaften. Carolea 40: 15-48
- Philippi, G. (1982): Ruderalgesellschaften des Main-Tauber-Gebietes. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 55/56: 415-478
- Philippi, G. (1983): Erläuterungen zur Karte der potentiell natürlichen Vegetation des unteren Taubergebietes (Hrsg.: Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe): 83
- Philippi, G. (1983): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25 000 6323 Tauberbischofsheim-West. Landesvermessungsamt Bad. Württ.: 199
- Philippi, G. (1983): Ruderalgesellschaften des Tauber-Main-Gebietes. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 55/56 (1982): 415-478
- Philippi, G. (1984): Bidentetea-Gesellschaften aus dem südlichen und mittleren Oberrheingebiet. Tuexenia 4: 49-79
- Philippi, G. (1984): Trockenrasen, Sandfluren und thermophile Saumgesellschaften des Tauber-Main-Gebietes. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58: 533-618

- Philippi, G. (1988): Zum Vorkommen des Ufer-Reitgrases (*Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. f.) Koel.) im mittleren Oberrheingebiet. *Carolinea* 46: 138-139
- Philippi, G. (1989): Die Flache Quellbinse (*Blysmus compressus*) im Südschwarzwald und angrenzenden Gebieten. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 64/65: 129-143
- Philippi, G. (1989): Die Pflanzengesellschaften des Belchen-Gebietes im Schwarzwald. - In: Der Belchen. Geschichtlich-naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 13: 747-890
- Philippi, G. (1993): *Thymelaea passerina* im Taubergebiet. *Carolinea* 51: 108-111
- Philippi, G. (1994): Halmfruchtgesellschaften des Unteren Taubergebietes (Hrsg.: Lotter, A.F., u. B. Ammann). *Diss. Bot. (Festschrift Gerhard Lang)* 234: 33-57
- Philippi, G. (1995): Hainbuchen-Wälder feuchter Standorte im mittleren Oberrheingebiet. Beiträge zur naturk. Forschung in Südwestdeutschland, *carolinea* 53: 165-174
- Philippi, G. u. V. Wirth (1970): Botanische Neufunde aus Südbaden. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F.* 10 (2): 331-348
- Phillips, S. (1995): Poaceae (Gramineae). *Flora of Ethiopia and Eritrea*, Vol. 7. Eds.: Hedberg, I. and S. Edwards: 420
- Piening, U. (1982): Botanische Untersuchungen an verkohlten Pflanzenresten aus Nordwürttemberg (Neolithikum bis römische Zeit). *Fundber. Bad.-Württ.* 7: 239-271
- Piening, U. (1983): Verkohlte Pflanzenreste der Frühlatènezeit von Lauffen am Neckar Kr. Heilbronn. *Fundber. Bad.-Württ.* 8: 47-54
- Piening, U. (1986): Verkohlte Nutz- und Wildpflanzenreste aus Großsachsenheim, Gem. Sachsenheim, Kreis Ludwigsburg. *Fundber. Bad.-Württ.* 11: 177-190
- Piening, U. (1988): Kultur- und Wildpflanzenreste aus Gruben der Urnenfelder- und Frühlatènezeit von Stuttgart-Mühlhausen. *Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ.* 31: 269-280
- Piening, U. (1989): Pflanzenreste aus der bandkeramischen Siedlung von Bietigheim-Bissingen, Kreis Ludwigsburg. *Fundber. Bad.-Württ.* 14: 119-140
- Pietsch, W. (1977): Beiträge zur Soziologie und Ökologie der europäischen Littorelletea- und Utricularietea-Gesellschaften. *Feddes Repertorium* 88 (3): 141-245
- Pignatti, S. (1982): *Flora d'Italia*. 3 Bde. Edagricole
- Pignatti, S. (1982): *Utricularia*. - In: *Flora d'Italia*, volume secundo. Edagricole : 626-627
- Pignatti, S. u. J. Lebeau (1982): *Mentha*. - In: *Flora d'Italia*, volume secundo. Edagricole : 494-499
- Pilger, R. (1954): Das System der Gramineae unter Ausschluß der Bambusoideae. *Bot. Jahrb. Syst.* 76/3: 281-384
- Pilger, R. (1956): Gramineae II. In Engler, A. und K. Prantl (Hrsg.): Die natürlichen Pflanzenfamilien, Band 14d. Duncker u. Humblot : 1-168
- Pils, G. (1980): Systematik, Verbreitung und Karyologie der *Festuca violacea*-Gruppe (Poaceae) im Ostalpenraum. *Pl. Syst. Evol.* 136 (1-2): 73-124
- Pils, G. (1984): Systematik, Karyologie und Verbreitung der *Festuca valesiaca*-Gruppe (Poaceae) in Österreich und Südtirol *Phyton* 24: 35-77
- Pinto-Escobar, P. (1985): Nota sobre *Bromus willdenowii* Kunth. *Caldasia* 14 (67): 185-191
- Platzer, H. (1962): Untersuchungen über die phänotypische und karyotypische Variabilität der europäischen Unkrauthirsens aus den Gattungen *Setaria*, *Digitaria* und *Echinochloa*. *Z. Pflanzenzüchtung* 47: 330-368
- Plieninger W. (2001): Ein Fund von *Eleocharis engelmannii* Streudel bei Heilbronn *Ber. bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschlands* 1: 47-63
- Plieninger, W. & J. Milbradt (2000): Exkursion des Arbeitskreises "Heimische Wildrosen" im Neckarland vom 6.8.-8.8.1999 *Acta Rhodologica* 2: 91-102
- Plieninger, W. (1992): Einige bemerkenswerte floristische Funde in Baden-Württemberg. *Flor. Rundbr.* 26 (1): 11-20
- Plieninger, W. (2001): Ein Fund von *Eleocharis engelmannii* Steudel bei Heilbronn, *Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland*, Band 1: S. 47-52

- Plocek, A. (1976): New varieties of *Alchemilla monticola* (Rosaceae) and the taxonomic issue involved. *Candollea* 31: 95-105
- Ploeg, D.T.E. van der (1988): Een afwijkende vorm van *Lotus corniculatus* L. in wegbermen, in het bijzonder in de Lauwerszeepolder. *Gorteria* 14: 137-140
- Podlech, D. (1982): Neue Aspekte zur Evolution und Gliederung der Gattung *Astragalus* L. *Mitt. Bot. Staatssammlungen München* 18: 359-378
- Podlech, D. (1986): In: *Flora Iranica, Compositae VI - Anthemideae No. 158 Akademische Druck- u. Verlagsanstalt*: 234
- Podlech, D. u. E. Patzke (1960): Bestimmungsschlüssel für die Arten der *Carex flava*-Gruppe in Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 33: 106
- Poelt, J. (1970): *Dipsacus pilosus* und sein verkannter Doppelgänger *Dipsacus strigosus* in Südbayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 42: 203-206
- Poeverlein, H. (1907): Beiträge zur Kenntnis der bayrischen *Veronica*-Arten. II. *Veronica aquatica Bernhardi* in der bayerischen Pfalz. *Mitt. Bayer. Bot. Ges.* 2 (3): 37-38
- Poeverlein, H. (1908): *Flora exsiccata Rhenana*. *Allg. Bot. Z. Syst.* 7/8 (Beilage): 1-16
- Poeverlein, H. (1912): *Senecio vernalis* in Süddeutschland. *Allg. Bot. Z. Syst.* 18: 123-125
- Poeverlein, H. (1913/14): Die *Utricularien* Süddeutschlands. - *Allg. Bot. Z. Syst.* 19/29: Seiten: 3-5, 33-35, 145-150, 161-167, 182-184, 9-10, 36-40, 49-54. :
- Poiret, J.L.M. (1808): *Encyclopedie méthodique. Botanique. Vol. 8*: 1-879.
- Polatschek, A. (1966): Cytotaxonomische Beiträge zur Flora der Ostalpenländer, II. *Österr. Bot. Zeitschr.* 113: 101-147
- Polhill, R.M. u. M. Sousa (1981): *Robinieae* (Benth.) Hutch. In: Polhill, R.M. u. P.H. Raven (eds.): *Advances in Legume Systematics*: 283-288; Kew (Royal Botanic Gardens).
- Polhill, R.M. u. P.H. Raven (eds.; 1981): *Advances in Legume systematics*. 2 Bände, 1049 S.; Kew (Royal Botanic Gardens). :
- Pollich, J.A. (1776-1777): *Historia plantarum in Palatinatu electorali sponte nascentium incepta. Secundum systema sexuale digesta*. 3 Bände; 454 + 664 + 320 S.; Mannheim (C. F. Schwan).
- Porsch, O. (1903): Die österreichischen *Galeopsis*-Arten der Untergattung *Tetrahit* Reichb. *Abh. K. K. Zool.-Botan. Ges. Wien* 2 (2): 125
- Portal, R. (1995): *Bromus de France* Selbstverlag: 111
- Poschlod, P. (1996): Population biology and dynamics of a rare short-lived pond mud plant, *Carex bohemica* Schreber. *Verh. ges. Ökol.* 25: 321-337
- Poschlod, P. u. H. Muhle (1985): Beobachtungen zur Vegetations- und Bodenentwicklung in Kalksteinbrüchen der Schwäbischen Alb. *Münst. Geogr. Arb.* 20: 199-212
- Pott (1980): Die Wasser- und Sumpfvvegetation eutropher Gewässer in der westfälischen Bucht *Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde zu Münster Westf.* 42(2): 156 S.
- Pott, R. (1995): *Die Pflanzengesellschaften Deutschlands*. E.Ulmer: 622
- Pott, R. u. I. Hüppe (1991): Die Hudelandschaften Nordwestdeutschlands *Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde* 35 (1/2): 313
- Potzal, E. (1951): Anatomisch-systematische Untersuchungen an den Gattungen *Arrhenatherum* und *Helictotrichon*. *Bot. Jahrb. Syst.* 75: 321-332
- Prach, K. u. P.M. Wade (1992): Population characteristics of expansive perennial herbs. *Preslia* 64: 45-51
- Praeger, L.R. (1932): *An account of the Sempervivum group*. 265 S.; London (Reprint 1967; Lehre). :
- Prager, L. u. H. u. R. Schuwerk (1985): Zur Verbreitung der *Leucanthemum*-Arten im Altmühljura und den benachbarten Gebieten. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 56: 231-233
- Prager, L. u. H. u. R. Schuwerk (1987): Die Verbreitung von *Ranunculus nemorosus* DC., *Ranunculus serpens* Schrank und *Ranunculus polyanthemophyllus* W. Koch et H. Hess in der südlichen Frankenalb und angrenzenden Gebieten. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 58: 239-241

- Prantl, K. (1880): Exkursionsflora für das Großherzogthum Baden (begr. von M. Seubert). E. Ulmer : VIII+376
- Prat, H. (1960): Revue d'Agrostologie. Vers une classification naturelle des Graminées. Bull. Soc. Bot. France 107: 32-79
- Preuss, M. (1885): Beiträge zur Flora von Stühlingen. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (24/25): 225-230
- Probst, J. (1887): Zur Kenntnis der in Oberschwaben wildwachsenden Rosen. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 43: 142-175
- Probst, R. (1904): Im Zickzack von Stühlingen über den Randen zum Zollhaus. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (191/192): 345-360
- Probst, R. (1949): Verzeichnis der Gefäßkryptogamen und Phareogamen des Kantons Solothurn und der angrenzenden Gebiete: 587
- Probst, R. (1949): Wolladventivflora Mitteleuropas: 193
- Przywara, L. (1983): Further karyological studies on the series *Palustres* M. Pop. of the genus *Myosotis* L. from Poland. Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. 25: 85-101
- Pühler, D. (1990): Die botanischen Makroreste der römischen Zivilsiedlung in Walheim am Neckar. Diplomarbeit Univ. Hohenheim.
- Pusch, J. (1989): Die Sommerwurzarten des Kreises. Arten: 44
- Pusch, J. u. K.-J. Barthel (1992): Über Merkmale und Verbreitung der Gattung *Orobanche* L. in den östlichen Bundesländern Deutschlands. Gleditschia 20 (1): 33-56
- Pykälä, J. u. H. Toivonen (1984): Taxonomy of the *Carex flava* complex (Cyperaceae) in Finland. Nord. J. Bot. 14: 173-191
- Quasdorf, I. (1976): Kommt *Ribes spicatum* Robson in der DDR vor? Gleditschia 4: 219-221
- Quentin, P. (1993): Synopsis des Orchidées Européennes. Cahiers Soc. Franc. d'Orchidophile 1: 1-128
- Quézel, P. et S. Santa (1962): Nouvelle Flore d'Algérie. Bd. I.: 565
- Quézel, P. u. S. Santa (1963): Nouvelle Flore de l'Algérie et des régions désertiques méridionales. II. : 1170
- Quinger, B. (1987): Zur Wiederentdeckung von *Calamagrostis stricta* (Timm) Koeler in Bayern Ber. Bayer. Bot. Ges. 58: 7-22
- Raabe, E.-W. (1979): Zur Kenntnis der Utricularien in Schleswig-Holstein. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schl.-Holst. 11 (2): 21-37
- Raabe, E.-W. (1980): Übersicht über die Taxa der Gattung *Mentha* in Schleswig-Holstein und Hamburg. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schl.-Holst. 12 (2): 21-39
- Raabe, U. (1981): Goldsternvorkommen auf Friedhöfen des östlichen Münsterlandes. Göttinger Florist. Rundbriefe 15(4): 72-82
- Raabe, U. (1983): Ackergoldstern (*Gagea villosa* (MB.) Duby) und Wiesengoldstern (*Gagea pratensis* (Pers.) Dum.) auf Friedhöfen des Münsterlandes. Göttinger Florist. Rundbriefe 16(3/4): 100-102
- Raabe, U. (1993): Das Traubige Habichtskraut (*Hieracium racemosum* W. & K. ex WILLD.) am Schloß Dyck bei Mönchengladbach. Natur am Niederrhein N.F. 7 (2): 22-24
- Raabe, U. u. D. Brandes (1988): Flora und Vegetation der Dörfer im nördlichen Burgenland. Phytocoenologia 16: 225-258
- Raamsdonk, L.W.D., van (1986): Biosystematic studies on the *umbellatum-angustifolium* complex of the genus *Ornithogalum* (Liliaceae). II. Genome characterization and evolution. Nord. J. Bot. 6: 525-544
- Raamsdonk, L.W.D., van u. J. Heringa (1987): Biosystematic studies on the *umbellatum-angustifolium* complex of the genus *Ornithogalum* (Liliaceae). III. Morphological analysis. Nord. J. Bot. 7: 631-637

- Rabenhorst, L. (1846): Vorläufige, ergänzende und berichtende Notizen zu meiner Flora Lusitanica mit Berücksichtigung der Nachbarfloren Botanisches Centralblatt für Deutschland 1824/12: 237-249
- Radkowitzsch, A. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (84-93). Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 78-79
- Radkowitzsch, A. (2003): *Chenopodium urbicum* L. – ein Wiederfund in der Nördlichen Oberrhein-Niederung bei Mannheim, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 2: S. 87-91
- Radkowitzsch, A. (2003): *Cymbalaria pallida* und *Trachystemon orientalis*: zwei bemerkenswerte Adventivarten im Naturraum Schwarzwald-Randplatten, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 2: S. 117-119
- Randig, W. (1992): Zum Vorkommen von *Melittis melissophyllum* an seiner Verbreitungsgrenze in NW-Deutschland. Flor. Rundbr. 26 (2): 86-90
- Rasbach, H. et al. (1999): Die Verbreitung von *Trichomanes speciosum* Willd. (Pteridophyta) in Südwestdeutschland und in den Vogesen *Carolinaea* 57: 27-42
- Rastetter, V. (1966): Beitrag zur Phanerogamen- und Gefäß-Kryptogamen-Flora des Haut-Rhin. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 9 (1): 151-237
- Rastetter, V. (1986): *Allium flavum* L. am Kaisestuhl (Baden). Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 14/1: 41-42
- Rastetter, V. (1986): *Allium senescens* L. und *Ononis natrix* L., zwei für das Oberelsass neue Blütenpflanzen. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 14 (1): 37-40
- Rastetter, V. (1993): Floristische Langzeitbeobachtungen zu einigen seltenen Pflanzen im Oberelsaß. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 15 (3/4): 587-609
- Rattay-Prade, R. (1988): Die Vegetation auf Strassenbegleitstreifen in verschiedenen Naturräumen Südbadens - ihre Bewertung für den Naturschutz und ihre Bedeutung für ein Biotopverbundsystem. Diss. Bot. 114: 1-228 + Anhg.
- Räuber, A. (1889): Die Pfingstexkursion des Badischen botanischen Vereins am Kaiserstuhl. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (63): 101-106
- Räuber, A. (1890): Eine kleine Pfingst-Exkursion an den Kaiserstuhl. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (80): 239-242
- Räuber, A. (1891): Der Ausflug des botanischen Vereins auf den Feldberg. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (83): 265-268
- Rauneker, H. (1953): Das Herzzweiblatt, Jüngsteinwanderer auf der Schwäb. Alb. Aus der Heimat 61: 155-157
- Rauneker, H. (1984): Ulmer Flora. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 33: I-VII, 1-280
- Rauschert, S. (1960): Studien über die Systematik und Verbreitung der thüringischen Sippen der *Festuca ovina* L. s. lat. Feddes Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 63 (3): 251-283
- Rauschert, S. (1963): Die Arten von *Melica* sect. *Beckeria* (Bernh.) Asch. in Mitteldeutschland. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 76: 235-243
- Rauschert, S. (1966): Zur Nomenklatur der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, Nachtrag. Feddes Repertorium 73: 224-225
- Rauschert, S. (1969): Zur Nomenklatur der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands (II). Feddes Repertorium 79: 405-421
- Rauschert, S. (1973): Zur Nomenklatur der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Feddes Repertorium 83: 645-662
- Rauschert, S. (1975): Berichtigungen zur Nomenklatur in Rothmalers Exkursionsflora. Gött. Flor. Rundbr. 9(3): 67-70
- Rauschert, S. (1977): Zur Nomenklatur der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands (V). Feddes Repertorium 88: 307-321
- Rauschert, S. (1979): Zur Nomenklatur der Farn- und Blütenpflanzen aus dem Gebiet der DDR und BRD (VI). Feddes Repertorium 90: 393-400

- Rauschert, S. (1981): *Carex buxbaumii* Wahlenb. und *Carex hartmannii* Caj. und ihre Verbreitung in beiden deutschen Staaten. Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot. N. F. 11: 191-214
- Rauschert, S. (1982): Zur Nomenklatur der Farn- und Blütenpflanzen aus dem Gebiet der DDR und BRD. Feddes Rep. 93: 1-22
- Rauschert, S. u. W. Hempel (1978): *Prenanthes purpurea* L. - In: Schubert, R. u. E. Weinert (Hrsg): Karten der Pflanzenverbreitung im Hercynischen Florengebiet. *Hercynia* N.F. 15: 321-398
- Raven, P.H. (1960): The correct name for Rescue Grass. *Brittonia* 12: 219-221
- Rebholz, E. (1922): Beiträge zur Wildrosenflora des oberen Donautales und seiner Umgebung. I. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 78: 20-34
- Rebholz, E. (1923): Beiträge zur Wildrosenflora des oberen Donautales und seiner Umgebung. II. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 79: 24-38
- Rebholz, E. (1924): Verschollene im Florenbestand des oberen Donautales und seiner Umgebung. Tuttlinger Heimatblätter 1: 26-32
- Rebholz, E. (1926): Die Pflanzenwelt der Fridinger Alb mit Berücksichtigung ihres Schutzgebietes. Veröff. st. Stelle NatSchutz Württ. Landesamt DenkmPflege 3: 42-110
- Rebholz, E. (1927): Einige bedeutsame Formen von Ophrysbastarden in der badischen Baar. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N. F. 2: 89-91
- Rebholz, E. (1928): Die Habichtskräuter (Hieracien) der Südwestalb (Heuberg) und ihrer Umgebung. Tuttlinger Heimatblätter 7: 1-40
- Rebholz, E. (1928): *Euphrasia lutea* L. im badischen Jura. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 2 (11/12): 133-135
- Rebholz, E. (1931): Drei neue Bürger in der Pflanzengemeinde des Hegaus. Aus der Heimat 44 (12): 367-369
- Rebholz, E. (1931): Pflanzensoziologisch-pflanzengeographische Studien in Südwestdeutschland II. Von Friedingen nach Beuron. Beitr. Naturdenkmalpflege 14 (3): 221-229
- Rechinger, K.H. (1913): Standorte seltener Pflanzen aus Österreich. Allg. Bot. Z. Syst. 19 (10): 167-168
- Rechinger, K.H. (1941): Monographische Studie über *Teucrium* Sect. *Chamaedrys*. Bot. Archiv 42: 335-420
- Reeves, L.M. u. T. Reeves (1984): Life history and reproduction of *Malaxis paludosa* in Minnesota. Amer. Orchid. Soc. Bull. 53(12): 1280-1291
- Regel, C. v. (1955): Die Verbreitung einiger europäisch-asiatischer *Tragopogon*-Arten. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 65: 251-262
- Rehder, H. (1964): Wärmestufen, geologische Unterlage und Verbreitung einzelner Arten und Pflanzengesellschaften im Südost-Schwarzwald (auch in Beitr. Phytologie 1: 1-20, Stuttgart). Arb. Landwirtsch. Hochsch. Hohenheim 30: 125-144
- Rehmann, E. u. F. Brunner (1851): Gaea und Flora der Quellenbezirke der Donau und Wutach. Beitr. Rhein. Naturgesch. Freiburg 2: 1-107
- Reichelt, G. (1978): Das Zollhausried bei Blumberg (Baaralb). Schriften Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 32: 61-86
- Reichenbach, H. G. (1851): Die Orchideen der deutschen Flora nebst denen des übrigen Europa, des ganzen russischen Reichs und Algiers also ein Versuch einer Orchideographie Europas. 13: 240
- Reichenbach, H. u. W. Lemke (1963): *Hieracium*. In: Rothmaler, W. (Hrsg.): Exkursionsflora von Deutschland. Kritischer Ergänzungsband. Volk und Wissen
- Reichenbach, H.G.L. (1830-1832): *Flora Germanica excursoria ex affinitate regni vegetabilis naturali disposita sive principia synopseos plantarum in Germania terrisque in Europa media adjacentibus sponte nascentium cultorumque frequentias.*
- Reichert, H. (1972): Neue Angaben über die Verbreitung von 60 Pflanzensorten in südwestlichen Hunderück. *Decheniana* 125: 147-154
- Reichert, H. (1977): *Senecio jacobaea* L. und *Senecio erucifolius* L. Ergänzende Hinweise zur Unterscheidung der beiden Arten. Gött. Flor. Rundbr. 11/4: 102-109

- Reichert, H. (1986): Kritische Anmerkungen zur Beschreibung und Verschlüsselung der *Rosa canina*-Gruppe in der Flora Europaea. Gött. Flor. Rundbr. 19 (2): 66-70
- Reineke, D. (1983): Der Orchideenbestand des Großraumes Freiburg i.Br. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 33: 1-128
- Reineke, D. u. K. Rietdorf (1984): Zur Verbreitung von *Listera cordata* (L.) R. Br. im Schwarzwald. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 16(3): 395-424
- Reineke, D. u. K. Rietdorf (1989): Der Orchideenbestand in der Naturräumlichen Einheit 121 Baar-Hochmulde. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 21(2): 167-278
- Reineke, D. u. K. Rietdorf (1991): Zur Phänologie von *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. und *Orchis ustulata* L. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 23(4): 521-556
- Reineke, D. u. K. Rietdorf (1992): Bemerkungen zu *Epipactis helleborine* (L.) Cr. im Schwarzwald. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 24(3): 513-516
- Reinhard, H. R. (1987): Untersuchungen an *Ophrys holoserica* (Burm. fil.) W. Greuter subsp. *elator* (Gumprecht) Gumprecht (Orchidaceae). Mitt. Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 19(4): 769-800
- Reinhard, H. R. P. Gölz, R. Peter u. H. Wildermuth (1991): Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete: 348
- Reinhard, H.R. (1967): Übersicht über die Bastarde Schweizerischer Orchideen mit Berücksichtigung der möglichen Kombinationen. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 77: 103-127
- Reisch, C. (2003): Die Flora der Kalkmagerrasen des Großen Lautertals (Schwäbische Alb), Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 2: S. 93-106
- Reiser, F. (1871): Die Flora des Hohenzollerns. Jahresber. Schuljahr 1870-71, Höhere Bürgerschule zu Hechingen : 1-14
- Reissek, S. (1859): Vegetationsgeschichte des Rohres an der Donau in Österreich und Ungarn. Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien
- Rennwald, E. (1985): Zur Verbreitung und Gefährdung der Orchiden in der Ortenau unter besonderer Berücksichtigung des NSG Taubergießen. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 42: 1-184
- Renz, J. u. G. Taubenheim (1984): Orchidaceae. In: P.H.Davis: Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 8
- Resvoll, Th.R. (1925): *Rubus chamaemorus* L. - Die geographische Verbreitung der Pflanze und ihre Verbreitungsmittel. Veröff. Geobot. Inst. der ETH, Stift. Rübel, Zürich 3: 224-241
- Reveal, J.L., E.E. Terrell, J.H. Wiersema and H. Scholz (1991): *Festuca elatior* Linnaeus, Sp. Pl. 75. 1753, nom. rej. prop. In: D.H. Nicolson, Proposals to conserve or reject. Taxon 40: 135-137
- Rexer, E. (1994): Das Naturschutzgebiet Schenkenwald im Kreis Ravensburg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 79: 1-248
- Reznik, H. (1966): Pflanzenwelt. In: Die Stadt- und Landkreise Heidelberg und Mannheim I G. Braun : 89-111
- Rich, T.C.G., M.D.B. Rich u. F.H. Perring (1988): Plant Crib. : 141
- Richards, A.J. (1969): IOPB chromosome number reports XXIII. Taxon 18: 560-562
- Richards, A.J. (1970): Observations on *Taraxacum* sect. *Erythrosperma* Dt. em. Lindb. fil. in Slovakia. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comeniana, Bot. 18: 81-120
- Richards, A.J. (1985): Sectional Nomenclature in *Taraxacum* (Asteraceae). Taxon 34 (4): 633-644
- Richardson, I.B.K. (1975): A revision of the genus *Centranthus* DC. (Valerianaceae). J. Linn. Soc., Bot. 71: 211-234
- Richter-Rethwisch, F. (1965): Zur Verbreitung der beiden Franzosenkrautarten *Galinsoga parviflora* Cav. und *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake in der Bundesrepublik Deutschland. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzenschutz, Sonderheft 3: 35-38
- Richter-Rethwisch, F. (1966): Die beiden Franzosenkrautarten *Galinsoga parviflora* Cav. und *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake, eine Übersicht über ihre Verbreitung in der Bundesrepublik Deutschland und ein Beitrag zu ihrer Biologie. Diss. Hohenheim.

- Rieber, X. (1890): Beitrag zur Flora von Württemberg und Hohenzollern. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 46: 285-287
- Rieber, X. (1897): Beiträge zur württembergischen Flora. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 53: 139-141
- Riedl, H. (1966): Die Gattung *Heliotropium* in Europa. Ann. Naturh. Mus. Wien 69: 81-93
- Riedl, H. (1967): Die infraspezifischen Einheiten von *Arum maculatum* in Mitteleuropa Phytion (Austria) Annales rei botanicae 12: 159-168
- Riehl, S. (1993): Botanische Großreste aus einer neolithischen Profilabfolge. - Die horgenerzeitliche Seeufersiedlung Wangen/Bodensee. - Magisterarbeit Univ. Tübingen: 141
- Ries, H. (1948): Weiden und Weidewirtschaft am Feldberg. - In: Müller, K. (Hrsg.): Der Feldberg im Schwarzwald: 403-422
- Rietdorf, K. (1989): Zur Phaenologie von *Corallorrhiza trifida*. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 21(4): 1013-1014
- Ritschel-Kandel, G. (1988): Die Bedeutung der extensiven Ackernutzung für den Arten- und Biotopschutz in Unterfranken. Schriftenreihe Bayer. Landesamt für Umweltschutz 84: 207-218
- Rix, E.M. (1980): *Fritillaria* L. In: Tutin et al.: Flora Europaea Cambridge Univ. Press. 5: 31-34
- Robe, W.E. u. Griffiths (1990): Photosynthesis of *Littorella uniflora* grown under two PAR regimes: C3 and CAM gas exchange and the regulation of internal CO₂ and O₂ concentrations. Oecologia 85: 128-136
- Robertson, A. (1979): History of classification of the genus *Carex*. Taxon 28: 535-548
- Robinson, H. (1981): A revision of the tribal and subtribal limits of the Heliantheae (Asteraceae). Smithsonian Contribution of Botany 51: 1-102
- Rochow, M. von (1949): Die Vegetation des Kaiserstuhls. Diss. Univ. Freiburg i.Br.: 129
- Rochow, M. von (1951): Die Pflanzengesellschaften des Kaiserstuhls. - In: Zentralstelle für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.). G. Fischer Pflanzensoziologie 8: VII + 140
- Rodewald-Rudescu, L. (1974): Das Schilfrohr. Schweizerbart Die Binnengewässer 27: 302
- Rodi, D. (1955): Die blaublütige Varietät *azurea* des Ackergauchheils in Württemberg. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 110: 216-220
- Rodi, D. (1959/1960): Die Vegetations- und Standortgliederung im Einzugsgebiet der Lein (Kreis Schwäbisch Gmünd). Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 27/28 (1959/60): 76-167
- Rodi, D. (1960): Zwei neue Naturdenkmale bei Welzheim. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 27/28 (1959/60): 46-61
- Rodi, D. (1963): Die Streuwiesen- und Verlandungsgesellschaften des Welzheimer Waldes. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 31: 31-67
- Rodi, D. (1982): Feldflora-Reservat Beutenlay. In: Münsingen. Geschichte - Landschaft - Kultur. : 659-672
- Rodi, D. (1984): Modelle zur Einrichtung und Erhaltung von Feldflora-Reservaten in Württemberg. Verh. Ges. Ökologie 14: 167-172
- Rodi, D., R. Winkler, P. Aleksejew u. M. Walderich (1983): Vegetation und Standorte des Rosensteins. Unicornis 3: 17-35
- Roehling, J.C. (1831): Deutschlands Flora. Ed. 3, Band 3, S. I-VIII, 1-575 (bearb. von F. C. Mertens u. W.D J. Koch); Frankfurt.
- Roesler, C.A. (1839): Flora von Tuttlingen und seiner Umgebung bis Hohentwiel, Ludwigshafen und Werrenwag, beobachtet in den Sommern 1833 bis 1838. In: Köhler: Tuttlingen. Beschreibung und Geschichte dieser Stadt ...: 107-130; Tuttlingen.
- Roesler, G.F.R. (1788, 1790, 1791): Beyträge zur Naturgeschichte des Herzogthums Wirtemberg. Nach der Ordnung und den Gegenden der dasselbe durchströmenden Flüsse. 3 Hefte; Tübingen.
- Roetman, E., J.C.M. Den Nijs u. A.A. Sterk (1988): Distribution and habitat range of diploid, sexual dandelions (*Taraxacum sectio Vulgaria*), a Central European flora element in The Netherlands. Acta Bot. Neerl. 37: 81-94

- Rohde, U. (1994): Gefahren für Sandrasen und Binnendüne. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80: 349-352
- Romerio, M. (1965): Contribution à la cytotaxonomie du groupe de *Asperula cynanchica* L. Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 88: 65-76
- Romero Zarco, C. (1984): Revisión taxonómica del Genero *Avenula* (Dumort.) Dumort. (Gramineae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. Lagasalia 13 (1): 39-146
- Ronninger, K. (1925): Über einige kritische *Thymus*-Formen. Allg. Bot. Z. Syst. 26/27: 14-19
- Ronninger, K. (1932): Bestimmungs-Schlüssel für die *Thymus*-Arten der Flora von Württemberg. Feddes Repertorium 31: 129-135
- Ronninger, K. (1942): Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Thymus*. Feddes Repertorium 20: 321-332
- Ronninger, K. (1944): Bestimmungstabelle für die *Thymus*-Arten des Deutschen Reiches. Heilpfl.-Schriften. 10 (5): 1-24
- Ronninger, K. (1954): Bestimmungstabelle für die *Thymus*-Arten des Deutschen Reiches. Ber. Bayer. Bot. Ges. 30: 102-108
- Rösch, M. (1984): Botanische Großrestanalysen in der Siedlung "Forschner". - Ber. z. Ufer- u. Moorsiedl. Südwestdeutschl. 1. Materialheft z. Vor- u. Frühgeschichte in Bad.-Württ. 4: 64-79
- Rösch, M. (1985): Die Pflanzenreste der neolithischen Ufersiedlung von Hornstaad-Hörnle I am westlichen Bodensee I. Bericht. - 1. Bericht- Ber. z. Ufer- und Moorsiedlung Südwestdeutschl. 2. Materialheft z. Vor- u. Frühgeschichte in Bad.-Württ. 7: 164-199
- Rösch, M. (1987): Zur Umwelt und Wirtschaft des Neolithikums am Bodensee - Botanische Untersuchungen in Bodman-Blissenhalde. Arch. Nachr. Baden 38/39: 42-53
- Rösch, M. (1989a): Botanische Funde aus römischen Brunnen in Murrhardt, Rems-Murr-Kreis. Arch. Ausgr. 1988: 114-118
- Rösch, M. (1989b): Pflanzenreste des frühen Mittelalters von Mühlheim a.D. - Stetten, Kreis Tuttlingen. Arch. Ausgr. 1988: 211-212
- Rösch, M. (1990a): Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen im Durchenbergried. Siedlungsarchäologie im Alpenvorland 2. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 37: 9-64
- Rösch, M. (1990b): Pollenanalytische Untersuchungen in spätneolithischen Ufersiedlungen von Allensbach-Strandbad, Kr. Konstanz. Siedlungsarchäologie im Alpenvorland 2. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 37: 91-112
- Rösch, M. (1990c): Zur subfossilen Moosflora von Allensbach-Strandbad. Siedlungsarchäologie im Alpenvorland 2. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 37: 167-172
- Rösch, M. (1990d): Hegne-Galgenacker am Gnadensee. Erste botanische Daten zur Schnurkeramik am Bodensee. Siedlungsarchäologie im Alpenvorland 2. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 37: 199-225
- Rösch, M. (1990e): Botanische Untersuchungen an Pfahlverzügen der endneolithischen Ufersiedlung Hornstaad-Hörnle am Bodensee. Siedlungsarchäologie im Alpenvorland 2. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 37: 325-351
- Rösch, M. (1990f): Pflanzenfunde aus einem mittelalterlichen Dorf in Renningen, Kreis Böblingen. Arch. Ausgr. 1989: 285-289
- Rösch, M. (1991a): Pflanzenreste aus römischer Zeit von Sontheim/Brenz, Kreis Heidenheim. Arch. Ausgr. 1990:
- Rösch, M. (1991b): Botanische Untersuchungen an hochmittelalterlichen Siedlungsgruben vom Keltternplatz in Tübingen. Arch. Ausgr. 1990
- Rösch, M. (1991c): Buchbesprechung: H. Küster, Vom Werden einer Kulturlandschaft. Fundber. Bad.-Württ. 15:
- Rösch, M. (1992a): Ein verkohlter Kulturpflanzenvorrat aus dem Mittelalter von Biberach an der Riß. Germania :
- Rösch, M. (1992b): Archäobotanische Untersuchungen in der spätbronzezeitlichen Ufersiedlung Hagnau-Burg (Bodenseekreis). Siedlungsarchäologie im Alpenvorland 3. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. :

- Rösch, M. (1992c): Pflanzenreste aus einer spätmittelalterlichen Latrine des ehemaligen Augustinerkosters in Heidelberg. Materialh. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. :
- Rösch, M. (1992d): Bericht über die Untersuchungen an den pflanzlichen Resten aus der Bestattung in der Pfarrkirche von Durbach. In: Fingerlin, I.: Freiherr Wilhelm Hermann von Orscelar - Die ungewöhnliche Bestattung in der Durbacher Pfarrkirche. Arch. Inform. Bad.-Württ. 23: 60
- Rösch, M. (1992e): Zwei pflanzenhaltige Gruben der Linearbandkeramik vom Viesenhäuser Hof, Stuttgart-Mühlhausen. Arch. Ausgr. 1991: 53-56
- Rösch, M. (1993a): Quartärbotanische Untersuchung eines subfossilen Torfes von Bad Urach (Schwäbische Alb). Bauhinia
- Rösch, M. (1993b): Anmerkungen zu den Pflanzenresten der frühmittelalterlichen Siedlungen Hofstatt und Löchleacker, Gemeinde Schallstadt-Mengen, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. - In: Ch. Bücken: Untersuchungen zu den Anfängen der germanischen Besiedlung im Breisgau im 4./5. Jhd. n. Chr. - Diss. Univ. Freiburg
- Rösch, M. (1993c): Pflanzenreste der Spätbronzezeit aus der Ufersiedlung Unteruhldingen-Stollenwiesen (Bodenseekreis). Plattform 2: 38-55
- Rösch, M. (1993d): Nahrungs- und Nutzpflanzen im mittelalterlichen Villingen. - In: B. Jenisch: Zur Topographie des mittelalterlichen Villingen aufgrund von archäologischen Untersuchungen. - Diss. Univ. Tübingen.
- Rösch, M. (1993e): Zum Ackerbau der Urnenfelderkultur am nördlichen Oberrhein. Botanische Untersuchungen am Fundplatz Wiesloch-Weinäcker, Rhein-Neckar-Kreis. Arch. Ausgr. 1992: 95-99
- Rösch, M. (1994): Pflanzenreste aus einer Grube der Urnenfelderkultur in Knittlingen/Enzkreis. - In: Schallmayer, E., Baumeister, D., Kokabi, M. u. M. Rösch: Eine Siedlung der Urnenfelderkultur in Knittlingen/Enzkreis. Fundber. Bad.-Württ. 19 (1994)
- Rösch, M. (1995): Die Pflanzenreste. In: Baumeister, R.: Außergewöhnliche Funde der Urnenfelderzeit aus Knittlingen, Enzkreis. Fundber. Bad.-Württ. 20: 423-448
- Rösch, M. (1995): Römische Brunnen in Lahr - Fundgruben für die Botanik. Archäol. Ausgrab. Bad.-Württ. 1994: 151-156
- Rösch, M. (1996): Archäobotanische Untersuchungen in der spätbronzezeitlichen Ufersiedlung Hagnau-Burg (Bodenseekreis). Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 47: 239-313
- Rösch, M. (1997a): Landschaft, Landwirtschaft und Ernährung im Alamannien der Völkerwanderungs- und Merowingerzeit. Katalog z. Alamannenausstellung Stuttgart/Zürich im Druck:
- Rösch, M. (1997b): Pflanzenreste aus Fehlböden, Gefachen, Wellerhölzern und Latrinen. In: Bedal, A. (Hrsg.): "Seit über 600 Jahren bewohnt?" Dokumentation eines kleinen Haller Bürgerhauses aus dem Spätmittelalter. Schriftenreihe Alt-Hall im Druck
- Rösch, M. u. A. Bouchette (1996): Keltische Pflanzenfunde aus Riedlingen, Kreis Biberach. Archäolog. Ausgrab. Bad.-Württ. 1995: 132-137
- Rösch, M. u. B. Schmid (1992): Ein hochmittelalterliches Grubenhaus mit verkohltem Kulturvorrat von Biberach an der Reiß. Fundber. Bad.-Württ. 17 (1): 521-573
- Rösch, M. u. E. Fischer (1995): Zum Fortgang der Untersuchungen in Schwäbisch Hall. Ausgrab. Bad.-Württ. 1994: 323-325
- Rösch, M. u. E. Fischer (1997a): Zum Abschluß der Prospektionsmaßnahmen in Schwäbisch Hall. Ausgrab. Bad.-Württ. 1996: 105-107
- Rösch, M. u. E. Fischer (1997b): Pflanzenreste aus Latrinen, Fehlböden, Gefachen und Wellerhölzern. In: A. Bedal (Hrsg.): Ein bescheidenes Anwesen - Baugeschichte des Hauses Pfarrgasse 9 aus dem Jahre 1337 in Schwäbisch Hall. Schriftenreihe Ver. Alt Hall
- Rösch, M. u. U. Gross (1994): Hochmittelalterliche Nahrungspflanzenvorräte aus Gerlingen, Kreis Ludwigsburg. Fundber. Bad.-Württ. 19
- Rösch, M. u. W. Ostendorp (1988): Pollenanalytische, torf- und sedimentpetrographische Untersuchungen an einem telmatischen Profil vom Bodensee-Ufer bei Gaienhofen. Telma 18: 373-395

- Rösch, M., S. Karg u. M. Sillmann (1994): Pflanzenreste aus dem Haus "Lange Straße 49" - Dokumente zu Ernährung, Landwirtschaft und Landschaft im alten Schwäbisch Hall. - Haus(ge)schichten, Katalog z. gleichn. Ausstellung im Hällisch-Fränkischen Museum Schwäbisch Hall (1994)
- Rösch, M., S. Karg u. M. Sillmann (1994): Vierhundert Jahre gelagert: Pflanzenreste in Decken und Wänden. Botanische Dokumente zu Ernährung, Landwirtschaft und Landschaft aus der Langen Straße 49. In: Bedal, A. u. I. Fehle (Hrsg.): Hausgeschichten. Bauen und Wohnen im alten Hall und seiner Kathar inenvorstadt. Kataloge Häll.-Fränk. Mus. Schw. Hall 8: 474-491
- Rösch, M., St. Jacomet u. S. Karg (1992): The history of cereals in the region of the former Duchy of Swabia (Herzogtum Schwaben) from the Roman to the Post-medieval period: results of archaeobotanical research. *Vegetation History and Archaeobotany* 1: 193-231
- Röser, M. (1989): Karyologische, systematische und chorologische Untersuchungen an der Gattung *Helictotrichon* Besser ex Schultes & Schultes (Poaceae) im westlichen Mittelmeergebiet. *J. Cramer Dissertationes Botanicae* 145: 250
- Röser, M. (1996): Ecogeography of the grass genus *Helictotrichon* (Poaceae: Aveneae) in the Mediterranean and adjacent regions *Springer Pl. Syst. Evol.* 203: 181-281
- Rosenbauer, A. (2002): Flora von Korntal-Münchingen. *Jh. Ges. Naturkde. Württemberg*: 119-169
- Roser, W. (1962): Vegetations- und Standortsuntersuchungen im Weinbaugebiet der Muschelkalktäler Nordwürttembergs. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 30: 31-147
- Roßkopf, G. (1971): Pflanzengesellschaften der Talmoore An der Schwarzen Laber im Oberpfälzer Jura. *Denkschr. Regensb. Bot. Ges.* 28, N.F. 22: 1-115
- Roth von Schreckenstein, F. (1797): Versuch einer Flora der Gegend um Immendingen an der Donau. Handschrift. Fürstl. Fürstenbergische Bibliothek Donaueschingen.
- Roth von Schreckenstein, F. (1798): Beiträge zu einer schwäbischen Flora. *Botan. Taschenbuch Anf. Wiss. Apothekerkunst auf das Jahr 1798*: 80-123
- Roth von Schreckenstein, F. (1799): Verzeichnis sichtbar Blühender Gewächse, welche um den Ursprung der Donau und des Neckars, dann um den unteren Theil des Bodensees vorkommen: 50
- Roth von Schreckenstein, F. (1800): Verzeichnis der Schmetterlinge, welche um den Ursprung der Donau und des Neckars ... vorkommen. Samt Nachträgen und Berichtigungen zu dem Verzeichniss sichtbar blühender Gewächse allda. Cotta
- Roth von Schreckenstein, F., J.M. von Engelberg u. J.N. Renn (1804-1814): Flora der Gegend um den Ursprung der Donau und des Neckars, dann vom Einfluß der Schussen in den Bodensee bis zum Einfluß der Kinzig in den Rhein. 4 Bände, 389 + 645 + 536 + 567 S.; Donaueschingen (A. Wilibald).
- Roth, H.J. (1983): *Polemonium caeruleum* L. im Westerwald. *Hess. Flor. Briefe* 32 (1): 11-13
- Rothmaler, W. (1935): Systematische Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung *Alchemilla*. III. Notizen über das Subgenus *Aphanes* (L.). *Feddes Repertorium* 38: 36-43
- Rothmaler, W. (1936): Systematische Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung *Alchemilla* (L.) Scop. IV. Die Gruppen der Untergattung *Eualchemilla* (Focke) Buser. *Feddes Repertorium* 40: 208-212
- Rothmaler, W. (1937): Systematische Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung *Alchemilla* (L.) Scop. VII. Aufteilung der Gattung und Nomenklatur. *Feddes Repertorium* 42: 164-173
- Rothmaler, W. (1938): Systematik und Geographie der Subsektion *Calycanthum* der Gattung *Alchemilla* L. *Feddes Repertorium* 100: 59-93
- Rothmaler, W. (1962): Systematische Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung *Alchemilla*. X. Die mitteleuropäischen Arten. *Feddes Repertorium* 66: 194-234
- Rothmaler, W. (1994): Exkursionsflora von Deutschland. Band 2 Gefäßpflanzen. Grundband: 640
- Rothmaler, W. (1995): Exkursionsflora von Deutschland. Band 3 Gefäßpflanzen. Atlasband: 754
- Rothmaler, W. (Begr.) (1990): Exkursionsflora von Deutschland. Kritischer Band. Bd. 4, 8. Aufl., (Hrsg.: Schubert u. W. Vent): 811
- Roux, G. (1975): *Thymus* L. - In: *Flore des France, Fascicule 2* (Hrsg.: Guinocet, M. u. Vilmorin, R. de). Editions du centre national de la recherche scient. : 694-697

- Rouy, G.C.C. (1903): Flore de France, 8:I-VI, 1-406.
- Roweck, H. (1986): Zur Vegetation einiger Stillgewässer im Südschwarzwald. Arch. Hydrobiol. Suppl. 66 (4): 455-494
- Roweck, H. u. H. Reinöhl (1985 (erschieden 1986)): Zur Verbreitung und systematischen Abgrenzung der Teichrosen *Nuphar pumila* und *N. x intermedia* in Baden-Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 61: 81-153
- Roweck, H. u. K. Raab (1989): Zur Verbreitung von *Littorella uniflora* in Baden-Württemberg. Jh. Ges. Naturk. Württ. 144: 119-131
- Roweck, H. u. W. Schütz (1988): Zur Verbreitung seltener sowie systematisch kritischer Laichkräuter (*Potamogeton*) in Baden-Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 63: 431-542
- Rozevic, R. Y. and B. K. Schischkin (1934): Flora of the U.S.S.R. Vol. II. (Englische Übersetzung 1963): 622
- Rüdenauer, B., K. Rüdenauer u. S. Seybold (1974): Über die Ausbreitung von *Helianthus*- und *Solidago*-Arten in Württemberg. Jh. Ges. Naturk. Württ. 129: 65-77
- Rumsey, F.J. u. S.L. Jury (1991): An account of *Orobanche L.* in British and Ireland. *Watsonia* 18: 257-295
- Runge, F. (1959): Der Arzneibaldrian in Westfalen. *Natur und Heimat* 19: 57-62
- Runge, F. (1972): Die Flora Westfalens: 550
- Rutishauser, A. (1943): Konstante Art- und Rassen-Bastarde in der Gattung *Potentilla*. *Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen* 18: 111-134
- Rychnovska, M. u. B. Ulehlova (1975): Autökologische Studie der tschechoslowakischen *Stipa*-Arten. *Vegetace CSSR A* 8: 170
- Rytz, W. (1933): Das Herbarium Felix Platters. Ein Beitrag zur Geschichte der Botanik des XVI. Jahrhunderts. *Verh. Naturforsch. Ges. Basel* 44(1): 1-122
- Ryves, T. B. (1980): Alien species of *Eragrostis P. Beauv.* in the British Isles. *Watsonia* 13: 111-117
- Ryves, T. B., E. J. Clement and M. C. Foster (1996): Alien grasses of the British Isles. *BSBI* : 181
- Ryves, T.B. (1984): *Artemisia L.* species in the British Isles. *Watsonia* 15: 109-112
- Ryves, T.B., E.J. Clement, M.C. Foster (1996): Alien grasses of the British Isles.
- Sachs, F. (1961): Veränderungen in der Pflanzenwelt des Landkreises Buchen seit 1904. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland* 20 (1): 7-14
- Sahlin, C.I. (1972): Zur *Taraxacum*-Flora Süddeutschlands und Österreichs. *Mem. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 48: 75-84
- Sahlin, C.I. (1975): Some New *Taraxaca* from the Mosel Valley. *Svensk Bot. Tidskrift* 69: 161-174
- Sahlin, C.I. u. W. Lippert (1983): Die *Taraxacum*-Arten der bayerischen Alpen. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 54: 23-45
- Saint-Yves, A. De (1927): Tentamen. *Claves analyticae Festucarum veteris orbis* (Subgen. *Eu-Festucarum*). *Rev. Bretonne Bot. Pure Appl.* 2: 1-124
- Sales, F. (1993): Taxonomy and nomenclature of *Bromus* sect. *Genea* Edinburgh J. Bot. 50 (1): 1-31
- Sales, F. (1994): A reassessment of the *Bromus madritensis* complex (Poaceae): a multivariate approach. *Israel J. Pl. Sci.* 42 (3): 245-255
- Salkowski, H.-E. (1985): Quadrantenkartierung der Orchideenstandorte in der botanischen Literatur von Rheinland-Pfalz und angrenzender Gebiete: 160
- Sauer, E. (1993): Die Gefäßpflanzen des Saarlandes. *Natur u. Landschaft im Saarland Sonderband* 5: 708
- Sauer, M. (1989): Die Pflanzengesellschaften des Goldersbachtals bei Bebenhausen (Stadt Tübingen) im Bereich des geplanten Hochwasserrückhaltebeckens. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 64/65: 441-507

- Sauer, W. (1972): Die Gattung *Pulmonaria* in Oberösterreich. *Österr. Bot. Zeitschr.* 122: 33-50
- Sauer, W. (1974): Beiträge zur Kenntnis von *Pulmonaria montana* Lejeune und *P. mollis* Wulfen (recte: Wolff) ex Hornemann in Mitteleuropa. *Phyton* 16 (1-4): 239-264
- Sauer, W. (1975): Einige Bemerkungen zur Gattung *Pulmonaria* in Bayern. *Gött. Flor. Rundbr.* 9 (1): 3-7
- Sauer, W. (1975): Karyo-systematische Untersuchungen an der Gattung *Pulmonaria* (Boraginaceae). *Bibliotheca Bot.* (Hrsg.: H. Melchior) 131: 1-85
- Sauer, W. u. G. Gruber (1979): Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Pulmonaria* in Bayern: Kritische Sippen, Verbreitung und allgemeine Hinweise auf die Arealbildung. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 50: 127-160
- Sauer, W. u. H. Chmelitschek (1976): Beiträge zur Kenntnis ausdauernder Wildhafer: Die Gattung *Avenula* (Dumort.) Dumort. in den Ostalpen. *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 12: 513-608
- Sauer, W. u. M. Thiv (1995): Die Gattung *Pulmonaria* (Boraginaceae) in Baden-Württemberg. *Jh. Ges. Naturk. Württ.* 151: 281-344
- Sauerbeck, K.O. (1995): Der Blütenstand des Hain-Rispengrases (*Poa nemoralis* L.). *Jahresh. Ges. Naturk. Württ.* 151: 345-359
- Saukel, J. u. R. Langer (1992): The *Achillea millefolium*-group (Asteraceae) in Central Europe. I. *Phyton* 31: 185-207
- Sauter (1836): Beschreibung der Mineralquellen zu Ueberlingen.
- Sautter, R. (1994): Untersuchungen zur Diasporen- und Samenökologie in bedrohten Pflanzengesellschaften sandiger Böden. *Diss. Bot.* 226: 155 S.
- Savelsbergh, E. (1979): Bemerkungen über *Carex binervis* Smith (Cyperales, Cyperaceae). *Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N. F.* 21: 17-28
- Savelsbergh, E. (1983): *Inula graveolens* (L.) Desf. (Klebriger Alant) bei Speyer. *Gött. Flor. Rundbr.* 16 (3/4): 96-99
- Savidge, J.P. (1960): The experimental taxonomy of european *Callitriche*. *Proc. Linn. Soc. Lond.* 171: 128-130
- Schaaf, G. (1925): Hohenloher Moore mit besonderer Berücksichtigung des Kupfermoores. *Veröff. st. Stelle NatSchutz Württ. Landesamt DenkmPflege* 1 (1924): 1-58
- Schabel, A. (1836): *Flora von Ellwangen*. P. Balz: 100
- Schaefer-Guignier, O. (1991): Les Etangs des Vosges saonoises. Etude de la vegetation et classification floristico-ecologique. *Publications du Centre Universitaire d'Etudes regionales* 8: 41-106
- Schaefer-Guignier, O. (1994): Weiher in der Franche-Comté: eine floristisch-ökologische und vegetationskundliche Untersuchung. *J. Cramer Diss. Bot.* 213: 239
- Schaeftlein, H. (1960): *Drosera* (Sonnentau) auf der Turracher Höhe. Ein Beitrag zur Kenntnis von *Drosera x obovata* Mert. et Koch. *Carinthia* II, 70: 61-81
- Schaeppi, H. (1974): Vergleichend-morphologische Untersuchungen am Gynoeceum einiger Juncaceen. *Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich* 119: 225-238
- Schäfer, A. (1941): Die Pflanzenwelt des Altrheins bei Neuhofen. *Pollichia, Mitt. d. Ver.f. Naturkunde u. Naturschutz in der Westmark* 9: 41-56
- Schäfer, A. (1963): Die Pflanzenwelt in und um Ludwigshafen am Rhein. *Mitteilungen der Pollichia Pfälz. Verein f. Naturkd. u. NatSchutz* 3 (10): 5-67
- Schäfer, A. (1965): Die Adventivflora in Ludwigshafen am Rhein *Mitteilungen der Pollichia* : 281-286
- Schaffner, W. (1968): Untersuchungen zur Wuchsform und Sproßgestalt des Flügelginsters, *Cytisus sagittalis* (L.) Koch. *Bot. Jahrb. Syst.* 88 (4): 469-514
- Schäfle, L. (1956): Das Arnegger Ried - ein neues Naturschutzgebiet im Blautal. (Festschrift für Hans Schwenkel). *Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 24: 309-316

- Schall, B. (1988): Die Vegetation der Waldwege und ihre Korrelation zu den Waldgesellschaften in verschiedenen Landschaften Südwestdeutschlands mit einigen Vorschlägen zur Anlage von Waldwegen. Ber. Akad. Naturschutz Landschaftspflege 12: 105-140
- Schanderl, H. (1930): Ökologische und physiologische Untersuchungen an der Wellen- und Muschelkalkflora des Maintales zwischen Würzburg und Gambach Planta 10: 756-810
- Scharfetter, R. (1953): Biographien von Pflanzensippen: 546
- Schatz, J.A. (1892): *Ajuga gevensis* x *reptans* im badischen Juragebiet. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (98): 406-407
- Schatz, J.A. (1892): *Orobanche scabiosae* Koch = *O. reticulata* Wallroth forma typica G.Beck. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (98): 405-406
- Schatz, J.A. (1893): Die neuesten Pflanzenfunde aus der Baar 1889-1892. Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 8: 45-60
- Schatz, J.A. (1895): Das Fürstlich Fürstenbergische Herbarin Donaueschingen. Pfarrer J.B. Amtsübher und Decan Fd. Brunner. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3 (129): 259-265
- Scheer, G. (1950): Die Pflanzenwelt um Blaubeuren. In: Blaubeurer Heimatbuch: 347-390
- Scheerer, H. (1939): Chromosomenzahlen aus der Schleswig-Holsteinischen Flora. I. Planta 29: 636-642
- Scheerer, H. (1956): "Entlesboden" und "Viehweide", zwei wenig bekannte Naturschutzgebiete in den Waldenburger Bergen. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 24: 288-308
- Scheerer, H. (1980): Die Naturdenkmale des Rems-Murr-Kreises. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 51/52: 101-151
- Scheerer, H. (1991): Die Verbreitung des Leberblümchens in Ostwürttemberg Jh. Ges. Naturkde Württemberg 146: 129-158
- Scheerer, H. (1993): Floristische Erhebungen an xerothermen Keuperbiotopen im mittleren Remstal. In: Xerothermbiotope im mittleren Remstal (Hrsg.: Landesanstalt für Umweltschutz Bad.-Württ. u. H. Scheerer). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 76: 91-248
- Scheerer, H., G. Hennecke u. M. Hennecke (1984): Pfeifengras-Kieferngesellschaften in Naturschutzgebieten des westlichen Schwäbisch-Fränkischen Walds. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58: 75-128
- Scheller, H., U. Bauer, T. Butterfass, T. Fischer, H. Grasmück u. H. Rottmann (1979): Der Speierling (*Sorbus domestica* L.) und seine Verbreitung im Frankfurter Raum. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 71: 5-65
- Scheuerle, J. (1887): Botanische Funde und Fundorte. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 43: 221-228
- Scheuerle, J. (1909): Mitteilung einiger Wildrosenstandorte der Frittlinger-Spaichinger Gegend. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 65: XIV
- Scheuermann, R. (1940): Mittelmeerpflanzen der Güterbahnhöfe des rheinisch-westfälischen Industriegebietes II. Nachtrag. Rep. spec. nov. regn. vegetab. 121: 131-156
- Scheven, H.J. (1994): Gaschromatisch/massenspektrometrische Untersuchungen des Appendixduftes blühender Pflanzen von *Arum maculatum* L. und *Arum italicum* Miller Dissertation aus dem Fachbereich Biologie der Uni Marburg: 149
- Schiefer, J. (1981): Bracheversuche in Baden Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 22: 325
- Schiel, F. J. & Hunger, H. (2004): Wiederfund des Vierblättrigen Kleefarns (*Marsilea quadrifolia*) in Baden-Württemberg, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 3: S. 33-37
- Schildknecht, J. (1855): Skizze aus der Flora von Ettenheim. - Beilage zu dem Programm der höheren Bürgerschule in Ettenheim. Friedrich Wagner: 32
- Schildknecht, J. (1862): Nachtrag zu Spenners Flora Friburgensis. Friedrich Wagner
- Schildknecht, J. (1863): Führer durch die Flora von Freiburg. Fr. Wagner'sche Buchhandlung: 206

- Schill, J. (1878): Neue Entdeckungen im Gebiet der Freiburger Flora. Ber. Naturf. Ges. Freiburg 2 (3): 1-19
- Schill, J. (1878): Neue Entdeckungen im Gebiet der Freiburger Flora. Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br. 7: 392-410
- Schill, J. (1880): Neue Entdeckungen im Gebiete der Freiburger Flora. Ber. naturforsch. Ges. Freiburg/Brsg.
- Schill, J. (1887): Neue Entdeckungen im Gebiet der Freiburger Flora. Ber. Naturf. Ges. Freiburg 2 (3): 1-19
- Schilling, F. (1993): Naturschutz: "Tendenz steigend". Blätter des Schwäbischen Albvereins 99 (5): 143
- Schinnerl, M. (1912): Ein neues deutsches Herbarium aus dem XVI. Jahrhundert. Ber. Bayer. Bot. Ges. 13: 207-254
- Schinz, H. u. R. Keller (1899/1900): Flora der Schweiz. 1. Aufl., IV + 628 S.; Zürich.
- Schinz, H. u. R. Keller (1914): Flora der Schweiz. II. Teil, Kritische Flora. A. Raustein: 582
- Schinz, H. u. R. Keller (1923): Flora der Schweiz.
- Schippmann, U. (1986): Über *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer et Schultes in Bayern. Unterscheidung und Verbreitung. Ber. Bayer. Botan. Ges. 57: 53-56
- Schippmann, U. (1991): Revision der europäischen Arten der Gattung *Brachypodium* Palisot de Beauvois (Poaceae). Boissiera 46: 1 250
- Schkuhr, C. (1791): Botanisches Handbuch der mehresten theils in Deutschland.....
- Schlagowski, H. (1970): *Aceras anthropophorum* (L.) Aiton fil. und deren Bastarde. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Badem-Württ. 2(6): 81-89
- Schlatterer, A. (1884): In: Neue Standorte. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (11): 107
- Schlatterer, A. (1909): Vereinsausflüge. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 5 (239): 305-308
- Schlatterer, A. (1911): Neue Standorte. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6: 95-96
- Schlatterer, A. (1911): Vereinsausflüge im Sommer 1911. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6 (261-262): 91-93
- Schlatterer, A. (1912): Vereinsausflug ins Bodenseegebiet. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6 (269-271): 152-158
- Schlatterer, A. (1912): Vorläufige Zusammenstellung der bisher gemeldeten Naturdenkmäler Badens. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6: 165-194
- Schlatterer, A. (1920): Neue Standorte. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1 (4): 109-112
- Schlatterer, A. (1921): Auf dem Feldberg am 3.7.1921. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1: 164-166
- Schlatterer, A. (1921): In den Kaiserstuhl am 5.7.1921. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1 (6): 161-162
- Schlatterer, A. (1942): Die Orchideen des Freiburger Florengebiets. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N.F. 4: 345-357
- Schlee, D. (1977): Florale und extraflorale Nektarien sowie Insektenkot als Nahrungsquelle für Chironomidae-Imagines (und andere Dipteren). Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. A 300: 1-16
- Schlegel, M., G. Steinbrück, K. Hahn u. B. Röttger (1989): Interspecific relationship of ten European orchid species as revealed by enzyme electrophoresis. Pl. Syst. Evol. 163: 107-119
- Schlenker, G. (1885): Über Orchideen und deren Befruchtung. Korrespondenzbl. Gelehrten u. Realschulen Württ. 32: 39-50
- Schlenker, G. (1908): Das Schwenninger Zwischenmoor und zwei Schwarzwald-Hochmoore in Bezug auf ihre Entstehung, Pflanzen und Tierwelt. Mitt. der Geolog. Abt. des K. Württ. Statist. Landesamtes 5: 1-279

- Schlenker, G. (1916): Die Pflanzenwelt zweier oberschwäbischer Moore mit Berücksichtigung der Mikroorganismen. 1. Dornachried, 2. Dolpenried. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 72: 37-120
- Schlenker, G. (1936): Experimentelle Untersuchungen in der Sektion Beccabunga der Gattung Veronica. Flora, N.F. 30: 305-350
- Schlenker, K. (1910): Über die Flora des Oberamtes Mergentheim. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 66: LVI-LXXI
- Schlenker, K. (1922): Über 2 Adventivpflanzen in der württ. Flora. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 78: XXVII-IX
- Schlenker, K. (1928): Pflanzenschutz im württembergischen Neckarland. Veröff. Staatl. Stelle Naturschutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 4: 100-132
- Schlenker, K. (1932): Das Schopflocher Moor. Veröff. st. Stelle NatSchutz Württ. Landesamt Denkmalpflege 8: 10-76
- Schlesinger, S. (1991): Zweiter Fund von *Orobancha picridis* F.W. Schultz in Baden-Württemberg. Carolina 49: 125
- Schmeil, O. u. J. Fitschen (1982): Flora von Deutschland. (Bearb.: W. Rauh u. K. Senghas). Quelle u. Meyer: 606
- Schmeil, O. u. J. Fitschen (1993): Flora von Deutschland. (Bearb.: K. Senghas u. S. Seybold). Quelle u. Meyer : X + 802
- Schmid , E. u. H. Gams (1927): *Echium* L. - In: Illustrierte Flora von Mitteleuropa V/3 (Hrsg.: Hegi, G.). J.F. Lehmanns : 2192-2197
- Schmid, B. (1981): Die Verbreitung der Artengruppe *Carex flava* L. s. l. in der Schweiz. Bot. Helv. 91: 3-8
- Schmid, B. (1982): Karyology and hybridisation in the *Carex flava* complex in Switzerland.. Feddes Rep. 93: 23-59
- Schmid, B. (1983): Notes on the nomenclature and taxonomy of the *Carex flava* group in Europe. Watsonia 14: 309-319
- Schmid, B. (1986): Colonizing plants with persistent seeds and persistent seedlings (*Carex flava* group). Bot. Helv. 96: 19-26
- Schmidlin, E. (1832): Flora von Stuttgart, oder Beschreibung der in der Umgegend von Stuttgart wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse. Nebst einem Anhang über die in der Stuttgarter Umgegend im Größeren angebauten ökonomischen Gewächse. J.B. Metzler : X + 559
- Schmidt, B. (1993): Die Skorpionsmoos-Wasserschlauchgesellschaft (*Scorpidio-Utricularietum*) - eine für das Wollmatinger Ried neue Pflanzengesellschaft. Jahresber. NSG Wollmatinger Ried - Untersee - Gnadensee: 6-10
- Schmidt, B. (1995): Vergesellschaftung und Synökologie von *Utricularia stygia* im Fetzach-Taufach-Moor (Kreis Ravensburg) - ein neuer Fundort für Württemberg. Jh. Ges. Naturk. Württ. 151: 375-384
- Schmidt, J.A. (1857): Flora von Heidelberg. Zum Gebrauch auf Excursionen und zum Bestimmen der in der Umgebung von Heidelberg wildwachsenden und häufig cultivierten Phanerogamen. J.C.B. Mohr: 394
- Schmidt, P. (1968): Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Thymus* L. in Mitteldeutschland. Hercynia N.F. 5 (3): 385-419
- Schmidt, P. (1970): Vorläufiger Bestimmungsschlüssel heimischer *Thymus*-Arten. Rundsch. Arbeitsgem. mitteldt. Floristen 3 (70): ohne Seitenangabe
- Schmidt, P. (1971): Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Thymus* L. unter besonderer Berücksichtigung von Wuchsform, Verbreitung und soziologischem Verhalten. Thesen zur Dissertation für die Promotion A: 1-18
- Schmidt, P. (1971): Die *Thymus*-Arten im Nordosten des europäischen Teiles der UDSSR, Studien zur Kenntnis der Gattung. Feddes Repertorium 81 (8/9): 527-538
- Schmidt, P. (1973): Übersicht über die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Thymus* L. Feddes Repertorium 83 (9/10): 663-671

- Schmidt, P. (1974): Das soziologische Verhalten der mitteleuropäischen Thymus-Arten als Beispiel für die Bedeutung "Kritischer Sippen" in der Geobotanik. Mitt. Sekt. Geobot. Phytotaxon. Biol. Ges. DDR : 49-59
- Schmidt, P. (1977): Revision der Thymus-Arten von Ph. M. Opiz. Folia Geobot. Phytotax. 12: 377-416
- Schmidt, P., u. H.P. Knapp (1977): Die Arten der Gattung Thymus L. (Labiatae) im hercynischen Florengebiet. Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturw. Reihe 26 (2): 71-118
- Schmidt, R. (1969): Die Trockenrasenvegetation des Kappelberges bei Fellbach. Jh. Ges. Naturk. Württ. 124: 200-221
- Schmidt, R. (1983): Über Wuchsform- und Areal differenzierung zentraleuropäischer Senecioneae. Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturw. Reihe 32 (3): 113-132
- Schmidt, R. (1986): Über Wuchsform- und Areal differenzierung zentraleuropäischer Senecioneae. Hercynia N.F. 23: 193-211
- Schmuckler, T. u. G. Linnemann (1959): Carnivorie. - Handbuch der Pflanzenphysiologie (Hrsg.: Ruhland, W.). XI: 198-183
- Schnedler, W. (1977): Pflanzen von denen in der mitteleuropäischen Literatur selten oder gar keine Abbildungen zu finden sind. Folge III, IV. Gött. Flor. Rundbr. 11 (3): 50-57, 88-97
- Schnedler, W. (1977): Pflanzen, von denen in der mitteleuropäischen Literatur selten oder gar keine Abbildungen zu finden sind. Folge I. Gött. Flor. Rundbr. 10 (4): 85-88
- Schnedler, W. (1978): Pflanzen, von denen in der mitteleuropäischen Literatur selten oder gar keine Abbildungen zu finden sind. Folge VIII. Gött. Flor. Rundbr. 12: 97-101
- Schnedler, W. (1979): Beobachtungen zum erheblichen Rückgang der Kornblume *Centaurea cyanus* L. Gött. Flor. Rundbr. 13: 102-105
- Schnedler, W. (1979): Pflanzen von denen in der mitteleuropäischen Literatur selten oder gar keine Abbildungen zu finden sind. Folge IX: Noch einmal zur Gattung *Lallemantia* Fisch. et Mey. Gött. Flor. Rundbr. 13 (1): 15-17
- Schnedler, W. (1989): Über die Roggen-Trespe (*Bromus secalinus* L.) in Hessen. Oberhess. Naturwiss. Z. 51: 109-142
- Schnedler, W. (1989): Wildpflanzen im Garten. Beobachtung über geförderte und geduldete Einbürgerungen. Beitr. Naturkd. Osthessen 25: 105-116
- Schnedler, W. (1990): 23 Jahre floristische Kartierung in Hessen. Flor. Rundbr. 23 (2): 111-117
- Schneider, A. (1892): Die Phanerogamenflora des Roßbergs. Bl. Schwäb. Albverein 4: 171-172
- Schneider, Ch., U. Sukopp u. H. Sukopp (1994): Biologisch-ökologische Grundlagen des Schutzes gefährdeter Segetalpflanzen. Schriftenreihe Vegetationskunde 26: 356
- Schneider, F. (1880): Taschenbuch der Flora von Basel und der angrenzenden Gebiete des Jura, des Schwarzwaldes und der Vogesen. H. Georg: 344
- Schneider, P. A. (1993): Die Orchideen von Baden-Württemberg. Ein Erlebnisbuch: 256
- Schnetter, M. u. R. Nold (1955): Biologische Exkursion zu Rieselgut, Mooswald und Ochsenmoos am 15.5.1954. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 6 (3): 195-201
- Schnittler, M., G. Ludwig, P. Pretscher u. P. Boye (1994): Konzeption der Roten Listen der in Deutschland gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. - Unter Berücksichtigung der neuen internationalen Kategorien. Natur und Landschaft 69 (10): 451-459
- Schnizlein, A. u. A. Frickhinger (1848): Die Vegetations-Verhältnisse der Jura- und Keuperformation in den Flußgebieten der Wörnitz und Altmühl. C.H. Beck: 344
- Schoepf, J. (1622): Ulmischer Paradiß Garten: Das ist Eine Verzeichnuß unnd Register der Simplicien an der Zahl über die 600, welche inn Gärten unnd nechstemn Bezirk umb daß H. Reichs Statt Ulm zufinden: 62
- Scholz, H. (1960): Der Formenkreis der *Setaria italica* (L.) P. B. Ber. dt. Bot. Gesellsch. 73: 471-476
- Scholz, H. (1962): *Agrostis castellana*. Eine neue Fremdpflanze für Schleswig-Holstein. Heimat 69/12: 405-406

- Scholz, H. (1963): Zur Gramineenflora Deutschlands. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 76: 135-146
- Scholz, H. (1964): Zur Gramineenflora Deutschlands II. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 77: 145-160
- Scholz, H. (1965): *Agrostis tenuis* "Highland Bent", ein Synonym des *Agrostis castellana*. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 78: 322-325
- Scholz, H. (1968): Die Artengruppe *Stipa pennata* L. in Frankreich, in der Schweiz und angrenzenden Gebieten. Willdenowia 4/3: 299-315
- Scholz, H. (1969): Novitates systematicae speciei *Agrostis coarctata* Ehrh. ex Hoffm. Willdenowia 5: 479-487
- Scholz, H. (1970): Zur Systematik der Gattung *Bromus* L. subgen. *Bromus* (Gramineae). Willdenowia 6 (1): 139-159
- Scholz, H. (1971): Gegenwärtige Kenntnisse über die Verbreitung der *Calamagrostis phragmitoides* HARTM. (Purpureitgras) in Mitteleuropa. Philippia I/2: 85-90
- Scholz, H. (1975): Grassland Evolution in Europe. Taxon 24 (1): 81-90
- Scholz, H. (1978): Synaptospermie und Heterodiasporie in der Gattung *Bromus* (Gramineae). Willdenowia 8 (2): 341-350
- Scholz, H. (1983): Die Unkraut-Hirse (*Panicum miliaceum* subsp. *ruderales*) - neue Tatsachen und Befunde. Plant Systematics and Evolution 143: 233-244
- Scholz, H. (1985): *Setaria* P. Beauv. - In Flora of Turkey (ed. P. H. Davis), Vol. 9 University Press : 597-600
- Scholz, H. (1988): Zwei neue Taxa des *Eragrostis pilosa*-Komplexes. Willdenowia 18: 217-222
- Scholz, H. (1992): *Echinochloa esculenta*, comb. nov. - the correct name of the Japanese barnyard millet (Gramineae). Taxon 41: 522-523
- Scholz, H. (1993): Eine unbeschriebene anthropogene Goldrute (*Solidago*) aus Mitteleuropa. Flor. Rundbr. 27 (1): 7-12
- Scholz, H. (1993): *Elytrigia arenosa* (Gramineae)- ein mitteleuropäischer Relikt-Endemit Bot. Jahrb. Syst. 115 (3): 351-366
- Scholz, H. (1995): *Eragrostis albensis* (Gramineae), das Elb-Liebesgras - ein neuer Neo-Endemit Mitteleuropas. Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 128: 73-82
- Scholz, H. u. N. Böhling (1997): *Poa langiana* Rchb. und *P. compressa* var. *expansa* H. Scholz et Böhling.
- Scholz, H. u. V. Mikolas (1991): The weedy representatives of Proso Millet (*Panicum miliaceum*, Poaceae) in Central Europe. Thaiszia 1: 31-41
- Scholz, H. und U. Mos (1994): Status und kurze Geschichte des ausgestorbenen Kulturgetreides *Bromus mango* E. Desv. - und die Genese des *Bromus secalinus* L. Gustav FischerFlora 189: 215-222
- Schönfelder, P. (1967): Das Galeopsietum *angustifoliae* Büker 1942 - eine Kalkschuttpioniergesellschaft Nordbayerns. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 11/12: 5-10
- Schönfelder, P. (1969): Vorkommen und Gefährdung der Riemenzunge - *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. - im nördlichen Bayern. Ber. Naturforsch. Ges. Bamberg 43: 12-17
- Schönfelder, P. (1970): Südwestliche Einstrahlung in der Flora und Vegetation Nordbayerns. Ber. Bayer. Bot. Ges. 42: 17-100
- Schönfelder, P. (1975): Zur Unterscheidung der einheimischen Thymus-Sippen und ihrer Verbreitung in Bayern. Gött. Flor. Rundbr. 9 (3): 70-84
- Schönfelder, P. (1977): Verbreitungskarten der Orchideen in Bayern (Stand 1977). Hoppea, Denkschr. Regensburg. Bot. Ges. 36: 249-309
- Schönfelder, P. (1987): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Schriftenreihe Bayer. Landesamt für Umweltschutz 72: 77
- Schönfelder, P. u. A. Bresinsky (1990): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. E. Ulmer : 752 S. + Anhang
- Schönfelder, P. u. S. Wegmüller (1974): Zur Unterscheidung und Verbreitung der Sippen von *Lamium galeobdolon* agg. in Süddeutschland. Gött. Flor. Rundbr. 8 (1): 24-34

- Schönhar, S. (1952): Untersuchungen über die Korrelation zwischen floristischer Zusammensetzung der Bodenvegetation und der Bodenazidität. Mitt. Ver. forstl. Standortkart. 2: 3-24
- Schorler, B. (1908): Über Herbarien aus dem 16. Jahrhundert. Sber. Abh. naturw. Ges. Isis Dresd. 1907: 73-91
- Schotsman, H.D. (1954): A taxonomic spectrum of the section *Eu-Callitriche* in the Netherlands. Acta Bot. Neerl. 3: 313-384 + 16 plates
- Schotsman, H.D. (1958): Beitrag zur Kenntnis der *Callitriche*-Arten in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 32: 128-140
- Schotsman, H.D. (1967): Les *Callitriches*. - In P. Jovet (Hrsg.): Flore de France, Vol. 1, 152 S. P. Lechevalier
- Schotsman, H.D. u. G. Haldimann (1981): *Callitriches inédites du Jura Français C. cophocarpa* Sendtn., *C. platycarpa* Kütz. (Angiospermae) et L'hybride dans la partie septentrionale. Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 104: 131-143
- Schouten, Y. and J. F. Veldkamp (1985): A revision of *Anthoxanthum* including *Hierochloe* (Gramineae) in Malesia and Thailand. Blumea 30: 319-351
- Schramm (1859): Ueber die Flora von Cannstatt. Flora 39: 609-617
- Schröter, C. u. O. Kirchner (1902): Die Vegetation des Bodensees. Teil II. Schriften Ver. Gesch. Bodensee 31: 1-86
- Schubert, R. u. E. Weinert (1978): Karten der Pflanzenverbreitung im Herzynischen Florengebiet. Hercynia 15 (4): 321-398
- Schubert, R. u. V. Vent (W. Rothmaler Begr.) (1986): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD Band 4, Kritischer Band. Volk und Wissen : 812 S.
- Schubert, R. u. W. Hilbig (1969): Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen. 12. Reihe. Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturw. Reihe 18 (3): 163-210
- Schübler, G. (1822): Systematisches Verzeichnis der bei Tübingen und in den umliegenden Gegenden wildwachsenden phanerogamischen Gewächse mit Angabe ihrer Standorte und Blütezeit. Beilage zu H. F. Eisenbach: Beschreibung und Geschichte der Stadt und Universität Tübingen. C.F. Osiander: 60
- Schübler, G. u. G. von Martens (1834): Flora von Württemberg. Osiander : XXXII + 695
- Schüchen, G. (1972): Zur Ökologie der Quellen und Quellfluren im Einzugsbereich der Schiltach (Mittelschwarzwald). Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 24: 104-144
- Schuhmacher, W. (1977): Flora und Vegetation der Sötenicher Kalkmulde (Eifel). Decheniana 19, I-IV: 1-199, 8 Farbtafeln, 4 Veg.tabellen
- Schuhwerk, F. (1988): Naturnahe Vegetation im Hotzenwald (südöstlicher Schwarzwald). Kurzfassung der Diss., Regensburg (1988): 1-520, Anhang 1-34
- Schuhwerk, F. (1990): Relikte und Endemiten in Pflanzengesellschaften Bayerns - eine vorläufige Übersicht. Ber. Bayer. Bot. Ges. 61: 303-323
- Schuhwerk, F. u. W. Lippert (1991): Vorläufiger Bestimmungsschlüssel für die Hieracien des Bayerisch-Böhmischen Waldes. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 50: 343-407
- Schuldes, H. u. R. Kübler (1990): Ökologie und Vergesellschaftung von *Solidago canadensis* et *gigantea*, *Reynoutria japonica* et *sachalinensis*, *Impatiens glandulifera*, *Helianthus tuberosus*, *Heracleum mantegazzianum*. Ihre Verbreitung in Baden-Württemberg sowie Notwendigkeit und Möglichkeit ihrer Bekämpfung. Studie Minist. Umwelt Bad.-Württemberg : 121 S. u. Anhang
- Schultes, J.A. & J.H. Schultes (1827): Mantissa 3, add. 1 J.C. Cotta : 523-672
- Schultheiß, F.X. (1950-53): Altes und Neues aus der Botanik und deren Geschichte im Bezirk Ellwangen. Ellwanger Jahrbuch 15: 25-55
- Schultheiß, F.X. (1976): Flora von Ellwangen. Ellwanger Jahrbuch 1975/76, 26: 143-212
- Schultz, C.H. (1866): Beitrag zur Geschichte und geographischen Verbreitung der Cassiniaceen des Pollichiagebietes. XXII.-XXIV. Jahresber. der Pollichia, eines naturw. Ver. d. Rheinpfalz. Jahresber. der Pollichia 22-24: 241-295
- Schultz, F. W. (1863): Grundzüge zur Phytostatik der Pfalz. Jahresber. Pollichia 20/21: 99-319

- Schultz, F.W. (1844): Traités sur les plantes et catalogues. Arch. fl. France Allem. 1: 49-63
- Schultz, F.W. (1846): Flora der Pfalz enthaltend ein Verzeichniss aller bis jetzt in der bayerischen Pfalz und den angränzenden Gegenden Badens, Hessens, Oldenburgs, Rheinpreussens und Frankreichs beobachteten Gefässpflanzen. G.L. Lang: 576
- Schultz, F.W. (1861): Über einige Arten und Bastarde von Hieracium und einige Laubmoose. Flora 44 (3): 33-39
- Schultz, F.W. (1868): Carex muricata var β Schkuhr (C. loliacea Schk., non L.) als gute Art aufgestellt. Flora 51: 302-303
- Schultz, F.W. (1868): Etude sur quelques Carex : 1-12, pl. 1-2
- Schultz, F.W. (1870): Bemerkungen über einige Carex. Flora 53 (N.R. 28): 458-460
- Schultz, F.W. (1871): Zusätze und Verbesserungen zu den in der Flora 1870, Nr. 29, Seite 458 bekannt gemachten Bemerkungen über einige Carex und über Pottia cavifolia. Flora 54 (N.R. 29): 21-33
- Schultz, F.W. (1873): Beiträge zur Flora der Pfalz (Schluß). Flora LVI: 247-251
- Schultze-Motel, W. (1967-1977): Ordnung Cyperales. In: Hegi, G. (Begr.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 2, Teil 1: 2-274
- Schultze-Motel, W. (1980): Ordnung Cyperales. In: Hegi, G. (Begr.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Nachträge, Berichtigungen und Ergänzungen. 2, Teil 1: 417-421
- Schulz (1941): Die Vegetation des Drausengebietes Schr. Physikal.-Ökonom. Ges. Knigsberg 72 (1):
- Schulze, G. u. H. Henker (1989): Mecklenburgs Wildrosen (Rosa L.). Bot. Rundbr. Bez. Neubrandenburg 21: 37-56
- Schulze, M. (1894): Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz: 92 Taf. mit Text
- Schulze, M. (1897): Nachträge zu "Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz". Mitt. Thüring. Bot. Ver. 10: 66-87
- Schulze, M. (1898): Weitere Nachträge zu "Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz". Österr. Bot. Zeitschr. 48: 49-53, 109-115
- Schulze, M. (1899): Nachträge zu "Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz"(III). Österr. Bot. Zeitschr. 49: 164-167, 263-270, 296-300
- Schulze, M. (1902): Nachträge zu "Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz"(IV). Mitt. Thüring. Bot. Ver. 17: 37-75
- Schulze, M. (1904): Heimische Orchideen. Mitt. Thüring. Bot. Ver. 19: 101-122
- Schumacher, A. (1937): Floristisch-soziologische Beobachtungen in Hochmooren des südlichen Schwarzwalds. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 2 (1): 221-283
- Schumacher, W. (1980): Schutz und Erhaltung gefährdeter Ackerwildkräuter durch Integration von landwirtschaftlicher Nutzung und Naturschutz. Natur und Landschaft 55: 447-453
- Schurhammer, H. (1929): Sollen Wutach- und Gauchachschlucht Naturschutzgebiete werden? Der Schwarzwald, Monatsbl. Schwarzwaldver. 1929
- Schurhammer, H. (1954): Mimulus guttatus DC. (= M. luteus auct.), die Gauklerblume. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 6 (2): 128-129
- Schuster, R. (1967): Taxonomische Untersuchungen über die Serie Palustre M. Pop. der Gattung Myosotis. Feddes Repertorium 74: 39-98
- Schütz, W. (1992): Struktur, Verbreitung und Ökologie der Fließwasserflora Oberschwabens und der Schwäbischen Alb. Diss. Bot. 192: 195 S. + Anhang
- Schütz, W. (1995): Keimungsökologie von 5 horstbildenden Carex-Arten nasser Standorte. Verh. Ges. Ökol. 24: 155-160
- Schuwerk, F. u. W. Lippert (1991): Vorläufiger Bestimmungsschlüssel für die Hieracien des Bayerisch-Böhmischen Waldes. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 50: 343-407
- Schuwerk, H., Schuwerk, R. u. L. Prager (1990): Centaurea stenolepis A. Kerner in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 61: 229-234

- Schüz, G.E.C.C. (1858, 1861): Flora des nördlichen Schwarzwaldes. A. Öschläger: 64
- Schwab, G. (1823): Die Neckarseite der Schwäbischen Alb, Wegweiser und Reisebeschreibung nebst einem naturhistorischen Anhang von Professor D. Schübler.
- Schwabe, A. (1985): Zur Soziologie *Alnus incana*-reicher Gesellschaften im Schwarzwald unter besonderer Berücksichtigung der Phänologie. *Tuexenia* 5: 413-446
- Schwabe, A. (1987): Fluß- und bachbegleitende Pflanzengesellschaften und Vegetationskomplexe im Schwarzwald. *Diss. Bot.* 102: 368 S. + Anhang
- Schwabe, A. (1990): Syndynamische Prozesse in Borstgrasrasen: Reaktionsmuster von Brachen nach erneuter Rinderbeweidung und Lebensrhythmus von *Arnica montana* L.. *Carolinea* 48: 45-68
- Schwabe, A. (1990): Veränderungen in montanen Borstgrasrasen durch Düngung und Brachlegung: *Antennaria dioica* und *Vaccinium vitis-idaea* als Indikatoren. *Tuexenia* 10: 295-310
- Schwabe, A. u. A. Kratochwil (1985, 1986): Schwarzwurzel- (*Scorzonera humilis*-) und Bachkratzdistel- (*Cirsium rivulare*-) reiche Vegetationstypen im Schwarzwald: Ein Beitrag zur Erhaltung selten werdender Feuchtwiesen-Typen. *Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 61: 277-333
- Schwabe, A. u. P. Mann (1990): Montane Kahlschlagrasen (*Calamagrostis arundinacea*-*Senecio fuchsii*-Ges.) als Elemente von Zippammer (*Emberiza cia*)-Habitaten im Südschwarzwald. *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F.* 15/1: 39-50
- Schwabe, A., A. Kratochwil u. J. Bammert (1989): Sukzessionsprozesse im aufgelassenen Weidfeld-Gebiet des "Bannwald Flüh" (Südschwarzwald) 1976-1988. Mit einer vergleichenden Betrachtung statistischer Auswertemethoden. *Tuexenia* 9: 351-370
- Schwabe-Braun, A. (1979): Die Pflanzengesellschaften des Bannwaldes "Flüh" bei Schönau (Südschwarzwald). In: *Der Bannwald "Flüh": 1-68.* (Hrsg.: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Bad.-Württ.).
- Schwabe-Braun, A. (1980): Eine pflanzensoziologische Modelluntersuchung als Grundlage für Naturschutz und Planung. Weidfeld-Vegetation im Schwarzwald: Geschichte der Nutzung - Gesellschaften und ihre Komplexe - Bewertung für den Naturschutz. *Urbs et Regio* 18: 1-212
- Schwabe-Braun, A. (1982, 1983): Die Heustadel-Wiesen im nordbadischen Murgtal. *Geschichte - Vegetation - Naturschutz. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 55/56 (1982): 167-237
- Schwarz, O. (1974): Globulariaceae. - In: *Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa, überarb. von D. Hartl und G. Wagenitz, Band VI7I, Lieferung 7/8 : 551-558*
- Schwarz, O. (1988): Die Gattung *Globularia*. *Bot. Jahrb. Syst.* 69: 318-373
- Schwarz, O. u. Bässler (1964): *Danthonia decumbens*, ein bemerkenswerter Fall chromosomaler und ökologischer Divergenz Oesterr. *Bot. Z.* 111 (2-3): 201
- Schwarz, O. u. W. Rothmaler (1937): Beiträge zur Flora des westlichen Allgäu. *Rep. spec. nov. reg. veg. (Feddes Repertorium)* 42: 292-304
- Schwarzmaier (1883): Die Flora des Nagolder Schlossbergs. *Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 39: 80-86
- Schwarzmaier (1899): Die Flora des Nagolder Schlossbergs. Ein umgearbeitere Vortrag. *G.W.Zaiser*: 16
- Schwendener, J. (1970): Experimente zur Evolution von *Potentilla procumbens*. *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 79: 49-91
- Schwenkel, H. (1949): Die in den Jahren 1941-1943 in Württemberg eingetragenen Naturschutzgebiete (Nr. 36 bis Nr. 44). *Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege* 18: 48-112
- Schwertschlager, J. (1910): Die Rosen des südlichen und mittleren Frankenjura: 248
- Schwertschlager, J. (1926): Die Rosen Bayerns. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 18: 1-128
- Schwimmer, J. (1958): Neue Seggen und Seggenbastarde in Vorarlberg. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 32: 150-151
- Sebald, O. (1964): Zur Ökologie und Soziologie des Simsenlilie (*Tofieldia calyculata* (L.) Wahl.) im Muschelkalk des oberen Neckarlandes. *Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 118/119: 287-292

- Sebald, O. (1965): Zur Verbreitung der Dünnährigen Segge (*Carex strigosa* Huhs.) im mittleren Neckargebiet. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 120: 298-300
- Sebald, O. (1966): *Carex hartmanii* CAj. und *Carex buxbaumii* Wahlenb. in Nordwürttemberg. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 121: 210-217
- Sebald, O. (1966): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25 00 Blatt 7617 Sulz. Landesvermessungsamt Bad.-Württ. : 107
- Sebald, O. (1974): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25000 Blatt 6923 Sulzbach/Murr. Landesvermessungsamt Bad.-Württ. : 100
- Sebald, O. (1975): Zur Kenntnis der Quellfluren und Waldsümpfe des Schwäbisch-Fränkischen Waldes. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 34: 295-327
- Sebald, O. (1977): Der Arznei-Baldrian (*Valeriana officinalis* agg.) in Württemberg. Jh. Ges. Naturk. Württ. 132: 152-168
- Sebald, O. (1978): Stand der Vegetationskartierung im ehemaligen württembergischen Landesteil und ihre Verwendung bei der Biotop-Kartierung. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 11: 179-189
- Sebald, O. (1980): Über einige interessante Ausbildungen der Vegetation auf moosreichen Felsschutthalden im oberen Donautal (Schwäbische Alb). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 51/52: 451-477
- Sebald, O. (1980): Zur Kenntnis eschen- und sommerlindenreicher Standortsgesellschaften im Wuchsbezirk Südwestliche Donaualb (Schwäbische Alb). Forstwiss. Centralbl. 99: 129-136
- Sebald, O. (1983): Alexander Wilhelm Martini (1702-1781), ein Begleiter J.G. Gmelins auf der Sibirien-Reise und sein Herbarium. Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. A 368: 1-24
- Sebald, O. (1983): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25 000 Blatt 7919 Mühlheim a.d. Donau. Landesvermessungsamt Bad.-Württ. : 87
- Sebald, O. (1989): Das Handbuch der Höheren Pflanzen Baden-Württembergs. Bildung in neuer Sicht. Schriftenr. Minist. Wiss. Kunst Bad.-Württ. 52: 28-35
- Sebald, O. (1992): Beobachtungen auf Dauerquadranten während der Jahre 1980 bis 1990 im Naturschutzgebiet Irndorfer Hardt (Südwestliche Donaualb). Jh. Ges. Naturk. Württ. 147: 97-168
- Sebald, O. (2004): Ein aktueller Fund des Zwergflachs (*Radiola linoides*) in Nordwürttemberg, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 3: S. 53
- Sebald, O. u. S. Seybold (1969): Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland I. Jh. Ges. Naturk. Württ. 124: 222-236
- Sebald, O. u. S. Seybold (1973): Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland III. Jh. Ges. Naturk. Württ. 128: 142-147
- Sebald, O. u. S. Seybold (1978): Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland V. Jh. Ges. Naturk. Württ. 133: 125-132
- Sebald, O. u. S. Seybold (1980): Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland VI. Jh. Ges. Naturk. Württ. 135: 244-252
- Sebald, O. u. S. Seybold (1981): Exkursionsberichte. Berichte Botanischer Zirkel 1: 1-12
- Sebald, O. u. S. Seybold (1981): Exkursionsberichte. Berichte Botanischer Zirkel 2: 1-16
- Sebald, O. u. S. Seybold (1982): Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland VII. Jh. Ges. Naturk. Württ. 137: 99-116
- Sebald, O. u. S. Seybold (1988): Beiträge zur Floristik von Südwest-Deutschland VIII. Jh. Ges. Naturk. Württ. 143: 185-207
- Sebald, O., R. u. S. Seybold u. W. Wrede (1966): Zur Verbreitung der Rasen-Segge (*Carex caespitosa* L.) in Württemberg. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 121: 218-220
- Sebald, O., S. Seybold, G. Philippi (1990): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs Band 1. Eugen Ulmer: 624
- Sebald, O., S. Seybold u. G. Philippi (1990): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs Band 2 Eugen Ulmer : 442

- Sebald, O., S. Seybold u. G. Philippi (1992): Die Farn- und Blütenpflanzen Badem Württembergs Band 3. Eugen Ulmer: 483
- Sebald, O., S. Seybold u. G. Philippi (1992): Die Farn- und Blütenpflanzen Badem Württembergs Band 4. Eugen Ulmer : 362
- Sebald, O., S. Seybold, G. Philippi, A. Wörz (1996): Die Farn- und Blütenpflanzen Badem Württembergs Band 5. Eugen Ulmer: 539
- Sebald, O., S. Seybold, G. Philippi, A. Wörz (1996): Die Farn- und Blütenpflanzen Badem Württembergs Band 6. Eugen Ulmer: 577
- Sebald, O., S. Seybold, G. Philippi, A. Wörz (1998): Die Farn- und Blütenpflanzen Badem Württembergs Band 7. Eugen Ulmer: 595
- Sebald, O., S. Seybold, G. Philippi, A. Wörz (1998): Die Farn- und Blütenpflanzen Badem Württembergs Band 8. Eugen Ulmer: 540
- Segal, S. u. V. Westhoff (1959): Die vegetationkundliche Stellung von *Carex buxbaumii* Wahlenberg in Europa, besonders in den Niederlanden. Acta Bot. Neerl. 8: 304-329
- Seibert, P. (1962): Die Auenvegetation an der Isar nördlich von München und ihre Beeinflussung durch den Menschen. Landschaftspflege u. Vegetationskunde 3: 1-123
- Seibert, P. (1988): Vaccinio-Piceetea. In: Oberdorfer, E. (Hrsg.) (1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Teil IV, Wälder und Gebüsche: 53-80
- Seibig, A. (1976): Zum Vorkommen von *Scutellaria minor* Huds. in Hessen. Hess. Flor. Briefe 25 (4): 69-72
- Seidel, F. u. H. Kating (1967): Anbauversuche mit *Arnica*-Arten. I. Generative Vermehrung von *Arnica montana* L. Planta Medica 15: 293-305
- Seigler, D.S., D.H. Wilken u. J.J. Jakupcak (1974): Chemical Data Related to the Tribal Affinities of Hulsea and Arnica. Biochemical Systematics and Ecology 2: 21-24
- Seitz, B.-J. (1989): Beziehungen zwischen Vogelwelt und Vegetation im Kulturland. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 54: 1-236
- Seitz, H. M. (1976): Symbiotische Samenkeimung bei europäischen Orchideen. Proceed. 8. World Orchid Conf. Frankfurt 1975 : 343-350
- Seiz, G. (1893): Zur Flora des Hohenstaufen. Bl. Schwäb. Albver. 5: 227
- Sell, P.D. (1975): Taxonomic and nomenclatural notes on the Compositae Subfam. Cichorideae. - In: Heywood, A. V. H.: Flora Europaea Notulae Systematicae ad Floram Europaeam spectantes No. 19. J. Linn. Soc., Bot. 71 (4): 235-267
- Sendtner, O. (1854): Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns
- Senghas, K. (1966): Beobachtungen zur Gattung *Epipactis* in Mitteleuropa. Die Orchidee 17: 122-124
- Seubert, E. (1993): Die Samen der Araceen und ihre Bedeutung für die Gliederung der Familie Koeltz : 433
- Seubert, M. (1863): Excursionsflora für das Großherzogthum Baden. E. Ulmer: 244
- Seubert, M. (1868): Exkursionsflora für das südwestliche Deutschland
- Seubert, M. (1875): Flora des Großherzogtums Baden. E. Ulmer: 258
- Seubert, M. u. K. Prantl (1880): Excursionsflora für das Großherzogthum Baden. E. Ulmer: 376
- Seubert, M. u. K. Prantl (1885): Exkursionsflora für das Großherzogtum Baden. E. Ulmer: 420
- Seubert, M. u. L. Klein (1891): Exkursionsflora für Baden. E. Ulmer: 434
- Seubert, M. u. L. Klein (1905): Exkursionsflora für das Großherzogtum Baden. E. Ulmer : VIII + (44) + 454
- Seybold, S. (1967): Neue Mistelfunde im mittleren Neckarland. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 122: 129-135
- Seybold, S. (1969): Flora von Stuttgart. E. Ulmer: 160

- Seybold, S. (1972): Über die Verbreitung von *Ballota alba* in Württemberg. Gött. Flor. Rundbr. 6 (1): 3-7
- Seybold, S. (1973): Der Salzschwaden (*Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.) an Bundesstraßen und Autobahnen. Göttinger Florist. Rundbriefe 7: 70-73
- Seybold, S. (1973): Die Verbreitung des Schneeglöckchens, *Galanthus nivalis* L., in Baden-Württemberg und das Problem seiner Urwüchsigkeit. Veröff. Naturschutz Landschaftspfl. Bad.-Württ. 41: 63-87
- Seybold, S. (1976): Wandel der Pflanzenwelt der Äcker und der Ruderalflora in jüngerer Zeit. Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. C 5: 17-28
- Seybold, S. (1977): Die aktuelle Verbreitung der höheren Pflanzen im Raum Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 9: 201
- Seybold, S. (1978): Auswertung von Arealkarten für den Artenschutz am Beispiel der Flora von Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 11: 41-53
- Seybold, S. (1978): Die Verbreitung des Märzenbechers (*Leucojum vernum*) im Raum Württemberg. Veröff. Natursch. Landschaftspfl. Bad.-Württ. 47/48: 205-229
- Seybold, S. (1981): Die Aquarellsammlung von Josef Ruppert (1864-1935). Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 13(3): 267-284
- Seybold, S. (1983): Orchideenfundangaben aus dem sechzehnten Jahrhundert. Der Beginn der Floristik in Baden-Württemberg. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 15(4): 479-502
- Seybold, S. (1986): Die Orchideen des Leonhart Fuchs: 135
- Seybold, S. (1987): Die Wiederentdeckung des Frauenschuh (*Cypripedium calceolus* L.). Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 19(4): 841-852
- Seybold, S. (1987): Valerius Cordus (1515-1544), einer der frühesten Floristen in Südwestdeutschland. Jh. Ges. Naturk. Württ. 142: 143-155
- Seybold, S. (1990): Luca Ghini, Leonhart Rauwolf und Leonhart Fuchs. Über die Herkunft der Aquarelle im Wiener Kräuterbuchmanuskript von Fuchs. Jahresh. Ges. Naturk. Württ. 145: 239-264
- Seybold, S. (1994): Die aktuelle Ausbreitung des Klebrigen Alants (*Dittrichia graveolens*) in Baden-Württemberg. Flor. Rundbr. 28 (1): 25-28
- Seybold, S. (1994): Die ältesten Pflanzenangaben von Baden-Württemberg aus der Literatur. Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. A 514: 18
- Seybold, S. (2001): Südwestdeutsche Floristik in Vergangenheit und Zukunft, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 1: S. 5-9
- Seybold, S. u. Th. Müller (1972): Beitrag zur Kenntnis der Schwarznessel (*Ballota nigra* agg.) und ihrer Vergesellschaftung. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 40: 51-128
- Seybold, S., O. Sebald u. C.P. Herr (1971): Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland II. Jh. Ges. Naturk. Württ. 126: 256-269
- Seybold, S., O. Sebald u. W. Winterhoff (1975): Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland IV. Jh. Ges. Naturk. Württ. 130: 249-259
- Seybold, S., W. Kreh, K. Sieb u. R. Seybold (1968): Flora von Stuttgart. (auch als Buch, s. Seybold 1969). Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 123: 140-297
- Shimotomai, N. (1938): Chromosomenzahlen bei einigen Arten von *Chrysanthemum*. Zeitschrift für induktive Abstammungs- u. Vererbungslehre 74: 30-33
- Shinners, L. H. (1956): Illegitimacy of Persoon's species of *Koeleria* (Gramineae). *Rhodora* 57: 93-96
- Sihler, M. (1959/60): Zur Gliederung der südwestdeutschen Thymus-Arten. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 27/28: 62-75
- Sillmann, M. (1989): Die verkohlten Pflanzenreste aus einem mittelalterlichen Grubenhaus in Ditzingen, 12. Jahrhundert. Unveröff. Dipl.-Arb. Univ. Hohenheim: 82
- Sillmann, M. (1992): Nahrungspflanzen aus der Latrine 10 in Freiburg, Gauchstraße. - Die Stadt um 1300. Katalog zur Ausstellung

- Silverside, A. J. (1990): The nomenclature of some hybrids of the *Spiraea salicifolia* group naturalized in Britain. *Watsonia* 18: 147-151
- Simon, Ch. (1974): *Bidens subalternans* DC. in Europa. *Bauhinia* 5 (2): 105-108
- Simon, M. (1988): Observations floristiques dans les terrains agricoles inondables en Alsace. *Bull. Assoc. philomath. Alsace et Lorraine* 24: 69-97
- Simon, M. u. F. Geissert (1984): *Lindernia procumbens* (= *L. pyxidaria*), une plante alsacienne. *Bull. Soc. bot. Centre-Ouest, N.S.* 15: 27-34
- Simpson, D. (1995): Relationships within Cyperales. In: Rudall, D., P.J. Cribb, D.F. Cutler u. C.J. Humphries (eds.): *Monocotyledons, systematics and evolution*: 497-509
- Sirjaev, G. (1925): *Onobrychis generis revisio critica. Pars prima*. Publications de la Faculté des sciences de l'Université Masaryk
- Sirjaev, G. (1932): *Generis Ononis L. revisio critica*. *Bot. Centralbl.* 49: 381-665
- Sjörger, E. (1964): Epilithische und epigäische Moosvegetation in Laubwäldern der Insel Öland (Schweden) *Acta Phytogeogr. Suec.* 48: 188
- Skalicky, V. (1959): Einige taxonomische und phytogeographische Bemerkungen zu den tschechoslowakischen Arten der Gattung *Anthericum* L. *Acta Univ. Carol. Biol.* 2: 117-157
- Skalicky, V. (1962): Ein Beitrag zur Erkenntnis der europäischen Arten der Gattung *Agrimonia* L. *Acta Horti Bot. Pragensis* 1962: 87-108
- Skalinska, M. (1947): Polyploidy in *Valeriana officinalis* Linn. in relation to its ecology and distribution. *J. Linn. Soc., Bot.* 53: 159-186
- Skalinska, M. u. E. Kubien (1972): Cytological and embryological studies in *Hieracium pratense* Tausch. *Acta Biol. Cracov., Ser. Bot.* 15: 39-50
- Skogen, A. (1973): Phytogeographical and ecological studies on *Carex paniculata* L. in Norway. *Arb. Univ. Bergen, Math.-Nat. Ser.* 1972 (3): 1-12
- Slavík, B. (1966): Pflanzengeographische Studie über die Art *Lactuca perennis* L. *Folia Geobot. Phytotax.* 1: 26-69
- Slavík, B. (1974): Verbreitung von *Senecio fluviatilis* Wallr. in der Tschechoslowakei. *Preslia* 46: 234-245
- Slavík, B. (1993): *Leucanthemella serotina* (Asteraceae), ein pannonisch-danubialer Endemit. *Preslia* 65: 293-302
- Slavikova, Z. (1963): The systematic position of the species *Galeopsis bifida* Boenn. *Acta Universitatis Carolinae - Biologica* 1963 (3): 255-263
- Sleumer, H. (1933): Die Pflanzenwelt des Kaiserstuhls. - In: *Der Kaiserstuhl, eine Naturgeschichte des Vulkangebirges am Oberrhein*: 158-268
- Sleumer, H. (1934): Die Pflanzenwelt des Kaiserstuhls. *Rep. spec. nov. reg. veg. (Feddes Repertorium)* 77: 1-170
- Sleumer, H. (1935): Neue Pflanzenstandorte aus Baden. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F.* 3 (13/14): 181-183
- Sleumer, H. (1936): Neue Hieracienstandorte aus Baden. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F.* 3: 210-213
- Small, E., P. Lassen u. B.S. Brookes (1987): An expanded circumscription of *Medicago* (Leguminosae, Trifolieae) based on explosive flower tripping. *Willdenowia* 16: 415-437
- Smejkal, M. (1961): Taxonomische Studien der Art *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. briq. in der Tschechoslowakei. *Preslia* 33: 386-398
- Smejkal, M. (1975): *Galeobdolon argentatum* sp. nova, ein neuer Vertreter der Kollektivart *Galeobdolon luteum* (Lamiaceae). *Preslia* 47: 241-248
- Smettan, H. (1981): *Anthoxanthum alpinum* Löve & Löve am Feldberg/Schwarzwald. *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F.* 12: 267-268
- Smettan, H. (1995): Steifgras (*Catapodium rigidum* (L.) C.E. Hubbard) und Pariser Labkraut (*Galium parisiense* L.) auf den Fildern/Württemberg. *Jahresh. Ges. Naturk. Württ.* 151: 385-391

- Smettan, H. W. (2003): Die Fremde Bibernelle (*Pimpinella peregrina*) im Neckarland/Württemberg, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 2: S. 107-111
- Smettan, H.W. (1994): Das Alpen-Labkraut (*Galium anisophyllum* Vill.) in Baden-Württemberg. Jh. Ges. Naturk. Württ. 150: 129-136
- Smettan, H.W. (1985): Pollenanalytische Untersuchungen zur Vegetations- und Siedlungsgeschichte der Umgebung von Sersheim, Kreis Ludwigsburg. Fundber. Bad.-Württ. 10: 367-421
- Smettan, H.W. (1990, 1991): Die Gipskeuperdolinien in der Umgebung von Sersheim, Kreis Ludwigsburg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66: 251-310
- Smettan, H.W. (1992): Pollenanalysen in der alten lauffener Neckarschlinge, Kreis Heilbronn. Jh. Ges. Naturk. Württ. 147: 169-206
- Smith, A.J.E. (1972): *Prunella* L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 162
- Smith, J.E. (1831): English Botany, Supplement Vol. 1 (*Elatine hydropiper* L. tab. 2670 bearbeitet von J.E. Bowman)
- Smith, P.M. (1968): The *Bromus mollis* aggregate in Britain *Watsonia* 6 (6): 327-344
- Smith, P.M. (1970): Taxonomy and nomenclature of the Brome-grasses (*Bromus* L. s. l.) Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 30 (2): 361-375
- Smith, P.M. (1973): Observations on some critical Bromegrasses *Watsonia* 9 (4): 319-332
- Smith, P.M. (1981): Ecotypes and subspecies in annual brome-grasses (*Bromus*, Gramineae) Bot. Jahrb. Syst. 102 (1-4): 497-509
- Soderstrom, T.R. & J.H. Beaman (1968): The genus *Bromus* (Gramineae) in Mexico and Central America. Publ. Mus. Michigan State Univ. (Biol. Ser.) 3 (5): 465-520
- Soó, R. (1972): Systematisch-nomenklatorische Bemerkungen zur Flora Mitteleuropas mit Beziehungen zur südosteuropäischen Flora. Feddes Repertorium 83: 129-212
- Soó, R. von (1960): Synopsis generis *Dactylorhiza* (*Dactylorchis*). Ann. Univ. Sci. Budapest, Sect. Biol. 3: 335-357
- Soó, R. von (1962): Nomina nova generis *Dactylorhiza*: 10
- Soó, R. von u. O. Borsos (1962): Die *Melittis*-Arten und Formen der ungarischen und karpatischen Flora. I. Ann. Univ. Sci. Budapest 7: 157-167
- Spatz, G. (1983): Vegetationsänderungen auf Almen durch differenzierte Nutzung und deren Nachwirkungen. *Tuexenia* 3: 325-330
- Spenner, F.C.L. (1825-1829): *Flora Friburgensis et regionum proxime adjacentium*. 3 Bände. F. Wagner: 1088
- Speta, F. (1971): Beitrag zur Systematik von *Scilla* L. subgen. *Scilla* (inklusive *Chionodoxa* Boiss.) Österr. Botan. Zeitschr. 119: 6-18
- Speta, F. (1974): Cytotaxonomische und arealkundliche Untersuchungen an der *Scilla bifolia*-Gruppe in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien. Naturkundl. Jahrbuch der Stadt Linz 1973 : 9-54
- Speta, F. (1975): Über *Chionodoxa* Boiss., ihre Gliederung und Zugehörigkeit zu *Scilla* L. Naturkundl. Jahrb. Stadt Linz 21: 9-79
- Speta, F. (1976): Auf den Spuren von *Scilla amoena* L. Naturkundl. Jahrb. Stadt Linz 22: 73-102
- Speta, F. (1976): Cytotaxonomischer Beitrag zur Kenntnis der *Scilla nivalis*-Gruppe. Linzer Biol. Beitr. 8/1: 293-322
- Speta, F. (1980): Die frühjahrsblühenden *Scilla*-Arten des östlichen Mitteleerraumes. Naturkundl. Jahrb. Stadt Linz 25: 19-198, T. I-XXXI
- Speta, F. (1982): Über die Abgrenzung und Gliederung der Gattung *Muscari*, und über ihre Beziehungen zu anderen Vertretern der Hyacinthaceae Bot. Jahrb. Syst. 103 (2): 247-291
- Speta, F. u. F. Grims (1980): Hieronymus Harder und sein "Linzer" Herbarium aus dem Jahre 1599. Linzer biol. Beitr. 12 (1): 307-330
- Sprague, T.A. (1952): The british forms of *Valeriana officinalis*. *Watsonia* 2: 145-148

- Sprague, T.A. u. E. Nelmes (1931): The herbal of Leonhart Fuchs J. Linn. Soc. London 48: 545-642
- Sprengel, C. K. (1793): Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen: 444
- Sprenger, P. S. (1597): Hortio medici Catalogus: 44
- Ssymank, A. (1991): Das Vegetationsmosaik eines Waldgebietes der Emmendinger Tafelbergzone bei Freiburg. Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br. 79: 219-290
- Stace, C. A. (1975): Hybridization and the flora of the British Isles: 626
- Stace, C. A. (1991): New Flora of the British Isles. Univ. Press: 1226
- Stafleu, F.A. u. R.S. Cowan (1976): Taxonomic literature. 2nd. ed. Vol. 1-7. Bohn, Scheltema & Holkema
- Stahl, H. (1989): Zur Entwicklung einer Population von *Ophrys apifera* im Stadtgebiet von Stuttgart. Mitt. Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 21(4): 1015-1039
- Stahl, H. (1993): Zur Entwicklung einer Population von *Ophrys apifera* im Gebiet von Stuttgart (Teil2). Mitt. Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 25(3): 368-384
- Stahl, J.F. (1769): Arboretum et fruticetum Wurtembergicum. Oder Verzeichniß der in Württembergischen Wäldern und Gärten wachsenden Bäumen, Stauden, Gesträuchen und einigen Pflanzen. Mit beygesetzten verschiedenen Nahmen, die ihnen in dieser und anderer Revier beygelegt werd en. Discat qui nescit, nam sic Sapiencia crescit. Ein Versuch. Allg. ökonom. Forstmagazin 12: 241-251
- Stählin, A. u. A. Eren (1973): Beziehungen zwischen Standortsfaktoren, morphologischen Merkmalen und physiologischen sowie der Chromosomenzahl bei der Wiesenrispe (*Poa pratensis* L.) Z. Acker- u. Pflanzenbau 138: 197-219
- Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland (1993): Flor. Rundbr. 3: 1-480
- Stark, G. (2001): Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste (94-96). Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 79
- Stark, P. (1912): Beitrag zur Kenntnis der eiszeitlichen Fauna und Flora. Diss. Freiburg. :
- Stark, P. (1927): Die Moore des badischen Bodenseegebietes. II. Das Areal um Hegne, Dettingen, Kaltbrunn, Mindelsee, Radolfzell und Espasingen. Ber. Naturf. Ges. Freiburg 28 (1): 1-238
- Stärr, A. (in Zusammenarbeit mit P. Banzhaf et al.) (1993): Neufassung der Gefährdungsgrade von felsbesiedelnden Farn- und Blütenpflanzen der Schwäbischen Alb. - Eine auf Felsbiotope bezogene Rote Liste., unveröff. Gutachten: 10
- Stearn, W. T. (1947): The nomenclature and synonymy of *Tofieldia calyculata* und *T. pusilla*. Journal Linnean Society 53: 194-204
- Stebbins, G.L. (1972): The Evolution of the Grass Family. In: Youngner & McKell. The biology and utilization of grasses: 17
- Steck-Blaser, B. (1992): Karyologische Untersuchungen an *Muscari comosum*, *M. botryoides* und *M. racemosum* im Gebiet der Schweiz Bot. Helv. 102: 211-227
- Steere, W.C., (General Editor) (1967): Wild Flowers of The United States. Volume One: The Noreastern States. Part Two of Two parts (Hrsg.: New York Botanical Garden). Mc Graw-Hill Book Company: 559
- Stehle, J. (1869): Verzeichnis neuaufgefundener Pflanzenstandorte aus der Flora von Donaueschingen. Verh. Naturwiss. Ver. Karlsruhe 3: 101-103
- Stehle, J. (1883): In: Neue Standorte. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (6/7): 74-76
- Stehle, J. (1884): In: Neue Standorte. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (11, 17): 105-108, 153-154
- Stehle, J. (1884): Wanderungen im unteren Wutachthale und auf den angrenzenden Höhen. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (16): 145-147
- Stehle, J. (1887): In: Neue Standorte. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (34): 303

- Stehle, J. (1895): Standorte seltener Pflanzen aus der Umgebung von Freiburg. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3 (136): 323-330
- Steiger, J. (1970): Die Unterscheidung der schweizerischen *Pinguicula*-Arten. Beitr. zur Kartierung der Schweizer Flora 3: 1-8
- Stein, E. (1886): Beitrag zur Kenntnis der Brombeeren Württembergs. Süddeutsche Apotheker-Zeitung 26 (16) 15.4.1886: o.S.
- Stein, W. (1884): Zur Flora der Taubergegend. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (14): 123-130
- Steinbrück, G., M. Schlegel, J. Dahlström u. B. Röttger (1986): Characterization of intraspecific hybrids between *Orchis mascula* L. and *O. pallens* L. (Orchidaceae) by enzyme electrophoresis. Pl. Syst. Evol. 153: 229-241
- Steiner, L. u R. Buchwald (1991): Vegetationskundliche und hydrochemische Untersuchungen im Naturschutzgebiet "Bisten" (Südschwarzwald). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66: 363-408
- Stepankova, J. (1993): Ploidy Variation in the Group of *Myosotis palustris* and *M. laxa* in the Czech Republik and Slovakia. Folia Geobot. Phytotax. 28: 113-128
- Sterk, A.A. (1987): Aspects of the population biology of sexual dandelions in the Netherlands. - In: Huiskens, A. H. L. et al.: Vegetation between Land and Sea: Structure and Processes: 284-290. Junk
- Sterk, A.A., C. Hommels, M. Jenniskens, J. Neuteboom, J. Den Nijs, P.Osterveld u. S. Segal (1987): Paardebloemen: planten zonder vader. Koninklijke Nederlandse Natuurhistor. Vereniging: 348
- Stern, F.C. (1956): Snowdrops and snowflakes, a study of the genera *Galanthus* and *Leucojum*. The royal Horticult Soc. : 128 S.
- Sternberg, C. von (1822): Revisionis *Saxifragarum* iconibus illustratae supplementum. C.E. Brenck
- Sternberg, K. M. Graf von (1822): Revisionis *Saxifragarum* Supplementum 1: I-VI, 1-16, tab. 1-10; Regensburg.
- Stevanovic, V., M. Niketic u. D. Lakusic (1991): Chorological additions to the flora of eastern Yugoslavia. Flora Mediterranea 1: 121-142
- Stewart, O. M. (1994): *Aira caryophyllea* ssp. *caryophyllea* & ssp. *multiculmis*. B.S.B.I. News 38: 8-9
- Stika, H.-P. (1988): Die vorgeschichtlichen Pflanzenreste aus der archäologischen Ausgrabung Heilbronn-Klingenberg. Unveröff. Dipl.-Arb. Univ. Hohenheim: 229
- Stika, H.-P. (1991): Die paläoethnobotanische Untersuchung der linearbandkeramischen Siedlung Hilzingen im Hegau, Kreis Konstanz. Fundber. Bad.-Württ. 16
- Stika, H.-P. (1993): Beiträge zu Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt in den römischen Provinzen Obergermanien und Rätien aufgrund botanischer Untersuchungen von Makroresten aus archäologischen Ausgrabungen in Baden-Württemberg. Diss. Univ. Innsbruck: 204, Beil.
- Stika, H.-P. (1995): Römerzeitliche Kultur- und Nutzpflanzenreste aus Baden-Württemberg. Jh. Ges. Naturkunde Württ. 151: 393-427
- Stika, H.-P. (1996): Vorgeschichtliche Pflanzenreste aus Hilbronn-Klingenberg. Materialh. Archäol. Bad.-Württ. 34: 128
- Stodiek, Elisabeth (1937): Soziologische und ökologische Untersuchungen an den xerotopen Moosen und Flechten des Muschelkalks in der Umgebung Jenas. Feddes Repertorium
- Stoffler, H.-D. (1957): Zur Kenntnis der Tannen-Mischwälder auf Tonböden zwischen Wutach und Eyach Karlsruhe Beitr. naturk. Forsch. Südwestdeutschland 35: 354-370
- Stoffler, H.D. (1978): Der Hortulus des Walahfrid Strabo. Aus dem Kräutergarten des Klosters Reichenau. Thorbecke
- Stohr, G. (1955): Der Formenkreis der *Festuca ovina* L. im mitteldeutschen Trockengebiet. Wiss. Z. Univ. Halle, Mathe.-Nat. 4: 729-746
- Stohr, G. (1960): Gliederung der *Festuca ovina*-Gruppe in Mitteldeutschland unter Einschluß einiger benachbarter Formen. Wiss. Z. Univ. Halle, Mathe.-Nat. 9 (3): 393-414

- Stöhr, H. u. S. Seybold (1974): Entwicklung und Erhaltung der Vegetation des Kappelbergs bei Fellbach. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 42: 43-51
- Stork, I. u. M. Rösch (1993): Zum Fortgang der Untersuchungen im frühmittelalterlichen Gräberfeld Adelshof und in der Hofgrablege bei Lauchheim, Ostalbkreis. Arch. Ausgr. 1992: 231-243
- Straka, H. (1962): Die Fangblase von *Utricularia* als Kohäsionsmechanismus mit aktiver Wasserabgabe. Handbuch der Pflanzenphysiologie (Hrsg.: Ruhland, W.) XVII, 2: 767-773
- Straub, S. (1893): Die Flora des Rosensteins zwischen Heubach und Lautern. Blätter des Schwäbischen Albvereins V: 78-79, 170-171, 182-184
- Straub, S. (1901): Die Vegetationsverhältnisse des Bezirks Gmünd. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 57: LXVII
- Straub, S. (1903): Exkursions-Flora des Bezirks Gmünd. Muth: 216
- Strauss, J. (1986): *Tellima grandiflora* auch in Wolfsburg. Gött. Flor. Rundbr. 19 (2): 102-103
- Strey, M. (1931): Karyologische Studien an *Boraginoideae*. Planta 14: 682-730
- Strimmer, A. (1974): Die Steppenvegetation des mittleren Vinschgaus (Südtirol; Italien). WagnerBer. Nat.-Med. Ver. Innsbruck 61: 7-42
- Stroh, G. (1936): *Valeriana L.* Provisorische Liste der altweltlichen Arten. Feddes Repertorium 40: 225-233
- Ströhle, W. u. S. Hammel (1993): Die Orchideen des Landkreises Ludwigsburg. Ergebnisse der Kartierung in den Jahren 1985-1992. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 25(2): 167-294
- Stuart, D. (1965): *Muscari* and allied Genera Lily Year-Book 29: 125-138
- Stuart, D. (1970): Chromosome numbers in the genus *Muscari* Mill. Notes Roy. Bot. Gard. 30: 189-196
- Sturm, F.W. (1823): Versuch einer Beschreibung von Schwenningen in der Baar am Ursprung des Neckars in geognostischer, landwirtschaftlicher und medicinischer Beziehung. C.F. Osiander : VI + 120
- Succow, F.G.L. (1821, 1822): Flora Mannhemiensis et vicinarum regionum Cis - et Transrhenanarum Pars I und Pars II. Schwann & Götz
- Suck, R. u. N. Meyer (1990): Zur Verbreitung und Soziologie von *Sorbus franconica* J. Bornm. ex Düll und *Sorbus pseudothuringiaca* Düll in Franken. Ber. Bayer. Bot. Ges. 61: 181-198
- Suck, R. u. N. Meyer (1991): Zur Problematik einiger (sub-)endemischer Gefäßpflanzenarten in Bayern. Schriftenreihe Bayer. Landesamt für Umweltschutz 102: 19-31
- Suessenguth, A. (1922): Die Veränderung des Florenbildes von Bayern in historischer Zeit. Ber. Bayer. Bot. Ges. 17: 18-58
- Suessenguth, K. (1939): *Fritillaria L.* In: G. Hegi: Illustrierte Flora von Mittel-Europa. C.Hanser 2: 300-304
- Suessenguth, K. (1939): *Orchidaceae* Knabenkräuter. In: G. Hegi: Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz. II, Teil II: 408-524
- Suessenguth, K. u. K. Ronninger (1942): Über *Orobanche alsatica* Kirschl. var. *Mayeri* Sues. et Ronn.. Beitr. Naturk. Forsch. Oberrheingeb. 7: 123-127
- Sukopp, H. u. H. Scholz (1968): *Poa bulbosa L.*, ein Archäophyt der Flora Mitteleuropas. Flora, Abt. B 157: 494-526
- Sukopp, U. (1994): *Anthoxanthum aristatum* Boiss. - Grannen-Ruchgras. In: Schneider, Ch., U. Sukopp und H. Sukopp: Biologisch-ökologische Grundlagen des Schutzes gefährdeter Segetalpflanzen. Schriftenreihe Vegetationskunde 26: 26-53
- Sündermann, F. (1909): Zur Flora des Bodenseegebiets. *Saxifraga oppositifolia* var. *amphibia* m. Mitt. Bayer. Bot. Ges. 2 (11): 190-192
- Sundermann, H. (1970,1975,1980): Europäische und mediterrane Orchideen. Eine Bestimmungsflora mit Berücksichtigung der Ökologie. 1. Aufl. 224, 2. Aufl. 243, 3. Aufl. 279

- Suter, J.R. (1802): Flora Helvetica. Vol. II. Turici.
- Sutory, K. (1988): Variability and distribution of *Cynoglossum germanicum* Jacq. (Boraginaceae) in western and central Europe. *Acta Musei Moraviae/Scientiae naturales* 73 (1/2): 149-167
- Svensson, B.M., B.A. Carlsson, P.S. Karlsson u. O. Nordell (1993): Comparative long-term demography of three species of *Pinguicula*. Oxford London Edinburgh Boston Melbourne Paris. *J. Ecol.* 81 (4): 635-645
- Svensson, R. u. M. Wigren (1986): Sminkrotens historia och biologi i Sverige. *Svensk Bot. Tidskrift* 80 (2): 107-131
- Szabo, Z. (1934): Nouvelles données à la connaissance des *Knautia* de l'ouest et du sud de l'Europe. *Bot. Közl.* 31: 109-141
- Täckholm, V. u. M. Drar (1954): Flora of Egypt Vol. III.: 644
- Tausch (1828): Bemerkungen über *Hieracium* und einige verwandte Gattungen. *Flora* 11: 49-81
- Taylor, F.J. (1956): *Carex flacca*. In: Biological Flora of the British Isles. *J. Ecol.* 44: 281-296
- Taylor, P. (1972): *Utricularia* L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press
- Taylor, P. (1989): The genus *Utricularia* - a taxonomic monograph. *Kew Bulletin Additional Series* (Hrsg.: Royal Botanic Garden, Kew) XIV: XI+724
- Temesy, E. (1957): Der Formenkreis von *Saxifraga stellaris* L. *Phyton* 7: 40-141
- Teppner, H. (1970): Karyotypen europäischer, perennierender Sippen der Gramineen-Gattung *Anthoxanthum*. *Österr. Bot. Z.* 118: 280-292
- Teppner, H. u. E. Klein (1990): *Nigritella rhellicana* spec. nova und *N. nigra* (L.) Rchb.f. s. str. (Orchidaceae- Orchideae). *Phyton* 31(1): 5-26
- Teppner, H., F. Ehrendorfer u. C. Puff (1976): Karyosystematic Notes on the *Galium palustre*-Group (Rubiaceae). *Taxon* 25 (1): 95-97
- Terrell, E. E. (1976): The correct names for Pearl Millet and Yellow Foxtail. *Taxon* 25: 297-304
- Terrell, E.E. (1968): A taxonomic revision of the genus *Lolium*. *Techn. Bull.* 1392 *Agricult. Research Service, U.S.Dep. Agricult.*I-II 1392: 1-65
- Teschner, W. (1980): Sippendifferenzierung und Bestäubung bei *Himantoglossum* Koch. *Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal* 33: 104-115
- Thellung, A. (1903): Beiträge zur Freiburger Flora. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 4 (184): 295-296
- Thellung, A. (1904): Neue Standorte. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 4 (200): 418-420
- Thellung, A. (1905): Neue Arten (Ankömmlinge u. Bastarde). *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 5 (207): 51-52
- Thellung, A. (1907): Funde von seltener verwildernden Zier- und Nutzpflanzen im Gebiet der Flora von Freiburg i.Br. *Allg. Bot. Z. Syst.* 13 (4): 60
- Thellung, A. (1908): Zur Freiburger Adventivflora. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 5 (224): 186-187
- Thellung, A. (1911): Nachträge zu: Kirchner und Eichler, Exkursionsflora für Württemberg und Hohenzollern (1900). *Allg. Bot. Z. Syst.* 17: 34-35
- Thellung, A. (1913): Neue Standorte. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg* 6 (284-286): 224-226, 280-281
- Thellung, A. (1915): Über die in Mitteleuropa vorkommenden *Galinsoga*-Formen. *Allg. Bot. Z. Syst.* 21 (1-4): 1-16
- Thellung, A. (1919): Mitteilungen aus dem botanischen Museum der Universität Zürich LXXXIII. Beiträge zur Adventivflora der Schweiz III. *Vierteljahresschrift der Naturforschenden Ges. in Zürich* LXIV: 684-815
- Thellung, A. (1925): Floristische Beobachtungen um Freiburg. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F.* 1 (16/17): 366-367
- Thellung, A. (1928): *Eragrostis Damiensiana* Ed. Bonnet. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 24: 323-332
- Theodor, J. (1588-1591): *Neuw Kreuterbuch mit schönen künstlichen und leblichen Figuren und Konterfeyten alles Gewächss der Kreuter.* 2 Teile. N. Bassaeus

- Thomas, P. (1989): Schutzwürdige Grünlandgesellschaften und Grünlandpflanzen in der nordbadischen Rheinaue, unter besonderer Berücksichtigung der Stromtalarten. - Untersuchung im Auftrag der LfU.: 241
- Thomas, P. (1990): Grünlandgesellschaften und Grünlandbrachen in der nordbadischen Rheinaue. Diss. Bot. 162: 257
- Thomas, P., M. Dienst, M. Peintinger u. R. Buchwald (1986, 1987): Die Strandrasen des Bodensees (*Deschampsietum rhenanae* und *Littorello-Eleocharitetum acicularis*). Verbreitung, Ökologie, Gefährdung und Schutzmaßnahmen. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 62: 325-346
- Thomma, R. (1972): Pflanzenstandorte vom Hochrheingebiet, Südschwarzwald und Klettgau. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 10: 549-557
- Thommen, E. (1940): Über *Trifolium patens* Schreber in der Westschweiz. Verh. Naturf. Ges. Basel 51: 105-109
- Thommen, F.B. (1990): Taxonomical-ecological studies on Swiss *Drosera* species. Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel 56: 150-174
- Thor, G. (1979): *Utricularia* i Sverige, speciellt de förbisedda artena *U. australis* och *U. ochroleuca*. Svensk Bot. Tidskrift 73 (5): 381-395
- Thor, G. (1987): Sumpbläddra, *Utricularia stygia*, en ny svensk art (*Utricularia stygia* Thor, a new *Utricularia* species in Sweden). Svensk Bot. Tidskrift 81 (5): 273-280
- Thor, G. (1988): The genus *Utricularia* in the Nordic countries, with special emphasis on *U. stygia* and *U. ochroleuca*. Nord. J. Bot. 8: 213-225
- Thorne, R.F. (1983): Proposed new realignments in the angiosperms. Nord. J. Bot. 3: 85-117
- Timonen, T. (1993): Synflorescence structure of some hetero-, homo- and monostachyae sedges (*Carex*, Cyperaceae). Ann. Bot. Fenn. 30: 21-42
- Tischler, G. (1950): Die Chromosomenzahlen der Gefäßpflanzen Mitteleuropas: 263
- Titz, E. (1984): Die Arzneibaldriane Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung Bayerns. Ber. Bayer. Bot. Ges. 55: 25-48
- Titz, E. u. W. Titz (1981): Die diploiden und tetraploiden Arznei-Baldriane der Schweiz und angrenzender Regionen (*Valerianaceae*). Bot. Helv. 91: 169-188
- Titz, W. (1969): Beitrag zur Kenntnis der österreichischen Sippen des *Valeriana officinalis*-Aggregats und ihrer Chromosomenzahlen. Österr. Bot. Zeitschr. 116: 172-180
- Titz, W. (1984): Morphometrische Studien an *Valeriana officinalis* s. l. II. Ordination durch Diskriminanzanalysen. Bot. Helv. 94: 67-80
- Titz, W. u. E. Titz (1979): "*Valeriana versifolia*" und andere oktoploide Arznei-Baldriane in den Schweizer Alpen und angrenzenden Regionen. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 89: 251-277
- Titz, W. u. E. Titz (1982): Analyse der Formenmannigfaltigkeit der *Valeriana officinalis*-Gruppe im zentralen und südlichen Europa. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 95: 155-164
- Titz, W., W. Timischl u. E. Titz (1983): Morphometrische Studien an *Valeriana officinalis* s. l. I. Auswahl, Analyse und Aufbereitung der Merkmale. Plant Syst. Evol. 141: 313-339
- Toivonen, H. (1981): Notes on nomenclature and taxonomy of *Carex canescens* (Cyperaceae). Ann. Bot. Fenn. 18: 91-97
- Toman, J. (1972): A taxonomic survey of the genera *Petasites* and *Endocellion*. Folia Geobot. Phytotax. 7: 381-406
- Toman, M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. Feddes Repertorium 99 (1-2): 33-80
- Toman, M. (1989): Die Verbreitung des Wermuts (*Artemisia absinthium* L.) und einige phytogeographische Beobachtungen in Bezug zur frühhistorischen Besiedlung Böhmens. Feddes Repertorium 100: 531-563
- Topitz, A. (1914): VII. Diagnoses formarum generis *Menthae* praecipue ex auctoris scripto: Beiträge zur Kenntnis der Menthenflora von Mitteleuropa. Rep. spec. nov. reg. veg. (Feddes Repertorium) 386/387 XIV. Band: 17-42

- Touton, K. (1921-1923): Die rheinischen Hieracien. Vorstudien zu neuen Flora der Rheinlande. 1. Teil. Die Piloselloiden. - Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. 73: 41-73 (1921); 74: 2-50 (1922); 75: 19-55 (1923)
- Touton, K. (1924): Die rheinischen Hieracien. Vorstudien zu neuen Flora der Rheinlande. 2. Teil. Die Euhieracien. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. 76: 1-58
- Touton, K. (1925): Hieracium pilosella L. und auricula LAM. et DC. in den Rheinlanden. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. 77: 35-73
- Touton, K. (1926): "Die rheinischen Hieracien" und "Hieracium pilosella L. und auricula LAM. et DC. in den Rheinlanden". Zusätze und Berichtigungen. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. 78: 101-151
- Touton, K. (1929): Weitere Zusätze zu "Die rheinischen Hieracien". Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. 80: 107-168
- Townsend, C.C. (1962): Some notes on Galeopsis ladanum L. and G. angustifolia Ehrh. ex. Hoffm. Watsonia 5: 143-149
- Townsend, C.C. (1972): Galeopsis L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press : 145-147
- Tracey, R. (1977): Drei neue Arten des Festuca-ovina-Formenkreises (Poaceae) aus dem Osten Österreichs. SpringerPlant Syst. Evol. 128: 287-292
- Tralau, H. (1962): Die europäisch-arktisch-montanen Pflanzen. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 72: 202-236
- Trautmann, W. u. D. Korneck (1978): Zum Gefährdungsgrad der Pflanzenformationen in der Bundesrepublik Deutschland. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 11: 35-40
- Trautmann, W., A. Krause u. R. Wolff-Straub (1970): Veränderung der Bodenvegetation in Kiefernforsten als Folge industrieller Luftverunreinigungen im Raum Mannheim, Ludwigshafen. Schriftenreihe für Vegetationskunde 5: 193-207
- Trittler, J. (1990): Das Langenauer Ried aus floristischer Sicht unter besonderer Berücksichtigung gefährdeter Arten und Pflegeaspekten. Jahresber. Arbeitsgem. Donaumoos 1990: 16-37
- Troll, W. (1935): Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen Band 1.: 955
- Tubeuf, K.F. von (1923): Monographie der Mistel. R. Oldenbourg: XII + 832
- Turecek, G., E. Titz u. W. Titz (1980): Eine neue diploide Valeriana officinalis-Sippe im illyrischen Raum. Studia Geobot. 1: 157-162
- Turesson, B. (1972): Experimental studies in Hieracium pilosella L. II. Taxonomy and differentiation. Bot. Notiser 125: 223-240
- Turesson, G. (1922): The genotypical response of the plant species to the habitat. Hereditas 3: 211-350
- Turesson, G. (1956): Variation in the apomictic microspecies of Alchemilla vulgaris L. II. Progeny tests inagamotypes with regard to morphological characters. Lund.Bot. Notiser 109: 400-4047
- Turesson, G. (1957): Variation in the apomictic microspecies of Alchemilla vulgaris L. III. Geographical distribution and chromosome number. Lund.Bot. Notiser 110: 413-422
- Turesson, G. u. B. Turesson (1960): Experimental studies in Hieracium pilosella L. I. Reproduction, chromosome number and distribution. Hereditas 46: 717-736
- Turner, B.L. u. A.M. Powell (1977): Helenieae - systematic review. - In: Heywood, V.H., J.B. Harborne et B.L. Turner (eds.): The Biology and Chemistry of the Compositae: 699-737
- Turner, C. (1972): Nepeta L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press: 183-186
- Tutin, T.G. (1957): A contribution to the experimental taxonomy of Poa annua L. Watsonia 4: 1-10
- Tutin, T.G. (1972): Polemonium L. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press : 74
- Tutin, T.G. u. D. Wood (1972): Teucrium - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press : 129-135
- Tutin, T.G., V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters u. D.A. Webb (eds.; 1964-1980): Flora Europaea. 5 Bände. Univ. Press

- Tzvelev, N. N. (1976): Grasses of the Soviet Union. Part II. (Englische Übersetzung 1983). : 1196
- Uhlemann, I. (1992): Zur Taraxacum-Flora von Berlin und Brandenburg. Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 125: 19-36
- Ujhelyi, J. (1970): Data to the Systematics of the Sections Bulbosae and Caespitosae of the Genus Koeleria IX. Ann. Hist.-Naturales Musei Nationalis Hungarici Pars Botanica 62: 175-195
- Ullmann, I. u. G. Hetzel (1990): Conyzo-Panicetum capillaris Eine "moderne" Anthropochoren-Gesellschaft des südlichen Mitteleuropa. Phytocoenologia 18(2/3): 371-386
- Umaerus, M. u. E. Akerberg (1968): Preliminary studies on spaeonateous chimaera formation in Poa pratensis. Hereditas 59: 221-228
- Usinger, H. (1963): Vegetationskundliche Notizen aus dem DJN-Lager in der Schwäbischen Alb (2.-12.8.1962). Jahrb. Deutsch. Jugendb. Naturbeob. (DJN) 2: 3-18
- Usinger, H. u. A. Wigger (1961): Vegetationskundliche Beobachtungen im Schwarzwald-Lager 1959. Jahrb. Deutsch. Jugendb. Naturbeob. (DJN) 1960/61: 27-41
- Valentine, D.H., u. A.O. Chater (1972): Boraginaceae. - In: Flora Europaea, Vol. 3 (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press
- Valet, F. (1847): Uebersicht der in der Umgebung von Ulm wildwachsenden phanerogamischen Pflanzen nebst Angabe der Standorte und Blüthezeit. E. Nübling: 112
- Van der Ham, R.W.J.M. (1981): Teucrium chamaedrys L. ssp. chamaedrys in Nederland. Gorteria 2: 63-64
- Van der Laan, D. u. W. Swant (1985): Waarnemingen aan Teucrium scordium L. in het duingebied van Voorne. Gorteria 12 (11/12): 255-267
- Van der Ploeg, D.T.E. (1964): Galeopsis pubescens Bess. nog steeds bij Oranjewoud. Gorteria 2: 63-64
- Van der Ploeg, D.T.E. (1989): Galeopsis pubescens Besser bij Oldeberkoop: een laat eerherstl. Gorteria 15 (1): 27-29
- Van Oostrom, H., A.A. Sterk u. H.J.W. Wijsman (1985): Genetic variation in agamospermous microspecies of Taraxacum sect. Erythrosperma and sect. Obliqua. Heredity 55: 223-228
- Van Soest, J.L. (1928): Het geslacht Hieracium in Nederland III. Nederl. Kruidk. Arch. 37: 171-222 "1927"
- Van Soest, J.L. (1958): The phytogeography of Taraxacum, with special reference to Europe. Blumea Suppl. 4: 60-67
- Van Soest, J.L. (1965): Taraxacum sect. Palustria Dahlstedt. Acta Bot. Neerl. 14: 1-53
- Van Soest, J.L. (1969): Die Taraxacum-Arten der Schweiz. Veröff. Geobot. Inst. der ETH, Stift. Rübél, Zürich 42: 1-250
- Veit, B. u. M. Hassler (1991): Die Orchideen um Bruchsal - Geschichte und Gegenwart. Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ. 23(1): 1-80
- Veldkamp, J. F. (1973): A Revision of Digitaria Haller (Gramineae) in Malesia. Blumea 21: 1-80
- Veldkamp, J. F. (1982): Agrostis (Gramineae) in Malesia and Taiwan. Blumea 28: 199-228
- Velten, C. (1902): Ein Beitrag zur Flora von Speier a. Rh. und Umgebung. Mitt. Pollichia LIX, 15: 1-42
- Vermeulen, P. (1972): Übersicht zur Systematik und Taxonomie der Gattung Orchis s. str. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 22-36
- Vestergren, T. (1929): Einige Notizen über schweizerische Agropyron-Arten Ber. Schweizer Bot. Ges. 38: 30-42
- Vierhapper, F. (1906): Zur Systematik der Gattung Avena. - In: Halácsy, E. von, Versammlung der Sektion für Botanik. Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 56: 369-370
- Vierhapper, F. (1923): Über Verwandtschaft und Herkunft der Gattungen Homogyne und Adenostyles. Österr. Bot. Zeitschr. 72: 150-164
- Villard, M. (1971): Contribution à l'étude cytotaxinomique et cytogénétique du genre Leucanthemum Adans. em. Briq. et Cav. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 80: 96-188

- Vogel, u. D. Büscher (1989): Die Verbreitung, Vergesellschaftung und Rückgang von *Apium repens* (Jacq.) Lag. und *Teucrium scordium* L. in Westfalen. *Flor. Rundbr.* 22 (1): 21-30
- Vogel, P. (1996): Bemerkenswerte Pflanzenfunde auf den Bahnanlagen der Deutschen Bundesbahn im Stadtgebiet von Karlsruhe *Carolinaea* 54: 37-44
- Voggesberger, M. (1991): Floristische und vegetationskundliche Beobachtungen im Weihergebiet um Ellwangen. *Jh. Ges. Naturk. Württ.* 146: 159-192
- Vogt, B. (1985): Zur Verbreitung des Frühlingsahorns in der Regio Basiliensis. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 59/60: 77-86
- Vögtlin, J. (2004): Ein Wiederfund von *Orlaya grandiflora*, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 3: S. 54-56
- Vögtlin, J. (2004): Untersuchung zur Beurteilung des Indigenats von *Buxus sempervirens* L in Südwestdeutschland und den angrenzenden Gebieten, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 3: S. 39-44
- Volk, O.H. (1931): Beiträge zur Ökologie der Sandvegetation der oberrheinischen Tiefebene. *Zeitschrift für Botanik* 24: 81-185
- Volk, O.H. (1937): Über einige Trockenrasengesellschaften des Würzburger Wellenkalkgebietes. *Bot. Centralbl.* 57 B: 577-598
- Vollmann, F. (1903): Der Formenkreis der *Carex muricata* und seine Verbreitung in Bayern. *Denkschr. Königl. Bot. Ges. Regensburg* 8 (N.F. 2): 55-90
- Vollmann, F. (1914): *Flora von Bayern*. E. Ulmer: 840
- Vollmar F. (1947): Die Pflanzengesellschaften des Murnauer Moores. Teil I (Hrsg.: K. Suessenguth). *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 27: 13-97
- Vollrath, H. (1966): Über Ackerunkrautgesellschaften in Bayern. *Denkschr. Regensb. Bot. Ges. N.F.* 20: 117-159
- Vollrath, H. (1973): *Medicago sativa* in Mitteleuropa angebaut oder verwildert? *Gött. Flor. Rundbr.* 7 (1): 9-13
- Von Glahn, H. (1987): Die Bestimmung der in Norddeutschland vorkommenden Quecken (Arten, Unterarten und Bastarde der Gattung *Agropyron* s.l.) nach vegetativen Merkmalen unter besonderer Berücksichtigung der Küstenregion *Drosera* '87 (1): 1-27
- Von Gottlieb-Tannenhain, P. (1904): Studien über die Formen der Gattung *Galanthus*. *Abh. zool.-botan. Ges. Wien* 2(4): 95
- Vondracek, M. (1984): Bryologische Charakteristik des Kalksteingebietes zw. Susice und Horazdovice. *Fol. Mus. Rer. Natur. Bohem. Occident. Bot.* 20: 1-27
- Voss, E. G. (1966): Nomenclatural Notes on Monocots. *Rhodora* 68: 435-463
- Vöth, W. (1975): *Trielis villosa* var. *rubra*, Bestäuber von *Orchis coriophora*. *Die Orchidee* 26(4): 170-172
- Vöth, W. (1982): Die "ausgeborgten" Bestäuber von *Orchis pallens* L. *Die Orchidee* 33(5): 196-203
- Vöth, W. (1983): Blütenbockkäfer (Cerambycidae) als Bestäuber von *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó subsp. *meyeri* (Rchb. f.) Tournay. *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 15(3): 305-330
- Vöth, W. (1984): *Echinomya magnicornis* Zett. Bestäuber von *Orchis ustulata* L. *Die Orchidee* 35(5): 189-192
- Vöth, W. (1987): Bestäubungsbiologische Beobachtungen an *Orchis militaris* L. *Die Orchidee* 38(2): 77-84
- Vöth, W. (1990): Effektive und potentielle Bestäuber von *Himantoglossum* Spr. *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 22(2): 337-351
- Vöth, W. (1992): Bestäubungsbiologische Beobachtungen an *Goodyera repens* (L.) R. Br. *Mitt.Bl. Arbeitskreis Heim. Orch. Baden-Württ.* 24(3): 517-530
- Vöth, W. (1994): Sind Blüten von *Epipogium aphyllum* Sw. entomogam oder autogam ? *Die Orchidee* 45(6): 248-251
- Vulpius, F. W. (1865): Der Belchen im Schwarzwalde. *Österr. Bot. Zeitschr.* 15: 221-225

- Vulpus, F.W. (1865): Correspondenz (In Bezug auf das problematische Hieracium vom Feldberg...). Österr. Bot. Zeitschr. 15: 122
- Vulpus, F.W. (1865): Das Högau und Donauthal im badischen Seekreis. Österr. Bot. Zeitschr. 15: 385-398
- Vulpus, F.W. (1865): Meine vier Exkursionen auf den Feldberg im Schwarzwald im Sommer 1864. Österr. Bot. Zeitschr. 15: 77-87
- Vulpus, F.W. (1868): Meine Exkursionen auf Belchen und Feldberg im Sommer 1867. Österr. Bot. Zeitschr. 18: 253-261, 285-292
- Vulpus, F.W. (1886): Der Belchen im Schwarzwald. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (31/32): 279-285
- Vulpus, F.W. (1887): Der Högau und das badische Donauthal. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (34,40,41/42,43): 299-310, 351-355, 368-372, 375-381
- Vulpus, S. (1791): Zwanzigster Brief und Spicilegium florae Stuttgardiensis 1786-1788. Beitr. für Naturk. 6: 69-79
- Wacker, F. (1972): Seßhaftwerden eines fremden Grases. Ährenhaber (*Gaudinia fragilis* (L.) P. B.) auf naturwiesen am Unterlauf der Schutter. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz 10/3: 543-546
- Wagenitz, G. (1954): Über die Zuverlässigkeit des Nachweises der Kornblume (*Centaurea cyanus* L.) in der Späteszeit. Naturwissenschaften 40: 249
- Wagenitz, G. (1955): Pollenmorphologie und Systematik in der Gattung *Centaurea* L. s.l. Flora 142: 213-279
- Wagenitz, G. (1957): Zur Bestimmung der Kleinarten des Arzneibaldrians (*Valeriana officinalis* L. s. l.). Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturw. Reihe 6: 927-928
- Wagenitz, G. (1965): Zur Systematik und Nomenklatur einiger Arten von *Filago* L. emend. Gaertn. subgen. *Filago* ("Filago germanica"-Gruppe). Willdenowia 4 (1): 37-59
- Wagenitz, G. (1977): Zur Bestimmung der *Leucanthemum*-Arten in Mitteleuropa nördlich der Alpen. Gött. Flor. Rundbr. 10 (4): 80-85
- Wagenitz, G. (1983): Die einjährigen *Centaurea*-Arten der Sektion *Cyanus* DC. Tuexenia 3: 535-544
- Wagenitz, G. (1983): Die Gattung *Adenostyles* Cass. (Compositae-Senecioneae). Phytion 23: 141-159
- Wagenitz, G. (1987): Compositae. In: Hegi, G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 6 (4)
- Wagenitz, G. u. B. Laing (1984): Die Nektarien der Dipsacales und ihre systematische Bedeutung. Bot. Jahrb. Syst. 104: 483-507
- Wagner, A. u. I. Wagner (1996): Pfrunger Ried - Pflege- und Entwicklungsplan. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 85: 1-304
- Wagner, G. (1960): Einführung in die Erd- und Landschaftsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung Süddeutschlands. Hohenlohe'sche Buchh.
- Wahrenburg, W. (1991): Landschaftsökologische Untersuchungen "Hoher Acker - Winterrain". Gutachten BNL Stuttgart. Unveröff. Manuskript
- Wahrenburg, W. (1992): Die Ackerflora des Gebietes "Hoher Acker" bei Weissach, Kreis Böblingen. Jh. Ges. Naturk. Württ. 147: 207-212
- Wälde, A. (1926): Über die Reliktflora der Adelegg. Blätter des Schwäbischen Albvereins 38 (8): 162
- Waldheim, S. (1944): Mossvegetation i Dalby-Söderskogs nationalpark. Kgl. Svenska Vetenskapsakad. Avh. i. Naturskyddsärenden 4: 1-140
- Waldheim, S. (1947): Kleinmoosgesellschaften und Bodenverhältnisse in Schonen. Bot. Notiser. Suppl. 1 (1): 1-203
- Waldner, H. (1883): Botanicorum crux et scandalum. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (5, 8/9): 49-52, 82-85

- Wallnöfer, B. (1992): Beitrag zur Kenntnis von *Carex oenensis* A. Neumann ex B. Wallnöfer. Linzer Biol. Beitr. 24/2: 829-849
- Wallnöfer, B. (1993): Die Entdeckungsgeschichte von *C. randalpina* B. Wallnöfer spec. nov. (= "*C. oenensis*") und deren Hybriden. Linzer Biol. Beitr. 25/2: 709-744
- Wallnöfer, B. (1994): Über neue Vorkommen von *C. randalpina* B. Wallnöfer in Slowenien und in der Schweiz. Linzer Biol. Beitr. 26/2: 855-860
- Walter, E. (1951): *Veronica filiformis* Smith. Bull. Assoc. philomath. Alsace et Lorraine 9 (2): 60
- Walter, E. (1981): Adventive Grasarten an Straßen im nördlichen Franken. Bericht Naturf. Ges. Bamberg 55 (1980): 220-249
- Walter, E. (1984): Die Akanthusblättrige Eberwurz (*Carlina acanthifolia* All.) - ein neuer Gast der Flora von Bamberg. Ber. Naturf. Ges. Bamberg 59: 111-116
- Walter, E. (1991): Zum Vorkommen und zur Verbreitung der Kugeldistel - Gattung *Echinops* - in Oberfranken. Ber. Naturf. Ges. Bamberg 66: 17-47
- Walter, H. (1970): Arealkunde. (Bearb. H. Straka). E. Ulmer : 478 S.
- Walter, H. u. S.W. Breckle (1991): Ökologie der Erde. Bd. 4. Gemäßigte und Arktische Zonen außerhalb Euro-Nordasiens. UTB, große Reihe, G. Fischer: 586
- Walters, S.M. (1968): *Alchemilla* L. In: Tutin, T.G. et al. (eds.): *Flora Europaea*. Univ. Press 2: 48-64
- Walther, E. (1949a): Zur Morphologie und Systematik des Arzneibaldrians in Mitteleuropa. Mitt. Thüring. Bot. Ges. 1: 1-108
- Walther, E. (1949b): *Valeriana*-Studien. I. *Valeriana montana* L. und *Valeriana Tripteris* L. Mitt. Thüring. Bot. Ges. 1: 144-167
- Walther, K. (1955): *Veronica-longifolia-Scutellaria hastifolia*-Ass. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 5: 103
- Watson, L. and M.J. Dallwitz (1992): *The Grass Genera of the World*. CAB International : 1038 S.
- Watson, L., H.T. Clifford and M.J. Dallwitz (1985): The classification of *Poaceae*: subfamilies and supertribes. Austral. J. Bot. 33: 433-484
- Webb, D.A. (1950): A revision of the dactyloid *Saxifragae* of NW Europe. Proc. Roy. Irish Acad. Dublin 53B: 207-240
- Webb, D.A. (1950): Biological flora of the British Isles. *Saxifraga* L. (Section *Dactyloides* Tausch). J. Ecol. 38: 185-213
- Webb, D.A. (1951): The mossy *Saxifragae* of the British Isles. *Watsonia* 2: 22-29
- Webb, D.A. (1961): What is the type of *Sedum telephium* L.? Feddes Repertorium 64: 18-19
- Webb, D.A. (1964): *Crassulaceae*. In: Tutin, T.G. et al. (eds.): *Flora Europaea*. Univ. Press 1: 350-364
- Webb, D.A. (1964): *Saxifraga* L. In: Tutin, T. G. et al.(eds.): *Flora Europaea*. Univ. Press 1: 364-380
- Webb, D.A. and R.J. Gornall (1989): *Saxifragae* of Europe: VIII + 307
- Weber - Oldecop, D. E. (1977): Fließgewässertypologie in Niedersachsen auf floristisch-soziologischer Grundlage. Gött. Flor. Rundbr. 10: 73-79
- Weber, H. u. D. Hartl (1954): Die Weidenseide, ein Neubürger der westdeutschen Flora. Hess. Flor. Briefe 3 (33): 2-3
- Weber, H.C. (1993): Parasitismus von Blütenpflanzen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft : X + 168
- Weber, H.E. (1972): Die Gattung *Rubus* L. (*Rosaceae*) im nordwestlichen Europa vom Nordwestdeutschen Tiefland bis Skandinavien mit besonderer Berücksichtigung Schleswig-Holsteins. J. CramerPhanerog. Monogr. 7: VIII + 504
- Weber, H.E. (1985): *Rubi Westfalici*. Die Brombeeren Westfalens und des Raumes Osnabrück (*Rubus* L. Subgenus *Rubus*). (Bestimmung, Taxonomie, Nomenklatur, Ökologie, Verbreitung). Abh. Westf. Mus. Naturk. 47 (3): 1-452

- Weber, H.E. (1987): Beiträge zu einer Revision der Gattung *Rubus* L. in der Schweiz. Bot. Helv. 97: 117-133
- Weber, H.E. (1987): Zur Kenntnis einiger bislang wenig dokumentierter Gebüschgesellschaften. Osnabrück. naturw. Mitt. 13: 143-157
- Weber, H.E. (1990): Übersicht über die Brombeergebüsche der Pteridio-Rubetalia (Franguletea) und Prunetalia (Rhamno-Prunetea) in Westdeutschland mit grundsätzlichen Bemerkungen zur Bedeutung der Vegetationsstruktur. Ber. Reinh. Tüxen-Ges. 2: 91-119
- Weber, H.E. (1995): *Rubus obovatus* nov.spec., eine neue Brombeerart aus Südwestdeutschland. *Carolinae* 53: 7-11
- Weber, H.E. (1996): Die Gattung *Rubus* im mittleren Schwarzwald mit Nachbargebieten. *Carolinae* 54: 9-36
- Weber, P. (1988): Die Strandrasengesellschaften im Bodenseekreis. 34, Anhang 1 (Erhebungsbögen), 2 (Flurkarten); Friedrichshafen (Xerokopie)
- Weber, W.A. u. A. Löve (1981): New Combinations in the Genus *Packera* (Asteraceae). *Phytologia* 49 (1): 44-50
- Weberling, F. (1961): Die Infloreszenzen der Valerianaceen und ihre systematische Bedeutung. Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Kl. 5: 155-281
- Weberling, F. (1966): Caprifoliaceae. - In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. VI/2: 3-87
- Weberling, F. (1969): Zur Bestimmung der einheimischen und adventiv vorkommenden Valerianella-Arten. Hess. Flor. Briefe 211: 33-38
- Weberling, F. (1970): Valerianaceae. - In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. VI/2: 97-176.
- Weberling, F. (1981): Morphologie der Blüten und Blütenstände. E. Ulmer: 391
- Weberling, F. u. H. Haeupler (1976): Bestimmungsschlüssel der einheimischen und adventiv vorkommenden Valerianella-Arten. Gött. Flor. Rundbr. 3: 1-4 (in Jg.10,H.1)
- Weckesser, M. (2004): *Tulipa sylvestris* in der Auenvegetation des mittleren Taubertals, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 3: S. 45-52
- Weeda, E.J. (1994): *Poa bulbosa* L. on the Westfrisian Island of Ameland. *Gorteria* 20(2-3): 79-80
- Wegmann, K. u. L.J. Musselmann (eds.) (1991): Progress in Orobanche research. Proceedings of the international workshop on Orobanche research - Obermarchtal, FRG, August 19-22, 1989: (8) + 362
- Wegmüller, S. (1994): *Cicerbita plumieri* (L.) Kirschl., eine cytologische, arealkundliche und ökologische Studie. Schweizerbot. Jahrb. Syst. 116 (2): 189-219
- Wehrmaker, A. (1987): Neue Adventivpflanzen im Stuttgarter Weinbaugebiet und ihre Einbürgerung. - In: 21. Hessischer Floristentag, Tagungsbeiträge. Schriftenreihe der Stadt Darmstadt, Institut für Naturschutz 12 (2): 31-38
- Weiger, E. (1949): Zur Flora der Umgebung von Gorheim-Sigmaringen. Hohenz. Jh. 9: 108-116
- Weihe, K. von (Hrsg.) (1972): Garcke, Illustrierte Flora. P. Parey: 1607
- Weimarck, G. (1971): Variation and taxonomy of *Hierochloa* (Gramineae) in the Northern Hemisphere. Bot. Not. 124: 129-175
- Wein, G. K. (1992): Floristisch-faunistische Untersuchungen des Voralpen-Höhenzuges der Adelegg bei Isny im Allgäu. Dipl. Arb. Biol.: 420 + Anhang + Karten
- Wein, K. (1910): Beiträge zur Flora des Harzes. Allg. Bot. Z. Syst. 16: 168-170
- Wein, K. (1932): Die älteste Einführungs- und Einbürgerungsgeschichte des *Erigeron canadensis*. Bot. Archiv 34: 394-418
- Wein, K. (1939, 1943): Die älteste Einführungs- und Ausbreitungsgeschichte von *Acorus calamus* *Hercynia* 1 u. 3: 367-450 u. 72-128
- Wein, K. (1963): Die Heimat von *Ornithogalum nutans* L. und die Entstehung der Grundlagen für seine spätere Ausbreitung in den Gärten im Verlaufe der Barockzeit. Nova Acta Leopoldina N. F. 27, 167: 383-411

- Weinmann, J.G. (1764): *Dissertatio inauguralis botanico-medica sistens fasciculum plantarum patriae urbi vicinarum, sponte crescentium culturarumque cum usu omni earundem plebejo, adjectis observationibus in botanicam, generalioribus, typoque curationis avium descriptionis.*
- Weiß, R. F. (1985): *Lehrbuch der Phytotherapie, 6. überarb. u. erw. Aufl., Stuttgart: 422*
- Welss, W. (1985): *Nonea rosea (M.B.) Link seit 100 Jahren in Nordostbayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 56: 81-84*
- Welten, M. u. R. Sutter (1982): *Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. 2 Bände. Birkhäuser : 716 + 698*
- Welz, F. (1884): *Kleiner Streifzug durch die Umgegend Thiengens und das Fohrenbachtal. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (17): 148-153*
- Welz, F. (1885): *Die geologischen Verhältnisse in der Umgebung von Thiengen und Aufzählung nicht allgemeiner Pflanzen in derselben. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (23): 203-208*
- Wenderoth, G.W.F. (1831): *Einige Bemerkungen über verschiedene neue Pflanzenarten des botanischen Gartens in Marburg. Nebst einer Abbildung der Polygala depressa Wender. Schriften Ges. Beförd. Gesamten Naturwiss. Marburg 2: 211-267*
- Wepfer, J. J. (1679): *Cicutae aquaticae Historia et noxae. Commentario illustrata. J.R. König*
- Werneck, H. L. (1954): *Die Formenkreise des Dandhafers (Avena strigosa Schreb.) in Oberösterreich. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 94: 97-113*
- Werner, D.J., T. Rockenbach u. M.-L. Hölscher (1991): *Herkunft, Ausbreitung, Vergesellschaftung und Ökologie von Senecio inaequidens DC. unter besonderer Berücksichtigung des Köln-Aachener Raumes. Tuexenia 11: 73-107*
- Westhus, W. (1981): *Zur Vegetationsentwicklung von Aufforstungen, insbesondere mit Robinia pseudoacacia L. Arch. NatSchutz LandschForsch. 21: 211-225*
- Westman, G. (1984): *Nagra fynd av Utricularia ochroleuca, blekbläddra, i Norrland. Svensk Bot. Tidskrift 78 (4): 223-225*
- Westrich, P. (1989): *Die Wildbienen Baden-Württembergs. Allgemeiner Teil: Lebensräume, Verhalten, Ökologie und Schutz, S. 1-432; Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten, S. 433-972. E.Ulmer : 1-972*
- Wever, G. (1843): *Badenweiler mit seinen Umgebungen. Adolph Emmerling: 264*
- Weymar, H. (1966): *Buch der Lippenblütengewächse und Rauhblattgewächse. Neumann Verlag: 160 S., 82 Abb.*
- Wibel, A.W.E.C. (1797): *Dissertatio inauguralis botanica Primitiarum Florae Werthemensis sistens prodromum. : 40*
- Wibel, A.W.E.C. (1799): *Primitiae florae Werthemensis. Goepferdt: 372*
- Wichtl, M. (1989): *Teedrogen: 568*
- Widder, F.J. (1923): *Die Arten der Gattung Xanthium. Beiträge zu einer Monographie. Rep. spec. nov. reg. veg. (Feddes Repertorium) 20: 1-222, Tafel I-IV, Karte 1-4*
- Widder, F.J. (1975): *Die Gliederung der Gattung Leontodon. Phytion 17 (1-2): 23-29*
- Widén, K.-G. (1971): *The genus Agrostis L. in eastern Fennoscandia. Taxonomy and distribution. Flora Fennica 5: 209*
- Wiefelspütz, W. (1970): *Über die Blütenbiologie der Gattung Epipactis. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 23: 53-69*
- Wiegleb, G. (1978): *Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen hydrochemischen Umweltfaktoren und Makrophytenvegetation in stehenden Gewässern. Arch. Hydrobiol. 83: 443-484*
- Wiegleb, G., A. Lehmann u. R. Hausfeld (1991): *Die Erlenwälder im nordwestlichen Niedersachsen. Tuexenia 11: 309-343*
- Wienhöfer, M. (1989): *Ophrys apifera Huds. x Ophrys holoserica (Burm. fil.) W. Greuter ssp. elatior (Gumprecht) Gumprecht - eine neue Hybride (Nothosubspecies) aus Baden-Württemberg. Ber. Arbeitskreis Heim. Orch. 6(2): 72-75*

- Wiening, H. (1993): Konzeption zum Klettern und Wandern am Wackerstein. Manuskript. Deutscher Alpenverein, Landesverband Baden-Württemberg
- Wiethold, J. (1993): Botanische Großreste des hohen und späten Mittelalters der Grabung Ulm, Donaustraße. Fundber. Bad.-Württ. 18: 491-599
- Wiethold, J. (1989): Botanische Großreste und Gefäßkeramik aus hoch- und spätmittelalterlichen Fundkomplexen von Ulm, Donaustraße. Dipl.-Arb. Univ. Kiel: 321+ Beil.
- Wiethold, J. (1993): Botanische Großreste des hohen und späten Mittelalters der Grabung Ulm, Donaustraße. Erste Ergebnisse zur Ernährung und Umwelt im hoch- und spätmittelalterlichen Ulm. Fundber. Bad.-Württ. 18: 491-599
- Wiinstedt, K. (1936): *Carex oederi* coll. Bot. Tidskr. 43: 504-506
- Wiinstedt, K. (1947): Bidrag til polymorfien hos en tidligere som *Carex oederi* Tetz. kendte art. Bot. Tidskr. 48: 192-206
- Wilkinson, M.J. & C.A. Stace (1987): Typification and status of the mysterious *Festuca guestfalica* Boenn. ex Reichb. *Watsonia* 16 (3): 303-309
- Wilkinson, M.J. & C.A. Stace (1988): The taxonomic relationships and typification of *Festuca brevipila* Tracey and *F. lemanii* Bastard (Poaceae). *Watsonia* 17: 289-299
- Willerding, U. (1969): Ursprung und Entwicklung der Kulturpflanzen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. - In: H. Jankuhn: Vor- und Frühgeschichte vom Neolithikum bis zur Völkerwanderungszeit. Deutsche Agrargeschichte, Bd. 1 : 188-233
- Willerding, U. (1986): Zur Geschichte der Unkräuter Mitteleuropas. Karl Wacholtz-Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte (Hrsg.: Jankuhn, H.) 22: 382
- Willerding, U. (1987): Die Paläo-Ethnobotanik und ihre Entwicklung im deutschsprachigen Raum. Ber. Deutsch. Botan. Ges. 100: 81-105
- Willerding, U. (1988): Zur Entwicklung von Ackerunkrautgesellschaften ... In: Der prähistorische Mensch und seine Umwelt. Festschrift für U. Körber-Grohne zum 65. Geburtstag. Forsch. Ber. Vor- und Frühgeschichte Bad.-Württ. 31: 31-41
- Willerding, U. (1991): Paläo-ethnobotanische Untersuchung von Baumaterialien im Templerhaus. In: Schmidt, W.: Das Templerhaus in Amorbach. Arbeitsh. Bayer. Landesamt Denkmalpflege 53: 73-77
- Willerding, U. (1993): Paläoethnobotanische Untersuchungen neuzeitlicher Wellerhölzer aus Duderstadt, Landkreis Göttingen. *Scripta Geobot.* 20: 53-60
- Willerding, U. (1995): Landnutzung im Umfeld städtischer und ländlicher Siedlungen des Mittelalters. In: P. Dilg et al. (Hrsg.): Rhythmus und Saisonalität. Kongreßakten 5. Symposium Mediävistenverband. Göttingen 1993: 377-402
- Willing, B. u. E. Willing (1977): Bibliographie über die Orchideen Europas und der Mittelmeerländer 1744-1976. *Willdenowia*, Beih. 11: 1-325
- Willing, B. u. E. Willing (1979): Index der Verbreitungskarten für die Orchideen Europas und der Mittelmeerländer.. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 14: 1-163
- Willing, B. u. E. Willing (1985): Bibliographie über die Orchideen Europas und der Mittelmeerländer. 1. Supplement. *Englera* 5: 1-280
- Willuhn, G. (1989): Arnikablüten. In: Wichtl, M. (Hrsg.): Teedrogen. Wiss. Verlagsgesellschaft : S. 65-69
- Wilmanns, O. (1956): Die Pflanzengesellschaften der Äcker und des Wirtschaftsgrünlandes auf der Reutlinger Alb. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland* 15: 30-51
- Wilmanns, O. (1956): Pflanzengesellschaften und Standorte des Naturschutzgebietes "Greuthau" und seiner Umgebung (Reutlinger Alb). Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 24: 317-451
- Wilmanns, O. (1966): Die Flechten- und Moosgesellschaften des Spitzbergs. In: Der Spitzberg bei Tübingen. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 3: 244-277
- Wilmanns, O. (1974): Vegetation des Kaiserstuhls. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 8: 72-206

- Wilmanns, O. (1975): Wandlungen des Geranio-Allietum in den Kaiserstühler Weinbergen? - Pflanzensoziologische Tabellen als Dokumente. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 34: 429-443
- Wilmanns, O. (1977): Vegetation. In: H. Rasbach et al.: Der Kaiserstuhl. Gesteine und Pflanzenwelt. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 8: 80-215
- Wilmanns, O. (1977): Verbreitung, Soziologie und Geschichte der Grün-Erle (*Alnus viridis* (Chaix) DC.) im Schwarzwald. TodenmannMitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 19/20: 323-341
- Wilmanns, O. (1980): Rosa arvensis-Gesellschaften. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. 22: 125-134
- Wilmanns, O. (1988): Können Trockenrasen derzeit trotz Immissionen überleben? - Eine kritische Analyse des Xerobrometum im Kaiserstuhl. Carolea 46: 5-16
- Wilmanns, O. (1989): Vegetation. In: Der Kaiserstuhl - Gesteine und Pflanzenwelt. E. Ulmer : 89-204
- Wilmanns, O. (1989): Vergesellschaftung und Strategie-Typen von Pflanzen mitteleuropäischer Rebkulturen. Phytocoenologia 18: 83-128
- Wilmanns, O. (1990): Weinbergvegetation am Steigerwald und ein Vergleich mit der im Kaiserstuhl. Tuexenia 10: 123-135
- Wilmanns, O. (1993): Ökologische Pflanzensoziologie. Eine Einführung in die Vegetation Mitteleuropas. Quelle u. Meyer
- Wilmanns, O. (1994): Der Rebuterwuchs im westlichen Bodenseegebiet und seine Veränderung im Laufe von 3 Jahrzehnten - Versuch einer geobotanischen Bilanz (Festschrift G. Lang). Diss. Bot. 234: 79-97
- Wilmanns, O. (1995): Ein Vergleich der Texturen von Weinbergsgesellschaften im Elsaß und in Südfrankreich. Carolea 53: 55-66
- Wilmanns, O. u. A. Bogenrieder (1986): Veränderungen der Buchenwälder des Kaiserstuhls im Laufe von vier Jahrzehnten und ihre Interpretation - pflanzensoziologische Tabellen als Dokumente. Abh. Westfäl. Mus. Naturk. 48(2/3): 55-79
- Wilmanns, O. u. Bogenrieder (1992): Das Geranio-Allietum in der oberelsässischen Rebflur Bauhinia 10: 99-114
- Wilmanns, O. u. K. Müller (1976): Beweidung mit Schafen und Ziegen als Landschaftspflegemaßnahme im Schwarzwald. Natur und Landschaft 51 (10): 271-274
- Wilmanns, O. u. S. Rupp (1966): Welche Faktoren bestimmen die Verbreitung alpiner Felsspaltenpflanzen auf der Schwäbischen Alb? Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 34: 62-86
- Wilmanns, O., A. Bogenrieder u. A. Schwabe-Kratochwil (1991): Jahrestagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 20. bis 23. Juli 1990 in und um Freiburg im Breisgau. Tuexenia 11: 461-482
- Wilmanns, O., A. Kratochwil u. F. Kämmer (1978): Biotop-Kartierung in Baden-Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 11: 191-205
- Wilmanns, O., A. Schwabe-Braun u. M. Emter (1979): Struktur und Dynamik der Pflanzengesellschaften im Reutwaldgebiet des Mittleren Schwarzwaldes. Documents Phytosociologiques, N.S. 4: 983-1024
- Wilmanns, O., Bogenrieder, A. u. W. H. Müller (1986): Der Nachweis spontaner, teils autogener, teils immissionsbedingter Änderungen von Eichen-Hainbuchenwäldern - eine Fallstudie im Kaiserstuhl / Baden. Natur und Landschaft 61 (11): 415-422
- Wilmanns, O., W. Wimmenauer, G. Fuchs, H. u. K. Rasbach (1977): Der Kaiserstuhl. Gesteine und Pflanzenwelt. E. UlmerNatur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 8: 262
- Wilmanns, O., W. Wimmenauer, G. Fuchs, H. u. K. Rasbach (1989): Der Kaiserstuhl. Gesteine und Pflanzenwelt. E. UlmerNatur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 8: 244
- Wimmenauer, W. u. V. Wirth (1963): Geologisch-botanische Exkursion ins Höllental am 22. Juli 1962. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 8: 507-508
- Winski, A. (1983): Die Waldgesellschaften der Ortenau und ihre Randstrukturen. Ber. Naturf. Ges. Freiburg 73: 77-137

- Winter, F.J. (1882): Botanische Streifzüge in der Baar. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (3/4): 29-48
- Winter, F.J. (1883): In: Neue Standorte. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (8/9): 85-92
- Winter, F.J. (1884): Charakteristische Formen der Flora von Achern. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (15): 132-137; 1 (16): 140-145
- Winter, F.J. (1885): Charakteristische Formen der Flora von Achern (Nachträge pro 1885). Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (26): 234-235
- Winter, F.J. (1885): Nachträge zu: Charakteristische Formen der Flora von Achern. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (20): 181-182
- Winter, F.J. (1887): Frühling um den Feldberg. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (35/36): 307-319
- Winter, F.J. (1889): Am Isteiner Klotze. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (57/58): 49-63
- Winter, F.J. (1890): Flora von Achern. I. Phanerogamen und Gefässcryptogamen. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (76-79): 205-234
- Winter, F.J. (1895): *Corrigiola littoralis* L. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3 (130): 273
- Winter, F.J. (1895): Nachtrag pro 1894 zur "Flora von Achern". Mitt. Bad. Bot. Ver. 3 (130): 237
- Winterhoff, W. (1971): Zur Verbreitung und Soziologie von *Carex caespitosa* L. auf der Schwäbischen Alb. Jh. Ges. Naturk. Württ. 126: 270-279
- Winterhoff, W. (1973): Die Vegetation des Fetzach-Taufach-Moores. Jh. Ges. Naturk. Württ. 128: 137-141
- Winterhoff, W. (1976): Ein Fundort des Bachsteinbrechs (*Saxifraga aizoides* L.) im württembergischen Alpenvorland. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 43: 132-139
- Winterhoff, W. et al. (1993): Die Pflanzenwelt des NSG Eriskircher Ried am Bodensee Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 69: 280
- Winterhoff, W. u. M. Huber (1967): Einige pflanzengeographisch bemerkenswerte Funde in Oberschwaben. Veröff. Landesst. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 35: 32-38
- Winterhoff, W., A.Bock, G.Knötzsch, Ch. Leushacke, A. Zarybnicky (1993): Die Vegetation und Gefäßpflanzen-Flora des Etriskircher Riedes von 1972 bis 1991. Beih. Veröff. Naataursch. Lanbschaftpfl. Bad.-Württ. 69: 263-277
- Wirth, V. (1975): Die Vegetation des Naturschutzgebietes Utzenfluh (Südschwarzwald), besonders in lichenologischer Sicht. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 34: 463-476
- Wirth, V. (1989): Über die außergewöhnliche Flechtenvegetation des Belchen-Gebietes im Schwarzwald. In: Der Belchen - Geschichtlich-naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges. Natur- u. Landschaftsschutzgeb. Bad.-Württ. 13: 593-616
- Wisskirchen, R. (1993): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland (vorläufige Fassung). Beih. Florist. Rundbriefe 3: 478
- Wißkirchen, R. (1995): Korrekturen und Nachträge zur Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. Flor. Rundbr. 29 (2): 212-246
- Wisskirchen, R. (1995): Verbreitung und Ökologie von Flußufer-Pioniergesellschaften (*Chenopodium rubri*) im mittleren und im westlichen Europa. Diss. Bot. 236: 1-346
- Witschel, M. (1977): Das Mosaik der basiphytischen Xerothermvegetation zwischen Basel und Breisach. Unveröff. Diplomarbeit: 128
- Witschel, M. (1978): *Ononis natrix* L. und *Trifolium scabrum* L., zwei für Deutschland wiederentdeckte Arten. Gött. Flor. Rundbr. 12 (1): 15-17
- Witschel, M. (1980): Die Hecken der Muschelkalk-Baar. Schriften Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 33: 151-156
- Witschel, M. (1980): Seltene Pflanzengesellschaften auf Reliktstandorten der Baar. Schriften Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 33: 117-135
- Witschel, M. (1980): Xerothermvegetation und dealpine Vegetationskomplexe in Südbaden. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 17: 1-212

- Witschel, M. (1982): Die Bedeutung der Waldränder an der Grenze Braunjura-Weißjura für das Überleben seltener Pflanzenarten am Beispiel der Geisinger Berge. Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 34: 102-115
- Witschel, M. (1984): Zur Ökologie, Verbreitung und Vergesellschaftung des Reckhörderle (*Daphne cneorum*) auf der Baar und im Hegau. Schriften Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 35: 119-135
- Witschel, M. (1986): Zur Ökologie, Verbreitung und Vergesellschaftung des Berghähnleins (*Anemone narcissiflora* L.) in Baden-Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 61: 155-173
- Witschel, M. (1986): Zur Ökologie, Verbreitung und Vergesellschaftung von *Daphne cneorum* L. in Baden-Württemberg, unter Berücksichtigung der zöologischen Verhältnisse in den anderen Teilarealen. Jh. Ges. Naturk. Württ. 141: 157-200
- Witschel, M. (1987): Die Verbreitung und Vergesellschaftung der Federgräser (*Stipa* L.) in Baden-Württemberg. Jh. Ges. Naturk. Württ. 142: 157-196
- Witschel, M. (1989): Ökologie, Verbreitung und Vergesellschaftung von Amethyst-Schwengel (*Festuca amethystina* L.) und Horst-Segge (*Carex sempervirens* Vill.) in Baden-Württemberg. Jh. Ges. Naturk. Württ. 144: 177-209
- Witschel, M. (1991): Die *Trinia glauca*-reichen Trockenrasen in Deutschland und ihre Entwicklung seit 1800. Ber. Bayer. Bot. Ges. 62: 189-219
- Witschel, M. (1993): Zur Synsystematik der *Trinia glauca*-reichen Trockenrasen im südlichen Oberrheinraum. *Carolinea* 51: 27-40
- Witschel, M. (1994): Die Arealgrenzen des *Xerobrometum* Br.-Bl. 15 em. 31 im Südwesten des Verbreitungsgebietes. Ber. Reinh.-Tüxen-Ges. 6: 121-147
- Wittig, R. (1979): Verbreitung, Vergesellschaftung und Status der Späten Traubenkirsche (*Prunus serotina* Ehrh., Rosaceae) in der Westfälischen Bucht. *Natur und Heimat* 39 (2): 48-52
- Wittmann, H. (1985): Beitrag zur Systematik der Ornithogalum-Arten mit verlängert-traubiger Infloreszenz. *Stapfia* 13: 118
- Wittmann, H. u. W. Strobl (1986): Zur Kenntnis der Gattung *Galeobdolon* Adans. im Bundesland Salzburg. Ber. Bayer. Bot. Ges. 57: 163-176
- Wittmann, O. u. E. Litzelmann (1951): Exkursion zum Isteiner Klotz und ins Rheinvorland. Mitt. bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N. F. 5: 254-258
- Wojciechowska, B. (1966): Morfologia i anatomia owocow i nasion z rodziny Labiatae ze szczególnym uwzględnieniem gatunkow leczniczych (Morphology and anatomy of fruits and seeds in the family Labiatae with particular respect to medicinal species). *Monographiae Botanicae* 21: 3-142
- Wolf, A. u. P. Zimmermann (1991): Flora und Fauna des geplanten Naturschutzgebietes "Kalkofen" (Enzkreis, Gemeinde Mönshiem). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66: 311-362
- Wolf, G. (1980): Zur Gehölzansiedlung und -ausbreitung auf Brachflächen. *W. Kohlhammer Natur und Landschaft* 55 (10): 375-380
- Wolf, H. (1994): Apotheker Johann Baptist Rathgeb (1796-1875). Jh. Ges. Naturk. Württ. 149: 99-129
- Wolf, R. (1978): Umgestaltung von Feuchtgebieten. Bericht über drei im Landkreis Ludwigsburg 1977/78 durchgeführte Projekte. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 47/48: 17-43
- Wolf, R. (1984): Heiden im Kreis Ludwigsburg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 35: 1-72
- Wolf, Th. (1908): Monographie der Gattung *Potentilla*. *Bibliotheca Bot.* 71: 1-715
- Wolf, Th. (1992): Die Vegetation des Bannwaldes "Wilder See-Hornisgrinde" am Ruhestein, Nordschwarzwald. Mitt. Ver. Forstl. Standortsk. Forstpflanzenzüchtung 36: 27-46
- Wolff, P. u. A. Schwarzer (1991): *Ranunculus rionii* Lagger - eine neue Wasserpflanze in Deutschland. *Flor. Rundbr.* 25: 69-85
- Wolff, P. u. O. Orschiedt (1993): *Lemna turionifera* Landolt - eine neue Wasserlinse für Süddeutschland, mit den Erstnachweisen für Europa. *Carolinea* 51: 9-26

- Wolff, P. u. W. Lang (1994): 4. Das *Carex buxbaumii*-Aggregat. In: Dritte Nachträge zur "Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete". Mitt. Pollichia 81: 361-381
- Wolff, P., H. Diekjobst u. A. Schwarzer (1994): Zur Soziologie und Ökologie von *Lemna minuta* H., B. et K. in Mitteleuropa Tuexenia 14: 343-380
- Worm, R. (2001): *Viola pumila* im Naturschutzgebiet „Radolfzeller Aachried“, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 1: S. 53-54
- Wörz, A. (1989): Zur geographischen Gliederung hochmontaner und subalpiner Hochstaudenfluren und Goldhaferwiesen. Tuexenia 9: 317-340
- Wörz, A. (1992): Untersuchungen zur Abgrenzung, Verbreitung und Standortwahl von *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. ssp. *stenophylla* (Rouy u. Camus) Briquet (Apiaceae). Bot. Jahrb. Syst. 114 (3): 329-348
- Wörz, A. u. M. Bässler (1990): Zur Verbreitung von *Vicia dalmatica* in Baden-Württemberg. Jh. Ges. Naturk. Württ. 145: 265-271
- Wraber, T. (1966): Das *Leontodonti berinii*-Chondriletum von den Schotterbänken der Soca bei Bovec (Julische Alpen). Varstvo Narave 4: 51-60
- Wu, C.Y. (1981): Another new genus of Adoxaceae with special references on the infrafamilial evolution and the systematic position of the family. Acta Bot. Yunnanica 3 (4): 383-388
- Wu, C.Y., Z.L. Wu and R.F. Huang (1981): *Sinadoxa* C.Y. Wu, Z.L. Wu & R.F. Huang, genus novum familiae Adoxacearum. Acta Phytotax. Sin. 19 (2): 203-210
- Wulff, H.D. (1954): Zur Zytologie und geographischen Verbreitung des Kalmus Archiv der Pharmazie und Berichte der Deutschen pharmaz. Gesellsch. 87: 529-541
- Yabuno, T. (1962): Cytotaxonomic Studies on the Two Cultivated Species and the Wild Relatives in the Genus *Echinochloa*. Cytologia 27: 296-305
- Yao, G. (1992): A new species and a newly recorded species of *Adoxa* L. from Xizang. Acta Phytotax. Sin. 30 (2): 179-180
- Yeo, P.F. (1976): *Aster* L. In: Flora Europaea (Hrsg.: Tutin, T.G. et al.). Univ. Press 4: 112-116
- Young, D. P. (1970): Bestimmung und Verbreitung der autogamen *Epipactis*-Arten. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 23: 43-52
- Zabel, H. (1859): 2. Übersicht der Flora von Neu-Vorpommern und Rügen. Arch. Ver. Freunde Naturgeschichte Mecklenburg 13: 14-99
- Zabinkova, N. (1968): Generic names ending in -is and the determination of their stems. Taxon 17: 19-33
- Zachmann, K. L. (1887): Neue Standorte. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (44): 386-387
- Zachmann, K. L. (1897): Botanische Spaziergänge in der Umgegend von Pforzheim. Aus der Heimat 10: 87-91, 123-127, 164-167
- Zahn, H. (1890): *Orchis purpurea* Huds. x *Rivini* Gouan (*O. fusca* Jacq. x *militaris* L. p.p.). Mitt. Bad. Bot. Ver. 1: 242-245
- Zahn, H. (1891): Altes und Neues aus der badischen Flora. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (83): 268-270
- Zahn, K. H. (1890): *Carex kneuckeriana* mihi - *C. nemorosa* Rebert. X *remota* L. Österr. Bot. Z. 40: 412-413
- Zahn, K. H. (1892,1893): Ad Danubii fontes. Deutsche Bot. Monatsschr. 10:93-94, 121-124: 11:95-96
- Zahn, K.H. (1888): Sommer um den Feldberg. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und das Land Baden 1 (45): 391-402
- Zahn, K.H. (1889): Flora der Baar und der umliegenden Landesteile. Schriften Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 7: 1-174
- Zahn, K.H. (1890): Berichtigungen und Ergänzungen zur 16. Auflage von Dr. Aug. Garcke's Flora von Deutschland. Deutsche Bot. Monatsschr. 8 (7/8): 112-115

- Zahn, K.H. (1890-1891): Altes und Neues aus der badischen Flora. Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (76-79, 83): 234-236 (1890), 268-270 (1891)
- Zahn, K.H. (1893): Freiburg im Breisgau. Deutsche Bot. Monatsschr. 11: 27-32, 56-59
- Zahn, K.H. (1895): Altes und Neues aus der badischen Flora und den angrenzenden Gebieten. - Mitt. Bad. Bot. Ver. 3 (130): 267-272; 3 (131/132): 279-289
- Zahn, K.H. (1896): Beiträge zur Kenntnis der pfälzischen Piloselloiden. Mitt. Bad. Bot. Ver. 3 (137-140): 331-360
- Zahn, K.H. (1898/99): Die Piloselloiden der Pfalz beiderseits des Rheines mit Berücksichtigung benachbarter Gebiete. - Allg. Bot. Z. Syst. 4: 169-172 (1898), 5: 4-6, 20-22, 55-57, 76-77, 90-92, 116-119, 138-140 (1899)
- Zahn, K.H. (1899): Hieracia Vulpiana. Mitt. Bad. Bot. Ver. 4 (165-168): 123-153
- Zahn, K.H. (1905): Hieracium. In: Schinz, H. u. R. Keller: Flora der Schweiz. II. Teil: Kritische Flora
- Zahn, K.H. (1906): Die Hieracien der Schweiz. Neue Denkschr. allg. schweiz. Ges. gesamt. Naturw. 40 (4): 163-728
- Zahn, K.H. (1915): Die geographische Verbreitung der Hieracien Südwestdeutschlands in ihrer Beziehung zur Gesamtverbreitung. - Allg. Bot. Z. Syst. 20: 153-159 ("1914"); 21: 17-22.
- Zahn, K.H. (1916): Les Hieracium des Alpes Maritimes
- Zahn, K.H. (1921-1923): Hieracium. In: Engler, A. (ed.): Das Pflanzenreich. 75(IV.280): 1-288; 76(IV.280): 289-576, 77(IV.280): 577-864 (1921); 79(IV.280): 865-1146 (1922); 82(IV.280): 1147-1705 (1923). Engelmann
- Zahn, K.H. (1922-1938): Hieracium. In: Ascherson, P.F.A. u. K.O.P.P. Graebner: Synopsis der mitteleuropäischen Flora 12(1): 1-80 (1922), 81-160 (1924), 161-400 (1929), 401-492 (1930); 12(2): 1-160 (1930), 161-480 (1931), 481-640 (1934), 641-790 (1935); 12(3): 1-320 (1936), 321- Gebr. Borntraeger 480 (1937), 481-708 (1938)
- Zahn, K.H. (1929): Hieracium. - In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Lehmann VI/2: 1182-1351
- Zander, R. (1984): Handwörterbuch der Pflanzennamen: 770
- Zauner, F. (1992): Anhang 3: Die Pflanzenfunde von Oberflacht. - In: Schiek, S.: Das Gräberfeld der Merowingerzeit bei Oberflacht. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 41: 128-166
- Zauner, F. (2004): Die Laubholz-Mistel (*Viscum album* subsp. *album*) auf Markung Kornwestheim und angrenzenden Gebieten Ludwigsburgs, Berichte der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutschland, Band 3: S. 56-57
- Zeidler, H. (1954): Das *Alopecurion utriculati*, ein neuer Verband balkanischer Pflanzengesellschaften. Vegetatio 5-6: 292-300
- Zeller, A. (1977): Verbreitungsübersicht der Heimischen Orchideen Unterfrankens: 50
- Zeller, A. u. I. Zeller (1991): Neufund von *Medicago arabica* (L.) Huds. Flor. Rundbr. 25 (1): 68
- Zeller, G. (1864): Über den Schwaigfurter Weiher. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 20: 29-32
- Zeller, T. (1996): Die Riemzunge kehrt zurück. Bauernkalender: 123-125
- Zeltner, L. (1970): Recherches de biosystematique sur les genres *Blackstonia* Huds. et *Blackstonia* Hill. Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 5-164
- Zenari, S. (1924): Intorno alla sistematica di "*Sonchus oleraceus*" L. em e di "*Sonchus asper*" Hill. Nuovo Giornale Botanico Italiana 31: 5-17
- Zenneck, L.H. (1822): Flora von Stuttgart. F.W. Zuckschwerdt: 55
- Zenner, K. u. M. Bopp (o.J.): Analyse der Pflanzenreste in einigen Latrinengruben aus dem 13. bis 17. Jahrhundert am Heidelberger Kornmarkt. Unveröff. Manuskript: 15 + Beil.
- Zentner, J. (1827): Das Renchtal. F. Wegner
- Zentralstelle für die Floristische Kartierung der Bundesrepublik Deutschland (Nord) (Hrsg.) (1993): bearbeitet von Wißkirchen, R.: Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland (vorläufige Fassung). Gött. Flor. Rundbr. 3: 478

- Zeven, A.C. u. J.M.J. De Wet (1982): Dictionary of cultivated plants and their regions of diversity.
- Zhang, L. (1983): Vegetation ecology and population biology of *Fritillaria meleagris* L. at the Kungsängen Nature Reserve, Eastern Sweden. *Acta Phytogeographica Suecica* 73: 92
- Ziegenspeck, H. (1936): Orchidaceae. In: O. von Kirchner, E. Loew u. L. Schroeter (Hersg.): *Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas*. I,4: 840
- Zielinski, J. (1987): *Rosa* L. In: *Polska Akademia Nauk. Flora Polski* V: 5-50
- Zielonkowski, W. (1968): Die Verbreitung von *Callitriche obtusangula* Legall in Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 40 (1967/68): 63-65
- Zielonkowski, W. (1972): Formenkreis, Verbreitung und Vergesellschaftung der *Festuca ovina* im Raume Regensburg. *Hoppea* 30: 281-317
- Zier, L. (1985): Das Pfrunger Ried. *Führer Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ* 10: 308
- Zier, L. (1986): Der Altshäuser Weiher - ein oberschwäbisches Feuchtgebiet. *Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 61: 229-260
- Zimmermann, F. (1906/1907): Flora von Mannheim und Umgebung. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 5: 85-104, 109-137, 141-158
- Zimmermann, F. (1907): Die Adventiv- und Ruderalflora von Mannheim, Ludwigshafen und der Pfalz nebst den selteneren einheimischen Blütenpflanzen und den Gefäßkryptogamen. (Auch in *Mitt. Pollichia* 67: 1-174; Bad Dürkheim, 1911). H. Haas: 171
- Zimmermann, F. (1913): 1. Nachtrag zur Adventiv- und Ruderalflora von Mannheim-Ludwigshafen. *Mitt. Pollichia* 68-69 (27/28): 1-95
- Zimmermann, F. (1913): *Senecio vernalis* (Neufunde). *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg* 6: 281
- Zimmermann, F. (1914): Nachtrag zur Adventiv- und Ruderalflora von Ludwigshafen, der Pfalz und Hessen. Aus den Jahren 1910, 11 und 12. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 14: 68-84
- Zimmermann, F. (1914): Neue Adventivpflanzen der Badischen Pfalz. *Mitt. Bad. Bot. Ver.* 6/294: 341-342
- Zimmermann, F. (1921): Neues aus der Flora von Mannheim. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F.* 1: 133-135
- Zimmermann, F. (1925): Wechsel der Flora der Pfalz in den letzten 70 Jahren. *Mitt. Pollichia N. F.* 1: 1-49
- Zimmermann, G. (1910): *Malaxis paludosa* Sw., ein neuer Bürger der badischen Flora. *Allg. Bot. Zeitschr.* 16: 184-185
- Zimmermann, G. (1911): Neue Standorte. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk.* 6 (261-262): 95-96
- Zimmermann, G. u. W. Zimmermann (1911): Neue Standorte. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk.* 6 (263-264): 111-112
- Zimmermann, J. H. (1958): A monograph of *Veratrum*. Ph.D. Diss. Univ. Wisc. 322
- Zimmermann, P. (1990): Gefährdung der Quellmoore bei Bad Rippoldsau - Schapbach (Mittlerer Schwarzwald). *Carolinea* 48: 103-108
- Zimmermann, P. (1991, 1992): Das geplante Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Wolfachtal mit Seitentälern". Ein wertvolles Schwarzwald-Talsystem im Landkreis Freudenstadt. *Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 67: 165-204
- Zimmermann, P. (1996): Flora und Vegetation ausgewählter xerothermer Schafweiden im Landkreis Calw. *Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 88: 137-257
- Zimmermann, P. u. U. Rohde (1989): Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen auf Ackerwildkrautgesellschaften. *Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland* 47: 153-156
- Zimmermann, W. (1908): *Orchis coriophora* x *morio*. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk.* 5(229): 234-236
- Zimmermann, W. (1909): *Orchis coriophora* x *morio*. *Allg. Bot. Zeitschr.* 15: 150-151
- Zimmermann, W. (1910): Neue u. Kritische Beobachtungen an Orchidaceen Badens. *Allg. Bot. Zeitschr.* 16: 110-115, 129-134, 145-152, 170-172

- Zimmermann, W. (1911): Auf der Jagd nach *Orchis militaris* x *Aceras anthropophora*. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6(263-264): 104-109
- Zimmermann, W. (1911): Neue Beobachtungen über die Orchidaceen Badens. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6(256-257): 41-56
- Zimmermann, W. (1912): Die Formen der Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz: 92
- Zimmermann, W. (1913): Badische Volksnamen von Pflanzen. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6: 285-300
- Zimmermann, W. (1914): Einige orchideologische Mitteilungen. Allg. Bot. Zeitschr. 20: 40-41
- Zimmermann, W. (1915): Abweichende Blüten und Missbildungen bei Orchidaceen. Allg. Bot. Zeitschr. 21: 49-56
- Zimmermann, W. (1916): *Orchis Döllii* W. Zim. (= *O. ustulatus* x *Simia*). Allg. Bot. Zeitschr. 22: 49-52
- Zimmermann, W. (1917): Floristische Beiträge, kleinere Mitteilungen usw. Nr. 8. Beobachtungen an *Orchis sambucinus* L. Allg. Botan. Zeitschr. 22: 129-130
- Zimmermann, W. (1917): Neue Beobachtungen an deutschen Orchideen. Nr. 4. *Epipactis* (*Cephalanthera*) *alba* x *longifolia*. Allg. Botan. Zeitschr. 23: 42-43
- Zimmermann, W. (1917/18): Neue Beobachtungen an deutschen Orchideen. Allg. Bot. Zeitschr. 23/24: 6-12
- Zimmermann, W. (1919): Mitteilungen zur *Orchiaceras*-Gruppe aus Baden. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N.F. 1: 21-31
- Zimmermann, W. (1922): *Parapactis* nov. gen., eine übersehene Orchidaceengattung. Feddes Repertorium 18: 283-287
- Zimmermann, W. (1922): *Parapactis* W. Zimm. nov. genus Orchidacearum. *Parapactis epipactoides* W. Zimm. nov. spec. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N.F. 1: 232-236
- Zimmermann, W. (1923): Neufunde und neue Standorte in der Flora von Achern (1918-1923). Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1 (11): 263-269
- Zimmermann, W. (1924): Xerothermensiedlungen am südöstlichen badischen Jurarand. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 1: 298-301
- Zimmermann, W. (1926): Weitere Neufunde und Standortsmittelungen aus der Flora von Achern (1924-25). Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz Freiburg N.F. 2 (3): 28-32
- Zimmermann, W. (1926): Weitere Neufunde und Standortsmittelungen aus der Flora von Achern. Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 2: 28-32
- Zimmermann, W. (1929): Neufunde und Standortsmittelungen aus der Flora von Achern (1926-1928). Beitr. Naturw. Erforsch. Badens 4: 57-61
- Zimmermann, W. (1934): Beispiele von Artbildung bei Orchideen (*Ophrys*-Kreis). Süddeutsche Apothekerzeitung 74(9): 635-639
- Zimmermann, W. (1936-1937): Das Anfangsherbarium des Hieronymus Harder. - Süddeutsche Apotheker-Zeitung 76/77: 76(64), 693-5, 12.8.1936; 77(86), 834-6, 27.10.1937; 77(87), 845-6, 30.10.1937; 77(88), 852-5, 30.10.1937. Süddeutsche Apotheker-Zeitung 76/77
- Zimmermann, W. (1940): Das Salzburger Herbarium des Hieronymus Harder von 1592. Scientia Pharmaceutica 6: 21-24
- Zimmermann, W. (1941): Deutungen einiger Pflanzen bei Klaus von Metry: *Serpentaria*, *Sideron*, *Edrica*. Oberdeutsche Zeitschr. Volkskunde 15: 121-125
- Zimmermann, W. (1944): Erwähnung zweier Feldbergpflanzen im 15. Jahrhundert. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 4: 413-417
- Zobrist, L. (1935): Pflanzensoziologische und bodenkundliche Untersuchungen des *Schoenetum nigricantis* im nordwestschweizerischen Mittellande. Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz 18: 144
- Zohary, M. (1983): Pflanzen der Bibel. Calwer Verlag: 222
- Zohary, M. u. D. Heller (1984): The genus *Trifolium*. 606 S.; Jerusalem (Israel Acad. Sciences Humanities)

Zoller, H. (1950): Das Pflanzenkleid der Mergelsteilhänge im Weißensteingebiet. Beitrag zur Kenntnis natürlicher Reliktvegetation in der montan-alpinen Stufe des Schweizerjuras. Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel 1950: 67-95

Zoller, H. (1954): Die Arten der *Bromus erectus*-Wiesen des Schweizer Juras. Ihre Herkunft und ihre Areale mit besonderer Berücksichtigung der Verbreitung in ursprünglicher Vegetation. Veröff. Geobot. Inst. Rübel 28: 283